

### Morbilidad y mortalidad


|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Incidencia bruta de cáncer cervicouterino por cada 100 000 mujeres (2020):                  | <b>13,2</b> |
| Incidencia de cáncer cervicouterino normalizada por edades por cada 100 000 mujeres (2020): | <b>10,2</b> |
| Riesgo acumulado de cáncer cervicouterino entre los 0 y los 74 años (2020):                 | <b>0,9%</b> |
| Muertes por cáncer cervicouterino (2019):                                                   | <b>150</b>  |
| Relación entre la mortalidad y la incidencia de cáncer cervicouterino (2020):               | <b>0,36</b> |
| Hay un registro poblacional del cáncer (2021):                                              | <b>Sí</b>   |

Tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino normalizada por edades por cada 100 000 mujeres



### Prevención primaria

#### Cobertura de la vacunación contra el VPH en las niñas (2020)



**Entre las niñas que cumplen 15 años en 2020, 7 de cada 10 han recibido su dosis final de vacunación contra el VPH**

#### Programa de vacunación contra el VPH (2020):

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| El VPH incluido en el programa nacional de vacunación: | <b>Sí</b>         |
| Escala del programa de vacunación:                     | <b>Nacional</b>   |
| Año de introducción:                                   | <b>2007</b>       |
| Cohorte objetivo principal:                            | <b>12-14 años</b> |


#### Factores de riesgo asociados:

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prevalencia del consumo de tabaco en las mujeres mayores de 15 años (2020)**:          | <b>17%</b>      |
| Uso del preservativo en la última relación sexual de riesgo (-):                       | <b>ND</b>       |
| Incidencia de la infección por el VIH por cada 1000 mujeres mayores de 15 años (2020): | <b>&lt;0,01</b> |

### Prevención secundaria

|                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hay un programa nacional de cribado del cáncer cervicouterino (2021):                                                    | <b>Sí</b>         |
| Principal prueba de cribado utilizada (2021):                                                                            | <b>citología</b>  |
| Intervalo de edad de las destinatarias del programa (2021):                                                              | <b>23-64 años</b> |
| Hay un programa/directrices para reforzar la detección precoz de los primeros síntomas en la atención primaria (2021):   | <b>Sí</b>         |
| Hay un sistema de derivación claramente definido desde la atención primaria a la atención secundaria y terciaria (2021): | <b>Sí</b>         |

#### Cribado del cáncer cervicouterino (2019)



**8 de cada 10 mujeres de 30 a 49 años se han sometido a pruebas de detección de cáncer cervicouterino en los últimos 5 años**

### Tratamiento y atención complementaria

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hay directrices nacionales sobre el tratamiento del cáncer cervicouterino (2021): | <b>Sí</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|

#### Hay servicios de diagnóstico y tratamiento del cáncer disponibles a nivel general (2021):

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Centro o departamento de oncología a nivel terciario: | <b>Sí</b> |
| Servicios de patología (laboratorios):                | <b>Sí</b> |
| Cirugía del cáncer:                                   | <b>Sí</b> |
| Quimioterapia:                                        | <b>Sí</b> |
| Radioterapia:                                         | <b>Sí</b> |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Número de unidades de radioterapia por cada 10 000 pacientes con cáncer (2020):  | <b>13</b> |
| Número de unidades de braquiterapia por cada 10 000 pacientes con cáncer (2020): | <b>2</b>  |

#### Número de personal médico (por cada 10 000 pacientes con cáncer):

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Oncólogos radioterapeutas (2019):                  | <b>44</b>  |
| Físicos médicos (2019):                            | <b>44</b>  |
| Cirujanos (2012):                                  | <b>613</b> |
| Radiólogos (2019):                                 | <b>156</b> |
| Médicos especializados en medicina nuclear (2019): | <b>26</b>  |

#### Cuidados paliativos para pacientes con enfermedades no transmisibles en el sistema público de salud disponibles de forma general (2021):

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| En los servicios de atención primaria de salud:           | <b>Sí</b> |
| En el ámbito de la asistencia comunitaria o domiciliaria: | <b>Sí</b> |

|                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Consumo anual de opioides por persona notificado, excluida la metadona, en equivalentes de morfina oral (2017): | <b>275mg</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

### Objetivos de la Estrategia de Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino de la OMS para 2030

**90% de las niñas han sido completamente vacunadas contra el VPH a los 15 años**

**70% de las mujeres se han sometido a una prueba de detección de alto rendimiento a los 35 años y, de nuevo, a los 45 años**

**90% de las mujeres a las que se ha diagnosticado enfermedad cervicouterina están en tratamiento**

ND = datos no disponibles

\* Cobertura del programa: % de la población nacional destinataria (entre las niñas de 9 a 14 años)

† Cobertura a los 15 años: % de la población que ha cumplido 15 años que ha sido vacunada contra el VPH en algún momento entre los 9 y los 14 años

Véanse las Notas explicativas para la descripción de los indicadores.

\*\*A falta de datos suficientes sobre todo el consumo de todos los tipos de productos de tabaco, los datos se refieren solo al tabaco fumado