
# 宫颈癌概况

女性人口总数(2019年): 1 635 000

女性死亡总数(2019年): 9 200

## 发病率和死亡率





## 初级预防

#### 女孩人类乳头瘤病毒疫苗接种率(2020年)



人类乳头瘤病毒疫苗接种未被纳入国家疫苗接种规划

#### 人类乳头瘤病毒疫苗接种规划(2020年):




相关风险因素:	
15岁以上女性烟草使用流行率(2020):	<b>7</b> %
最后一次高危性行为安全套使用 (-) :	无数据
按每千名15岁以上女性人口计算的艾滋病毒发病率(2020年)	: <0.01

## 二级预防

	国家宫颈癌筛查规划(2021年):		有
	使用的初级筛查方法(2021年):	细胞	3学
	筛查规划的目标年龄范围(2021年):	30-60	岁
	加强初级卫生保健层面尽早检测早期症状的规划/		
	指南(2021年):		有
	明确的从初级保健到二级和三级保健的转诊系统(2021年)		有

### 宫颈癌筛查 (2019年)



过去5年中,每10名30-49岁女性中 4 人接受过宫颈癌筛查

## 治疗和支持性护理

国家宫颈癌管理指南(2021年):

普遍提供癌症诊断和治疗服务(2021年):	
三级肿瘤中心或肿瘤科:	有
病理实验室:	有
癌症外科手术:	有
化疗:	有
	有

放射科数量(每万名癌症患者)(2021年): 9 腔内放疗科数量(每万名癌症患者)(2021年):

#### 医务人员人数(每万名癌症患者):

放射肿瘤学医生(2019年):	无数据
医学物理师(2019年):	7
外科医生 (2014年):	732
放射科医生(2019年):	无数据
核医学医生(2019年):	5

#### 公共卫生系统普遍为非传染性疾病患者提供姑息治疗(2021年):

有 在初级卫生保健机构: 有 在社区或家庭护理:

报告的年度阿片类药物消费量(不包 括美沙酮), 按人均口服吗啡等效量 计算(2017年): 0毫克

## 世卫组织 2030年消除宫颈癌战略目标

90%的女孩在15岁之前完成人乳头 状瘤病毒疫苗接种

70%的妇女在35岁前接受高效检测方法筛 查,45岁前再次接受筛查

90%确诊宫颈疾病的妇女得到治疗

- · 疫苗接种规划覆盖率: 占全国目标人口的百分比(9-14岁女孩) \* 15岁之前覆盖率: 在9 至 14 岁之间任何时间接种过人类乳头瘤病毒疫苗的 15 岁女性人群百分比