

# 新西兰

## 宫颈癌概况

### 发病率和死亡率


|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 按每十万女性人口计算的宫颈癌粗发病率（2020年）：      | 7.1  |
| 按每十万女性人口计算的的年龄标准化宫颈癌发病率（2020年）： | 5.6  |
| 0-74岁女性宫颈癌累积风险（2020年）：          | 0.5% |
| 宫颈癌死亡人数（2019年）：                 | 61   |
| 宫颈癌死亡率与发病率之比（2020年）：            | 0.47 |
| 基于人群的癌症登记系统（2021年）：             | 有    |

按每十万女性人口计算的年龄标准化宫颈癌死亡率



### 初级预防

#### 女孩人类乳头瘤病毒疫苗接种率（2020年）



每10名2020年将年满15岁女孩中6人接受了最后一剂疫苗接种

#### 人类乳头瘤病毒疫苗接种规划（2020年）：

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 人类乳头瘤病毒疫苗被纳入国家疫苗接种规划： | 有    |
| 疫苗接种规划的范围：            | 国家级  |
| 推出年份：                 | 2009 |
| 主要目标人群：               | 11岁  |


#### 相关风险因素：

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 15岁以上女性烟草使用流行率（2020）**：         | 11%   |
| 最后一次高危性行为安全套使用（-）：              | 无数据   |
| 按每千名15岁以上女性人口计算的艾滋病毒发病率（2020年）： | <0.01 |

### 二级预防

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 国家宫颈癌筛查规划（2021年）：                | 有      |
| 使用的初级筛查方法（2021年）：                | 细胞学    |
| 筛查规划的目标年龄范围（2021年）：              | 25-69岁 |
| 加强初级卫生保健层面尽早检测早期症状的规划/指南（2021年）： | 有      |
| 明确的从初级保健到二级和三级保健的转诊系统（2021年）：    | 有      |

#### 宫颈癌筛查（2019年）



过去5年中，每10名30-49岁女性中8人接受过宫颈癌筛查

### 治疗和支持性护理

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 国家宫颈癌管理指南（2021年）：     | 有 |
| 普遍提供癌症诊断和治疗服务（2021年）： |   |
| 三级肿瘤中心或肿瘤科：           | 有 |
| 病理实验室：                | 有 |
| 癌症外科手术：               | 有 |
| 化疗：                   | 有 |
| 放疗：                   | 有 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 放射科数量（每万名癌症患者）（2021年）：   | 10 |
| 腔内放疗科数量（每万名癌症患者）（2021年）： | 1  |

#### 医务人员人数（每万名癌症患者）：

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 放射肿瘤学医生（2019年）： | 无数据 |
| 医学物理师（2019年）：   | 无数据 |
| 外科医生（2015年）：    | 238 |
| 放射科医生（2019年）：   | 133 |
| 核医学医生（2019年）：   | 7   |

#### 公共卫生系统普遍为非传染性疾病患者提供姑息治疗（2021年）：

|            |   |                                            |       |
|------------|---|--------------------------------------------|-------|
| 在初级卫生保健机构： | 有 | 报告的年度阿片类药物消费量（不包括美沙酮），按人均口服吗啡等效量计算（2017年）： | 122毫克 |
| 在社区或家庭护理：  | 有 |                                            |       |

### 世卫组织 2030年消除宫颈癌战略目标

90%的女孩在15岁之前完成人乳头状瘤病毒疫苗接种

70%的妇女在35岁前接受高效检测方法筛查，45岁前再次接受筛查

90%确诊宫颈疾病的妇女得到治疗

\* 疫苗接种规划覆盖率：占全国目标人口的百分比（9-14岁女孩）

\* 15岁之前覆盖率：在9至14岁之间任何时间接种过人类乳头瘤病毒疫苗的15岁女性人口百分比

\*\*数据仅指吸烟，没有关于所有烟草使用的足够数据