

Morbilidad y mortalidad


Incidencia bruta de cáncer cervicouterino por cada 100 000 mujeres (2020):	5,6
Incidencia de cáncer cervicouterino normalizada por edades por cada 100 000 mujeres (2020):	8,7
Riesgo acumulado de cáncer cervicouterino entre los 0 y los 74 años (2020):	1,00%
Muertes por cáncer cervicouterino (2019):	770
Relación entre la mortalidad y la incidencia de cáncer cervicouterino (2020):	0,67
Hay un registro poblacional del cáncer (2021):	Sí

Tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino normalizada por edades por cada 100 000 mujeres



Prevención primaria

Cobertura de la vacunación contra el VPH en las niñas (2020)



La vacuna contra el VPH no está incluida en el programa nacional de vacunación

Programa de vacunación contra el VPH (2020):

El VPH incluido en el programa nacional de vacunación:	No
Escala del programa de vacunación:	-
Año de introducción:	-
Cohorte objetivo principal:	-


Factores de riesgo asociados:

Prevalencia del consumo de tabaco en las mujeres mayores de 15 años (2020):	ND
Uso del preservativo en la última relación sexual de riesgo (-):	ND
Incidencia de la infección por el VIH por cada 1000 mujeres mayores de 15 años (2020):	0,11

Prevención secundaria

Hay un programa nacional de cribado del cáncer cervicouterino (2021):	No
Principal prueba de cribado utilizada (2021):	-
Intervalo de edad de las destinatarias del programa (2021):	-
Hay un programa/directrices para reforzar la detección precoz de los primeros síntomas en la atención primaria (2021):	Sí
Hay un sistema de derivación claramente definido desde la atención primaria a la atención secundaria y terciaria (2021):	Sí

Cribado del cáncer cervicouterino (2019)



Menos de 1 de cada 10 mujeres de 30 a 49 años se han sometido a pruebas de detección de cáncer cervicouterino en los últimos 5 años

Tratamiento y atención complementaria

Hay directrices nacionales sobre el tratamiento del cáncer cervicouterino (2021):	Sí
---	----

Hay servicios de diagnóstico y tratamiento del cáncer disponibles a nivel general (2021):

Centro o departamento de oncología a nivel terciario:	Sí
Servicios de patología (laboratorios):	Sí
Cirugía del cáncer:	Sí
Quimioterapia:	Sí
Radioterapia:	No

Número de unidades de radioterapia por cada 10 000 pacientes con cáncer (2020):	4
Número de unidades de braquiterapia por cada 10 000 pacientes con cáncer (2020):	1

Número de personal médico (por cada 10 000 pacientes con cáncer):

Oncólogos radioterapeutas (2019):	ND
Físicos médicos (2019):	11
Cirujanos (2014):	117
Radiólogos (2019):	ND
Médicos especializados en medicina nuclear (2019):	1

Cuidados paliativos para pacientes con enfermedades no transmisibles en el sistema público de salud disponibles de forma general (2021):

En los servicios de atención primaria de salud:	Sí	Consumo anual de opioides por persona notificado, excluida la metadona, en equivalentes de morfina oral (2017):	<1mg
En el ámbito de la asistencia comunitaria o domiciliaria:	Sí		

Objetivos de la Estrategia de Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino de la OMS para 2030

90% de las niñas han sido completamente vacunadas contra el VPH a los 15 años

70% de las mujeres se han sometido a una prueba de detección de alto rendimiento a los 35 años y, de nuevo, a los 45 años

90% de las mujeres a las que se ha diagnosticado enfermedad cervicouterina están en tratamiento

ND = datos no disponibles

* Cobertura del programa: % de la población nacional destinataria (entre las niñas de 9 a 14 años)

† Cobertura a los 15 años: % de la población que ha cumplido 15 años que ha sido vacunada contra el VPH en algún momento entre los 9 y los 14 años

Véanse las Notas explicativas para la descripción de los indicadores.

Organización Mundial de la Salud. Perfiles del cáncer cervicouterino en los países, 2021