

# SAINT-MARIN

## PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE,  
FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS,  
FEMMES (2019) : **ND**

### Morbidité et mortalité


|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :                    | ND  |
| Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) : | ND  |
| Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :                                | ND  |
| Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :                                              | ND  |
| Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :                              | ND  |
| Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :                          | Oui |

Taux de mortalité standardisé selon l'âge pour 100 000 femmes pour le cancer du col de l'utérus



### Prévention primaire

#### Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 2 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

#### Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination : | Oui       |
| Échelle du programme de vaccination :                        | National  |
| Année de mise en place :                                     | 2008      |
| Cohorte cible prioritaire :                                  | 11-14 ans |


#### Facteurs de risque connexes :

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) : | ND |
| Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :   | ND |
| Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :              | ND |

### Prévention secondaire

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :                                                              | Oui       |
| Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :                                                                                               | test PVH  |
| Tranche d'âge cible du programme (2021) :                                                                                                         | 26-65 ans |
| Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) : | Oui       |
| Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021) :               | Oui       |

#### Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

### Traitement et soins de soutien

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) : | Non |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) : | ND |
| Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) : | ND |

#### Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire : | Non |
| Services de pathologie (laboratoires) :                   | Oui |
| Chirurgie oncologique :                                   | Oui |
| Chimiothérapie :                                          | Oui |
| Radiothérapie :                                           | Non |

#### Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Radiothérapeutes (-) :                               | ND |
| Physiciens médicaux (2019) :                         | ND |
| Chirurgiens (-) :                                    | ND |
| Radiologues (2019) :                                 | ND |
| Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019) : | ND |

#### Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Dans les établissements de soins de santé primaires :       | Oui |
| Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile : | Oui |

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : | ND |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

\* Couverture du programme : % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)

† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

Organisation mondiale de la Santé - Profils de pays pour le cancer du col de l'utérus, 2021