


### Morbidité et mortalité

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :                    | <b>10,9</b>  |
| Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) : | <b>19,1</b>  |
| Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :                                | <b>2,2 %</b> |
| Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :                                              | <b>420</b>   |
| Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :                              | <b>0,68</b>  |
| Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :                          | <b>Non</b>   |



### Prévention primaire

#### Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



**La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination**

#### Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination : | <b>Non</b> |
| Échelle du programme de vaccination :                        | -          |
| Année de mise en place :                                     | -          |
| Cohorte cible prioritaire :                                  | -          |


#### Facteurs de risque connexes :

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :       | <b>1 %</b>  |
| Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2013-2014) : | <b>51 %</b> |
| Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :                    | <b>0,68</b> |

### Prévention secondaire

|                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :                                                              | <b>Non</b> |
| Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :                                                                                               | -          |
| Tranche d'âge cible du programme (2021) :                                                                                                         | -          |
| Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) : | <b>Oui</b> |
| Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021) :               | <b>Oui</b> |

#### Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



**1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années**

### Traitement et soins de soutien

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) : | <b>Non</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) : | <b>2</b> |
| Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) : | <b>0</b> |

#### Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire : | <b>Non</b> |
| Services de pathologie (laboratoires) :                   | <b>Oui</b> |
| Chirurgie oncologique :                                   | <b>Oui</b> |
| Chimiothérapie :                                          | <b>Oui</b> |
| Radiothérapie :                                           | <b>Non</b> |

#### Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Radiothérapeutes (2019) :                            | <b>ND</b> |
| Physiciens médicaux (2019) :                         | <b>ND</b> |
| Chirurgiens (2014) :                                 | <b>42</b> |
| Radiologues (2019) :                                 | <b>ND</b> |
| Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019) : | <b>0</b>  |

#### Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Dans les établissements de soins de santé primaires :       | <b>Non</b> |
| Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile : | <b>Non</b> |

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : | <b>0mg</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

**90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans**

**70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans**

**90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées**

ND = données non disponibles

\* Couverture du programme : % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)

† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

[Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.](#)