
# **OUZBÉKISTAN**


### PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019): **16 530 000** 

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **78 100** 


#### Morbidité et mortalité





### **Prévention primaire**

#### Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



9 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

#### Programme de vaccination contre le PVH (2020):

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	9 ans


#### Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,07

### **Prévention secondaire**

#### 

#### Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

#### Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge	
du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2017) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2017) :	1

## Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

# Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-):	ND
Radiologues (2019):	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

# Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : <1mg

### Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans 70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

\* Couverture du programme : % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)

† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

Organisation mondiale de la Santé - Profils de pays pour le cancer du col de l'utérus, 2021