


ساموا

ملامح سرطان عنق الرحم


المراضة والوفيات

| | |
|------|--|
| 10.5 | المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020): |
| 12.4 | معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020): |
| %1.5 | الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020): |
| 6 | الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019): |
| 0.6 | نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020): |
| نعم | وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021): |



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)




التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

الوقاية الثانية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):

- إجراء اختبار الفحص الأولى (2021):
- الفتنة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
- وجود برامج/مبادرات توجيهية لتعزيز الكشف المبكر عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الأولية (2021):
- وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



حضور 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادرات توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):

- وجود مركز معنى بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
- خدمات علم الأمراض (المختبرات):
- جراحة السرطان:
- العلاج الكيميائي:
- العلاج الإشعاعي:

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

- نعم في مؤسسات الرعاية الأولية:
- نعم في المجتمع أو رعاية منزلية:

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد وحدات العلاج الكيميائي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):



معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية،

باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معدل المورفين المأخوذ

عن طريق الفم لكل فرد (2017):

0 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

| | | |
|--|---|---|
| تلقى 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً | خضع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومراة ثانية في سن 45 عاماً | حصل 90% من النساء على العلاج من المشخصة |
|--|---|---|

ب غ م = البيانات غير منتجة

* تغطية البرنامج: النسبة السنوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفئات من 9 أعوام إلى 14 عاماً)

† معدل التغطية يبلغ عمر 15 عاماً: النسبة السنوية للبالغات سن 15 عاماً التي حصلن على التطعيم ضد فيروس

النظر الملاحظات التوضيحية لمعرف المؤشرات