



Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	1,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	120
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,68
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-


Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	8 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,04

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	NSP
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021) :	NSP

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	NSP
---	------------

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	NSP
Services de pathologie (laboratoires) :	NSP
Chirurgie oncologique :	NSP
Chimiothérapie :	NSP
Radiothérapie :	NSP

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	5
Chirurgiens (2014) :	79
Radiologues (2019) :	207
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019) :	5

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) :	0mg
--	------------

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

NSP = Ne sait pas

* Couverture du programme : % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)

† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

[Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.](#)