

Камерун

Общая численность населения: 23 344 000
Рейтинг по уровню доходов: Средне-низкий

Смертность*


Количество случаев смерти от сахарного диабета

	Мужчины	Женщины
в возрасте 30–69 лет	1 120	1 220
в возрасте 70 лет и старше	800	1 260


Количество случаев смерти, которые можно отнести к высокому содержанию сахара в крови

	Мужчины	Женщины
в возрасте 30–69 лет	1 680	1 730
в возрасте 70 лет и старше	1 180	1 840

Относительный показатель смертности (% от суммарного числа смертей, все возраста)*



Тенденции стандартизированной по возрасту распространенности диабета



Распространенность сахарного диабета и сопутствующих факторов риска

	Мужчины	Женщины	Всего
Диабет	4.5%	4.9%	4.7%
Избыточный вес	22.1%	36.9%	29.5%
Ожирение	4.9%	14.3%	9.6%
Недостаточная физическая активность	20.9%	37.7%	29.3%

Национальные меры реагирования на сахарный диабет

Политики, директивы и мониторинг

Операционная политика/стратегия/план действий в отношении сахарного диабета	Нет
Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению избыточного веса/ожирения	Нет
Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению недостаточной физической активности	Нет
Национальные директивы/протоколы/стандарты по сахарному диабету, основанные на фактических данных	DK
Стандартные критерии направления пациентов системы первичной медико-санитарной помощи на более высокий уровень оказания помощи	Не доступны
Реестр больных сахарным диабетом	Нет
Недавнее национальное обследование факторов риска, в ходе которого измерялось содержание сахара в крови	Нет

Доступность лекарств, базовых технологий и процедур в секторе общественного здравоохранения

Лекарства в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

Инсулин	○
Метформин	○
Сульфонилмочевина	○

Процедуры

Фотокоагуляция сетчатки	○
Заместительная почечная терапия путем диализа	○
Почечная трансплантация	○

Базовые технологии в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

Измерение содержания глюкозы в крови	●
Оральный тест на толерантность к глюкозе	○
Измерение концентрации гликированного (HbA1) гемоглобина в крови	○
Исследование глазного дна	○
Восприятие вибрации стопы посредством камертона	○
Доплер исследование состояния сосудов стопы	○
Анализ кетонов и глюкозы в моче с помощью полосок	○

* Расчетные данные смертности по этой стране имеют высокую степень неопределенности, поскольку они не основываются на каких-либо национальных данных смертности от НИЗ (См. Пояснительные примечания).

○ = В целом не доступны ● = В целом доступны

DK = страна дала ответ "не знаю"