

## Смертность\*


Количество случаев смерти от сахарного диабета

|                            | Мужчины | Женщины |
|----------------------------|---------|---------|
| в возрасте 30–69 лет       | 160     | <100    |
| в возрасте 70 лет и старше | 390     | 180     |


Количество случаев смерти, которые можно отнести к высокому содержанию сахара в крови

|                            | Мужчины | Женщины |
|----------------------------|---------|---------|
| в возрасте 30–69 лет       | 520     | 120     |
| в возрасте 70 лет и старше | 1 150   | 660     |

Относительный показатель смертности (% от суммарного числа смертей, все возраста)\*



Тенденции стандартизированной по возрасту распространенности диабета



## Распространенность сахарного диабета и сопутствующих факторов риска

|                                     | Мужчины | Женщины | Всего |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|
| Диабет                              | 14.1%   | 11.1%   | 12.6% |
| Избыточный вес                      | 67.0%   | 67.6%   | 67.3% |
| Ожирение                            | 26.1%   | 35.7%   | 30.8% |
| Недостаточная физическая активность | 43.7%   | 34.2%   | 39.1% |

## Национальные меры реагирования на сахарный диабет

### Политики, директивы и мониторинг

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Операционная политика/стратегия/план действий в отношении сахарного диабета  | Да                              |
| Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению избыточного веса/ожирения  | Нет                             |
| Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению недостаточной физической активности                                | Да                              |
| Национальные директивы/протоколы/стандарты по сахарному диабету, основанные на фактических данных                              | Доступны и частично применяются |
| Стандартные критерии направления пациентов системы первичной медико-санитарной помощи на более высокий уровень оказания помощи | Доступны и частично применяются |
| Реестр больных сахарным диабетом   | Нет                             |
| Недавнее национальное обследование факторов риска, в ходе которого измерялось содержание сахара в крови                        | Нет                             |

## Доступность лекарств, базовых технологий и процедур в секторе общественного здравоохранения

### Лекарства в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

|                   |   |
|-------------------|---|
| Инсулин           | ● |
| Метформин         | ● |
| Сульфонилмочевина | ○ |

### Процедуры

|   |   |
|---|---|
| Фотокоагуляция сетчатки                       | ○ |
| Заместительная почечная терапия путем диализа | ● |
| Почечная трансплантация                       | ○ |

### Базовые технологии в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

|  |   |
|--|---|
| Измерение содержания глюкозы в крови                             | ● |
| Оральный тест на толерантность к глюкозе                         | ○ |
| Измерение концентрации гликированного (HbA1) гемоглобина в крови | ○ |
| Исследование глазного дна  | ○ |
| Восприятие вибрации стопы посредством камертона                  | ● |
| Доплер исследование состояния сосудов стопы                      | ○ |
| Анализ кетонов и глюкозы в моче с помощью полосок                | ○ |

\* Расчетные данные смертности по этой стране имеют высокую степень неопределенности, поскольку они не основываются на каких-либо национальных данных смертности от НИЗ (См. Пояснительные примечания).

○ = В целом не доступны ● = В целом доступны