

معدل الوفيات*


عدد الوفيات الناجمة عن داء السكري

السن 69-30 سنة
السن أكبر من 70 سنةالذكور
الإناث

عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع منسوب الغلوكوز في الدم

السن 69-30 سنة
السن أكبر من 70 سنةالذكور
الإناث

الاتجاهات في معدل الانتشار الموحد حسب السن للإصابة بالسكري



معدل الوفيات النسبي (النسبة المئوية من مجموع الوفيات، جميع الأعمار)*



معدل انتشار داء السكري وعوامل الخطر ذات الصلة به

المجموع	الإناث	الذكور	
%20.7	%21.1	%20.4	داء السكري
%74.9	%78.2	%71.7	زيادة الوزن
%42.3	%48.3	%36.4	السمنة
%47.6	%53.9	%41.2	الخمول البدني

الاستجابة الوطنية لداء السكري

السياسات والمبادئ التوجيهية والرصد

السياسات/ الاستراتيجيات/ خطط العمل التشغيلية المتعلقة بداء السكري	نعم
السياسات/ الاستراتيجيات/ خطط العمل التشغيلية للحد من زيادة الوزن والسمنة	لا
السياسات/ الاستراتيجيات/ خطط العمل التشغيلية للحد من الخمول البدني	لا
المبادئ التوجيهية/ البروتوكولات/ المعايير الوطنية المسندة بالبيانات بشأن داء السكري	متاح وتم تنفيذه بالكامل†
المعايير النموذجية لإحالة المرضى من مستوى الرعاية الأولية إلى مستوى رعاية أعلى	متاح وتم تنفيذه بالكامل
السجل الخاص بداء السكري	نعم
المسح الوطني المجرى حديثاً لعوامل الخطر والذي تم فيه قياس نسبة الغلوكوز في الدم	NR

توافر الأدوية والتكنولوجيات الأساسية والإجراءات في قطاع الصحة العمومية

الأدوية في مرافق الرعاية الأولية

●	الإنسولين
●	الميتفورمين
●	سلفونيلوريا

إجراءات

DK	التخثير الضوئي للشبكية
DK	العلاج التعويضي لوظائف الكلى عن طريق غسل الكلى
DK	العلاج التعويضي لوظيفة الكلى عن طريق زرع الكلى

التكنولوجيات الأساسية في مرافق الرعاية الأولية

●	قياس نسبة الغلوكوز في الدم
●	اختبار تحمل الغلوكوز المعطى عن طريق الفم
●	اختبار الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي HbA1c
●	فحص قاع العين عن طريق توسيع الحدقة
●	اختبار الشعور باهتزاز القدم بواسطة الشوكة الرنانة
●	اختبار حالة الأوعية الدموية للقدم بواسطة جهاز دوبلر
●	أشرطة قياس الغلوكوز والكتيتون في البول

NR = البلد رد على المسح ولكنه لم يعط ردًا على سؤال محدد

* انظر الملاحظات الإيضاحية

† = لم تقدم وثائق

DK = البلد رد بعبارة لا أعرف

○ = غير متاحة عموماً ● = متاحة عموماً

منظمة الصحة العالمية - المرسّمتان القطرية لداء السكري 2016.