

马绍尔群岛

总人口: 53 000

收入组: 中高收入

死亡率*

糖尿病死亡人数

	男性	女性
30–69岁	...	...
70岁以上	...	...


高血糖导致的死亡人数

	男性	女性
30–69岁	...	...
70岁以上	...	...

死因构成比（占所有死亡的%，所有年龄组）*



糖尿病年龄标化流行趋势



糖尿病流行率以及相关风险因素的流行情况

	男性	女性	合计
糖尿病	20.4%	21.1%	20.7%
超重	71.7%	78.2%	74.9%
肥胖症	36.4%	48.3%	42.3%
缺乏身体活动	41.2%	53.9%	47.6%

国家应对糖尿病

政策、指南和监测

已实施糖尿病防治政策、战略或行动计划	是
已实施减少超重/肥胖的政策、战略或行动计划	否
已实施旨在减少身体活动不足的政策、战略或行动计划	否
国家糖尿病循证准则、规程或标准	有, 已充分实施†
将病人从初级保健机构向更高级保健机构转诊的标准	有, 已充分实施
糖尿病登记	是
国家最近开展的包括检测血糖水平的风险因素调查	NR

公共卫生部门中可用的药品、基本技术和程序

初级保健设施中的药品

胰岛素	●
二甲双胍	●
磺脲类	●

程序

视网膜光凝术	DK
通过透析进行肾脏替代治疗	DK
通过移植进行肾脏替代治疗	DK

初级保健设施中的基本技术

检测血糖	●
口服葡萄糖耐量试验	●
检测HbA1c	●
散瞳眼底检查	●
通过音叉检测足部震动感觉	●
多普勒足部血管功能检查	●
用于检测尿液中葡萄糖和酮的试纸条	●

* 见解释性说明。

† = 未提供文件

DK = 该国的答复是“不知道”。

○ = 并非普遍有 ● = 普遍有

NR = 该国响应了调查但没有回答具体问题。