

Mortalité


Nombre de décès dus au diabète

| | hommes | femmes |
|----------------|--------|--------|
| 30 à 69 ans | 730 | 520 |
| 70 ans et plus | 890 | 1 710 |


Nombre de décès dus à l'hyperglycémie

| | hommes | femmes |
|----------------|--------|--------|
| 30 à 69 ans | 1 430 | 840 |
| 70 ans et plus | 1 830 | 3 100 |

Mortalité proportionnelle (% des décès totaux, tous âges confondus)



Tendances de la prévalence du diabète standardisée selon l'âge



Prévalence du diabète et des facteurs de risque y relatifs

| | hommes | femmes | total |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| Diabète | 8.7% | 8.5% | 8.6% |
| Surpoids | 62.3% | 52.8% | 57.5% |
| Obésité | 19.7% | 22.5% | 21.1% |
| Activité physique insuffisante | 35.3% | 47.1% | 41.4% |

Action nationale contre le diabète

Politiques, directives, suivi

| | |
|--|---|
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour le diabète | Non |
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour réduire le surpoids/l'obésité | Non |
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour réduire la sédentarité | Non |
| Directives/protocoles/normes nationales(aux) reposant sur des données probantes pour le diabète | Disponibles et mis(es) en œuvre intégralement |
| Critères standard pour faire passer les patients du niveau des soins de santé primaires à un niveau plus élevé | Disponibles et mis en œuvre intégralement |
| Registre du diabète | DK |
| Enquête nationale récente sur les facteurs de risque dans le cadre de laquelle la glycémie a été mesurée | Non |

Disponibilité des médicaments, technologies de base et techniques dans les établissements de soins publics

Médicaments dans les établissements de soins de santé primaires

| | |
|--------------|---|
| Insuline | ● |
| Metformine | ● |
| Sulfonylurée | ● |

Techniques

| | |
|--|---|
| Photocoagulation rétinienne | ● |
| Traitement substitutif rénal par dialyse | ● |
| Transplantation rénale | ● |

Technologies de base dans les établissements de soins primaires

| | |
|--|----|
| Mesure de la glycémie | ● |
| Test oral de tolérance au glucose | ● |
| Test HbA1c | DK |
| Fond d'œil | ● |
| Test au diapason pour perception des vibrations dans le pied | DK |
| Examen Doppler de vascularisation du pied | DK |
| Mesure du glucose et des cétones par bandelettes d'urine | ● |

DK = le pays a répondu qu'il « ne sait pas »

○ = généralement pas disponibles ● = généralement disponibles