

死亡率*


糖尿病死亡人数

	男性	女性
30–69岁	<100	<100
70岁以上	<100	<100


高血糖导致的死亡人数

	男性	女性
30–69岁	<100	<100
70岁以上	<100	<100

死因构成比（占所有死亡的%，所有年龄组）*



糖尿病年龄标化流行趋势



糖尿病流行率以及相关风险因素的流行情况

	男性	女性	合计
糖尿病	3.7%	4.1%	3.9%
超重	9.3%	15.3%	12.3%
肥胖症	1.0%	2.6%	1.8%
缺乏身体活动	...	...	...

国家应对糖尿病

政策、指南和监测

已实施糖尿病防治政策、战略或行动计划	是
已实施减少超重/肥胖的政策、战略或行动计划	否
已实施旨在减少身体活动不足的政策、战略或行动计划	是
国家糖尿病循证准则、规程或标准	无
将病人从初级保健机构向更高级保健机构转诊的标准	无
糖尿病登记	否
国家最近开展的包括检测血糖水平的风险因素调查	是

公共卫生部门中可用的药品、基本技术和程序

初级保健设施中的药品

胰岛素	DK
二甲双胍	DK
磺脲类	DK

程序

视网膜光凝术	DK
通过透析进行肾脏替代治疗	DK
通过移植进行肾脏替代治疗	DK

初级保健设施中的基本技术

检测血糖	DK
口服葡萄糖耐量试验	○
检测HbA1c	○
散瞳眼底检查	○
通过音叉检测足部震动感觉	○
多普勒足部血管功能检查	○
用于检测尿液中葡萄糖和酮的试纸条	○

*该国的死亡率估计数具有高度不确定性，这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础（见解释性说明）。

DK = 该国的答复是“不知道”。

○ = 并非普遍有 ● = 普遍有

... = 没有可用数据