


Mortalidad*

Número de muertes por diabetes

| | hombres | mujeres |
|---------------|---------|---------|
| 30-69 años | 1 340 | 1 010 |
| 70 años o más | 1 050 | 1 290 |


Mortalidad proporcional (% del total de muertes, todas las edades)*



Número de muertes atribuibles a la hiperglucemia

| | hombres | mujeres |
|---------------|---------|---------|
| 30-69 años | 1 450 | 1 120 |
| 70 años o más | 1 130 | 1 470 |

Tendencias en la diabetes estandarizadas por edades



Prevalencia de la diabetes y de los factores de riesgo conexos

| | hombres | mujeres | total |
|--------------------|---------|---------|-------|
| Diabetes | 2.7% | 3.0% | 2.8% |
| Sobrepeso | 11.3% | 25.9% | 18.6% |
| Obesidad | 1.3% | 6.5% | 3.9% |
| Inactividad física | ... | ... | ... |

Respuesta nacional contra la diabetes

Políticas, directrices y vigilancia

| | |
|---|-----------------------------------|
| Política/estrategia/plan de acción contra la diabetes | No |
| Política/estrategia/plan de acción para reducir el sobrepeso y la obesidad | No |
| Política/estrategia/plan de acción para reducir la inactividad física | No |
| Directrices/protocolos/normas nacionales basados en datos probatorios contra la diabetes | Existen y se aplican parcialmente |
| Criterios normalizados para la derivación de pacientes desde la atención primaria a un nivel superior | No existen |
| Registro de casos de diabetes | No |
| Última encuesta nacional sobre factores de riesgo en la que se midió la glucemia | Sí |

Disponibilidad de medicamentos, técnicas básicas y procedimientos en el sector de salud pública

Medicamentos disponibles en los establecimientos de atención primaria

| | |
|--------------|----|
| Insulina | NR |
| Metformina | ● |
| Sulfonilurea | ○ |

Procedimientos

| | |
|---------------------------|---|
| Fotocoagulación retiniana | ○ |
| Diálisis | ● |
| Trasplante renal | ○ |

Técnicas básicas disponibles en los establecimientos de atención primaria

| | |
|---|----|
| Medición de la glucemia | ● |
| Prueba oral de tolerancia a la glucosa | NR |
| Prueba de la HbA1c | ○ |
| Oftalmoscopia con dilatación | ○ |
| Percepción de la vibración del pie con diapasón | ○ |
| Prueba Doppler para determinar el estado vascular del pie | ○ |
| Tiras para medir la glucosa y las cetonas en la orina | ○ |

* Las estimaciones de mortalidad para este país tienen un alto nivel de incertidumbre porque no están basadas sobre ningunos datos nacionales sobre mortalidad por ENTs (véanse las notas explicativas). NR = el país respondió a la encuesta, pero no a esta pregunta

○ = En general no disponible ● = En general disponible

... = no hay datos disponibles