


Смертность*

Количество случаев смерти от сахарного диабета

	Мужчины	Женщины
в возрасте 30–69 лет	1 340	1 010
в возрасте 70 лет и старше	1 050	1 290


Относительный показатель смертности (% от суммарного числа смертей, все возраста)*



Количество случаев смерти, которые можно отнести к высокому содержанию сахара в крови

	Мужчины	Женщины
в возрасте 30–69 лет	1 450	1 120
в возрасте 70 лет и старше	1 130	1 470

Тенденции стандартизированной по возрасту распространенности диабета



Распространенность сахарного диабета и сопутствующих факторов риска

	Мужчины	Женщины	Всего
Диабет	2.7%	3.0%	2.8%
Избыточный вес	11.3%	25.9%	18.6%
Ожирение	1.3%	6.5%	3.9%
Недостаточная физическая активность	...	...	...

Национальные меры реагирования на сахарный диабет

Политики, директивы и мониторинг

Операционная политика/стратегия/план действий в отношении сахарного диабета	Нет
Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению избыточного веса/ожирения	Нет
Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению недостаточной физической активности	Нет
Национальные директивы/протоколы/стандарты по сахарному диабету, основанные на фактических данных	Доступны и частично применяются
Стандартные критерии направления пациентов системы первичной медико-санитарной помощи на более высокий уровень оказания помощи	Не доступны
Реестр больных сахарным диабетом	Нет
Недавнее национальное обследование факторов риска, в ходе которого измерялось содержание сахара в крови	Да

Доступность лекарств, базовых технологий и процедур в секторе общественного здравоохранения

Лекарства в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

Инсулин	NR
Метформин	●
Сульфонилмочевина	○

Процедуры

Фотокоагуляция сетчатки	○
Заместительная почечная терапия путем диализа	●
Почечная трансплантация	○

Базовые технологии в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

Измерение содержания глюкозы в крови	●
Оральный тест на толерантность к глюкозе	NR
Измерение концентрации гликированного (HbA1) гемоглобина в крови	○
Исследование глазного дна	○
Восприятие вибрации стопы посредством камертона	○
Доплер исследование состояния сосудов стопы	○
Анализ кетонов и глюкозы в моче с помощью полосок	○

* Расчетные данные смертности по этой стране имеют высокую степень неопределенности, поскольку они не основываются на каких-либо национальных данных смертности от НИЗ (См. Пояснительные примечания).

○ = В целом не доступны ● = В целом доступны

NR = страна участвовала в обследовании, но не ответила на конкретный вопрос
... = данных нет