

Смертность*


Количество случаев смерти от сахарного диабета

	Мужчины	Женщины
в возрасте 30–69 лет	270	340
в возрасте 70 лет и старше	260	560


Количество случаев смерти, которые можно отнести к высокому содержанию сахара в крови

	Мужчины	Женщины
в возрасте 30–69 лет	640	550
в возрасте 70 лет и старше	580	940

Относительный показатель смертности (% от суммарного числа смертей, все возраста)*



Тенденции стандартизированной по возрасту распространенности диабета



Распространенность сахарного диабета и сопутствующих факторов риска

	Мужчины	Женщины	Всего
Диабет	4.0%	5.2%	4.6%
Избыточный вес	13.7%	38.4%	26.2%
Ожирение	1.9%	14.8%	8.4%
Недостаточная физическая активность	15.3%	23.8%	19.7%

Национальные меры реагирования на сахарный диабет

Политики, директивы и мониторинг

Операционная политика/стратегия/план действий в отношении сахарного диабета	Да†
Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению избыточного веса/ожирения	Да
Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению недостаточной физической активности	Да†
Национальные директивы/протоколы/стандарты по сахарному диабету, основанные на фактических данных	Не доступны
Стандартные критерии направления пациентов системы первичной медико-санитарной помощи на более высокий уровень оказания помощи	Доступны и частично применяются
Реестр больных сахарным диабетом	Нет
Недавнее национальное обследование факторов риска, в ходе которого измерялось содержание сахара в крови	Нет

Доступность лекарств, базовых технологий и процедур в секторе общественного здравоохранения

Лекарства в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

Инсулин	●
Метформин	○
Сульфонилмочевина	○

Процедуры

Фотокоагуляция сетчатки	○
Заместительная почечная терапия путем диализа	●
Почечная трансплантация	○

Базовые технологии в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

Измерение содержания глюкозы в крови	●
Оральный тест на толерантность к глюкозе	○
Измерение концентрации гликированного (HbA1) гемоглобина в крови	○
Исследование глазного дна	○
Восприятие вибрации стопы посредством камертона	○
Доплер исследование состояния сосудов стопы	○
Анализ кетонов и глюкозы в моче с помощью полосок	●

* Расчетные данные смертности по этой стране имеют высокую степень неопределенности, поскольку они не основываются на каких-либо национальных данных смертности от НИЗ (См. Пояснительные примечания).

○ = В целом не доступны ● = В целом доступны

† = Документация не предоставлена