


РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ОТ НИЗ (%)*



ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ*



33200 ЖИЗНЕЙ МОГУТ БЫТЬ СПАСЕНЫ К 2025 ГОДУ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕХ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗ ПО БОРЬБЕ С НИЗ


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНА			ГОД ДАННЫХ	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО	
СМЕРТНОСТЬ*							
	Преждевременная смертность от НИЗ	X	Всего смертей от НИЗ	2016	51200	56300	
			Риск преждевременной смерти от 30 до 70 лет (%)	2016	35	14	24
	Смертность от самоубийств	-	Смертность от самоубийств (на 100 000 населения)	2016	-	-	26

ФАКТОРЫ РИСКА


	Вредное употребление алкоголя	✓	Общее потребление алкоголя на душу населения в литрах чистого спирта, население 15+ лет	2016	18	5	11
	Недостаточная физическая активность	✓	Недостаточная физическая активность, взрослое население 18+ лет (%)	2016	14	16	15
	Потребление соли/натрия	✓	Среднее потребление соли, взрослое население 20+ (г / сут)	2010	12	11	11
	Употребление табака	✓	Текущее курение табака, население 15+ (%)	2016	47	9	26
	Повышенное кровяное давление	X	Повышенное кровяное давление, взрослое население 18+ лет (%)	2015	35	29	32
	Диабет	X	Повышенный уровень глюкозы в крови, взрослое население 18+ лет (%)	2014	9	10	10
	Ожирение	X	Ожирение, взрослое население 18+ лет (%)	2016	24	29	27
			Ожирение, подростки 10-19 лет (%)	2016	9	4	6
	Загрязнение окружающей среды	-	Превышение уровня годовой концентрации PM2.5 предусмотренной в методических рекомендациях ВОЗ (кратное)	2016	-	-	2
	Бытовое загрязнение воздуха	-	Население с первичной зависимостью от загрязняющих видов топлива и технологий (%)	2016	-	-	<5

ВЫБРАННЫЕ ТРЕНДЫ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ


ТЕКУЩЕЕ ТАБАКОКУРЕНИЕ



ОЖИРЕНИЕ



ПОВЫШЕННОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ



МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

	Лекарственная терапия для профилактики сердечных приступов и инсультов	X	Доля населения с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или с существующим ССЗ	2016	13%
			Доля лиц с высоким риском, получающих любую лекарственную терапию и консультирование для предотвращения сердечных приступов и инсультов	2016	59%
			Доля центров первичной медико-санитарной помощи, осуществляющие стратификацию по риску сердечно-сосудистых заболеваний	2017	Более 50%
			Наличие методических рекомендаций по ССЗ, которые используются не менее чем в 50% медицинских учреждений	2017	Да
	Основные лекарственные средства и базовые технологии для лечения основных НИЗ	X	Количество основных лекарств от НИЗ, представленных как «общедоступные»	2017	10 из 10-ти
			Количество основных технологий НИЗ, представленных как «общедоступные»	2017	6 из 6-ти

* Расчетные данные смертности по этой стране имеют высокую степень неопределенности, поскольку они не основываются на каких-либо национальных данных смертности от НИЗ (См. пояснительные примечания).

Всемирная организация здравоохранения - Ситуация в странах в области НИЗ, 2018 г.