



非传染性疾病导致的过早死亡风险(%)



死因构成比




到2025年,实施所有世卫组织的"最合算措施"可拯救 34700 条生命

设定国家目标			数据年	男性	女性	合计
死亡率						
 非传染性疾病导致的过早死亡	X	非传染病死亡总数 30至70岁过早死亡风险(%)	2016	29100	31600	60700
 自杀死亡率	-	自杀死亡率(每 100 000 人口)	2016	-	-	17

危险因素

 有害使用酒精	X	人均酒精总消费量, 15岁以上成人(纯酒精立升数)	2016	18	5	11
 缺乏体力活动	X	缺乏体力活动, 18岁以上成人(%)	2016	23	28	26
 盐/钠摄入量	X	平均盐摄入量, 20岁以上成人(克/天)	2010	10	9	9
 烟草使用	X	现在吸烟, 15岁以上成人(%)	2016	27	20	24
 高血压	X	高血压, 18岁以上成人(%)	2015	27	20	24
 糖尿病	X	高血糖, 18岁以上成人(%)	2014	7	4	6
 肥胖	X	肥胖, 18岁以上成人(%) 肥胖, 10-19岁青少年(%)	2016	24	19	21
 空气污染	-	超过世卫组织指南推荐的PM2.5年均浓度(乘以倍数)	2016	-	-	1
 家庭空气污染	-	主要依靠污染燃料和科技的人口(%)	2016	-	-	<5

选定的成人危险因素趋势



国家系统应对

 药物治疗预防心脏病发作和中风	X	高风险或患有心血管疾病的的人口比例	-	...
		高危人群接受药物治疗或咨询以预防心脏病发作和中风的比例	-	...
		初级保健中心报告提供心血管疾病危险分层的比例	2017	超过50%
		已报告至少50%的卫生机构使用心血管疾病指南	2017	是
 基本非传染疾病药物和基本技术来治疗主要非传染疾病	X	报告为"一般可得"的非传染疾病基本药物数量	2017	10中有10
		报告为"一般可得"的非传染疾病基本技术数量	2017	6中有#6