


КОМОРОСКИЕ ОСТРОВА

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, 2016 г.: 796000
ВСЕГО СМЕРТЕЙ, 2016г.: 5800

РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ОТ НИЗ (%)*



ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ*

- ▶ 17% Сердечно-сосудистые заболевания
- ▶ 8% Рак
- ▶ 2% Хронические респираторные заболевания
- ▶ 2% Диабет
- ▶ 12% Другие НИЗ
- ▶ 47% Инфекционные и алиментарные болезни, материнская и перинатальная патология
- ▶ 11% Травмы




500 ЖИЗНЕЙ МОГУТ БЫТЬ СПАСЕНЫ К 2025 ГОДУ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕХ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗ ПО БОРЬБЕ С НИЗ

		НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНА		ГОД ДАННЫХ	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
СМЕРТНОСТЬ*							
	Преждевременная смертность от НИЗ	X	Всего смертей от НИЗ	2016	1300	1200	2400
			Риск преждевременной смерти от 30 до 70 лет (%)	2016	25	21	23
	Смертность от самоубийств	-	Смертность от самоубийств (на 100 000 населения)	2016	-	-	7

ФАКТОРЫ РИСКА							
	Вредное употребление алкоголя	X	Общее потребление алкоголя на душу населения в литрах чистого спирта, население 15+ лет	2016	2	0	1
	Недостаточная физическая активность	X	Недостаточная физическая активность, взрослое население 18+ лет (%)	2016	8	17	12
	Потребление соли/натрия	X	Среднее потребление соли, взрослое население 20+ (г / сут)	2010	4	4	4
	Употребление табака	X	Текущее курение табака, население 15+ (%)	2016	23	4	14
	Повышенное кровяное давление	X	Повышенное кровяное давление, взрослое население 18+ лет (%)	2015	22	22	22
	Диабет	X	Повышенный уровень глюкозы в крови, взрослое население 18+ лет (%)	2014	6	6	6
	Ожирение	X	Ожирение, взрослое население 18+ лет (%) Ожирение, подростки 10-19 лет (%)	2016 2016	3 1	11 3	7 2
	Загрязнение окружающей среды	-	Превышение уровня годовой концентрации PM2.5 предусмотренной в методических рекомендациях ВОЗ (кратное)	2016	-	-	2
	Бытовое загрязнение воздуха	-	Население с первичной зависимостью от загрязняющих видов топлива и технологий (%)	2016	-	-	91

ВЫБРАННЫЕ ТРЕНДЫ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

	Лекарственная терапия для профилактики сердечных приступов и инсультов	X	Доля населения с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или с существующим ССЗ	-	...
			Доля лиц с высоким риском, получающих любую лекарственную терапию и консультирование для предотвращения сердечных приступов и инсультов	-	...
			Доля центров первичной медико-санитарной помощи, осуществляющие стратификацию по риску сердечно-сосудистых заболеваний	2017	Более 50%
			Наличие методических рекомендаций по ССЗ, которые используются не менее чем в 50% медицинских учреждений	2017	Да
	Основные лекарственные средства и базовые технологии для лечения основных НИЗ	X	Количество основных лекарств от НИЗ, представленных как «общедоступные»	2017	5 из 10-ти
			Количество основных технологий НИЗ, представленных как «общедоступные»	2017	4 из 6-ти

... = данных нет

* Расчетные данные смертности по этой стране имеют высокую степень неопределенности, поскольку они не основываются на каких-либо национальных данных смертности от НИЗ (См. пояснительные примечания).

Всемирная организация здравоохранения -
Ситуация в странах в области НИЗ, 2018 г.