



РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ОТ НИЗ (%)



ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ




4400 ЖИЗНЕЙ МОГУТ БЫТЬ СПАСЕНЫ К 2025 ГОДУ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕХ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗ ПО БОРЬБЕ С НИЗ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНА				ГОД ДАННЫХ	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
СМЕРТНОСТЬ							
	Преждевременная смертность от НИЗ	✓	Всего смертей от НИЗ	2016	44200	38300	82400
			Риск преждевременной смерти от 30 до 70 лет (%)	2016	19	14	16
	Смертность от самоубийств	-	Смертность от самоубийств (на 100 000 населения)	2016	-	-	14


ФАКТОРЫ РИСКА							
	Вредное употребление алкоголя	✓	Общее потребление алкоголя на душу населения в литрах чистого спирта, население 15+ лет	2016	10	2	6
	Недостаточная физическая активность	✓	Недостаточная физическая активность, взрослое население 18+ лет (%)	2016	32	44	38
	Потребление соли/натрия	✓	Среднее потребление соли, взрослое население 20+ (г / сут)	2010	7	6	7
	Употребление табака	✓	Текущее курение табака, население 15+ (%)	2016	55	18	37
	Повышенное кровяное давление	✓	Повышенное кровяное давление, взрослое население 18+ лет (%)	2015	24	22	23
	Диабет	✓	Повышенный уровень глюкозы в крови, взрослое население 18+ лет (%)	2014	9	12	10
	Ожирение	✓	Ожирение, взрослое население 18+ лет (%)	2016	20	33	27
			Ожирение, подростки 10-19 лет (%)	2016	11	9	10
	Загрязнение окружающей среды	-	Превышение уровня годовой концентрации PM2.5 предусмотренной в методических рекомендациях ВОЗ (кратное)	2016	-	-	2
	Бытовое загрязнение воздуха	-	Население с первичной зависимостью от загрязняющих видов топлива и технологий (%)	2016	-	-	21

ВЫБРАННЫЕ ТРЕНДЫ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ


ТЕКУЩЕЕ ТАБАКОКУРЕНИЕ



ОЖИРЕНИЕ



ПОВЫШЕННОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ



МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

	Лекарственная терапия для профилактики сердечных приступов и инсультов	✓	Доля населения с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или с существующим ССЗ	-	...
			Доля лиц с высоким риском, получающих любую лекарственную терапию и консультирование для предотвращения сердечных приступов и инсультов	-	...
			Доля центров первичной медико-санитарной помощи, осуществляющие стратификацию по риску сердечно-сосудистых заболеваний	2017	Более 50%
			Наличие методических рекомендаций по ССЗ, которые используются не менее чем в 50% медицинских учреждений	2017	Да
	Основные лекарственные средства и базовые технологии для лечения основных НИЗ	✓	Количество основных лекарств от НИЗ, представленных как «общедоступные»	2017	9 из 10-ти
			Количество основных технологий НИЗ, представленных как «общедоступные»	2017	6 из 6-ти

... = данных нет

Всемирная организация здравоохранения -
Ситуация в странах в области НИЗ, 2018 г.