




29% 50 Probabilidad (%) de muerte prematura 40 30% 30 Cánceres 20 9% 10 respiratorias 0 crónicas 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2% Tendencias anteriores Tendencias lineales proyectadas Objetivos globales0 Hombres Diabetes0 Mujeres

21% Otras ENT Enfermedades cardiovasculares > 5% Afecciones Se calcula que transmisibles. las ENT son la maternas, perinatales causa del y nutricionales 91% de todas las Enfermedades muertes. 4% Lesiones

16 600 VIDAS SE PUEDEN SALVAR PARA EL 2025 IMPLEMENTANDO TODAS LAS «MEJORES INVERSIONES» DE LA OMS							
		OBJETIVO NACIONAL ESTABLECIDO		AÑO DE DATOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
MORT	ALIDAD						
	Mortalidad prematura debida a las ENT	X	Total de defunciones por ENT	2016	13 800	14 000	27 800
			Riesgo de mortalidad prematura entre 30-70 años (%)	2016	12	9	10
Ţ.	La mortalidad por suicidio	-	Tasa de mortalidad por suicidio (por 100 000 población)	2016	-	-	11
FACTORES DE RIESGO							
	Consumo nocivo de alcohol	X	Consumo total de alcohol per cápita, adultos mayores de 15 años (litros de alcohol puro)	2016	20	6	13
K	Inactividad física	X	Inactividad física, adultos de mayores de 18 años (%)	2016	30	39	34
	Consumo de sal/sodio	X	Promedio de ingesta de sal en la población, adultos mayores de 20 años (g/día)	2010	10	9	9
8	Consumo de tabaco	X	Consumo de tabaco actual, adultos mayores de 15 años (%)	2016	25	22	23
	Tensión arterial elevada	X	Tensión arterial elevada, adultos mayores de 18 años (%)	2015	25	20	23
À	Diabetes	X	Glucosa en la sangre elevada, adultos mayores de 18 años (%)	2014	8	6	7
	Obesidad	X	Obesidad, adultos mayores de 18 años (%)	2016	27	27	27
~ 0	Obesidad	Λ	Obesidad, adolecentes de 10-19 años (%)	2016	9	8	8
%	Contaminación del aire	-	Superación del nivel de guía WHO para concentración de PM2.5 anual (por un múltiplo de)°	2016	-	-	-
各	Contaminación del aire de interiores	-	Población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles y tecnología contaminantes (%)	2016	-	-	<5





⁼ no hay datos disponibles