


РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ОТ НИЗ (%)*



ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ*



39200 ЖИЗНЕЙ МОГУТ БЫТЬ СПАСЕНЫ К 2025 ГОДУ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕХ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗ ПО БОРЬБЕ С НИЗ


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНА			ГОД ДАННЫХ	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО	
СМЕРТНОСТЬ*							
	Преждевременная смертность от НИЗ	X	Всего смертей от НИЗ	2016	63500	63700	127200
			Риск преждевременной смерти от 30 до 70 лет (%)	2016	37	18	27
	Смертность от самоубийств	-	Смертность от самоубийств (на 100 000 населения)	2016	-	-	23

ФАКТОРЫ РИСКА


	Вредное употребление алкоголя	X	Общее потребление алкоголя на душу населения в литрах чистого спирта, население 15+ лет	2016	14	2	8
	Недостаточная физическая активность	X	Недостаточная физическая активность, взрослое население 18+ лет (%)	2016	25	29	27
	Потребление соли/натрия	X	Среднее потребление соли, взрослое население 20+ (г / сут)	2010	16	14	15
	Употребление табака	X	Текущее курение табака, население 15+ (%)	2016	44	7	24
	Повышенное кровяное давление	X	Повышенное кровяное давление, взрослое население 18+ лет (%)	2015	28	25	27
	Диабет	X	Повышенный уровень глюкозы в крови, взрослое население 18+ лет (%)	2014	11	12	12
	Ожирение	X	Ожирение, взрослое население 18+ лет (%)	2016	19	23	21
			Ожирение, подростки 10-19 лет (%)	2016	7	4	5
	Загрязнение окружающей среды	-	Превышение уровня годовой концентрации PM2.5 предусмотренной в методических рекомендациях ВОЗ (кратное)	2016	-	-	1
	Бытовое загрязнение воздуха	-	Население с первичной зависимостью от загрязняющих видов топлива и технологий (%)	2016	-	-	<5

ВЫБРАННЫЕ ТРЕНДЫ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ


ТЕКУЩЕЕ ТАБАКОКУРЕНИЕ



ОЖИРЕНИЕ



ПОВЫШЕННОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ



МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

	Лекарственная терапия для профилактики сердечных приступов и инсультов	X	Доля населения с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или с существующим ССЗ	-	...
			Доля лиц с высоким риском, получающих любую лекарственную терапию и консультирование для предотвращения сердечных приступов и инсультов	-	...
			Доля центров первичной медико-санитарной помощи, осуществляющие стратификацию по риску сердечно-сосудистых заболеваний	2017	Более 50%
			Наличие методических рекомендаций по ССЗ, которые используются не менее чем в 50% медицинских учреждений	2017	Да
	Основные лекарственные средства и базовые технологии для лечения основных НИЗ	X	Количество основных лекарств от НИЗ, представленных как «общедоступные»	2017	10 из 10-ти
			Количество основных технологий НИЗ, представленных как «общедоступные»	2017	6 из 6-ти

... = данных нет

* Расчетные данные смертности по этой стране имеют высокую степень неопределенности, поскольку они не основываются на каких-либо национальных данных смертности от НИЗ (См. пояснительные примечания).

Всемирная организация здравоохранения -
Ситуация в странах в области НИЗ, 2018 г.