



РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ОТ НИЗ (%)



ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ




6300 ЖИЗНЕЙ МОГУТ БЫТЬ СПАСЕНЫ К 2025 ГОДУ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕХ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗ ПО БОРЬБЕ С НИЗ


| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНА | | | ГОД ДАННЫХ | МУЖ. | ЖЕН. | ВСЕГО | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|------|-------|-------|-------|
| СМЕРТНОСТЬ | | | | | | | |
| | Преждевременная смерть от НИЗ | ✓ | Всего смертей от НИЗ | 2016 | 16100 | 14000 | 30100 |
| | | | Риск преждевременной смерти от 30 до 70 лет (%) | 2016 | 33 | 17 | 25 |
| | Смертность от самоубийств | - | Смертность от самоубийств (на 100 000 населения) | 2016 | - | - | 8 |
| ФАКТОРЫ РИСКА | | | | | | | |
| | Вредное употребление алкоголя | ✓ | Общее потребление алкоголя на душу населения в литрах чистого спирта, население 15+ лет | 2016 | 11 | 2 | 6 |
| | Недостаточная физическая активность | ✓ | Недостаточная физическая активность, взрослое население 18+ лет (%) | 2016 | 10 | 16 | 13 |
| | Потребление соли/натрия | ✓ | Среднее потребление соли, взрослое население 20+ (г / сут) | 2010 | 14 | 13 | 14 |
| | Употребление табака | ✓ | Текущее курение табака, население 15+ (%) | 2016 | 50 | 4 | 26 |
| | Повышенное кровяное давление | ✗ | Повышенное кровяное давление, взрослое население 18+ лет (%) | 2015 | 23 | 22 | 23 |
| | Диабет | ✗ | Повышенный уровень глюкозы в крови, взрослое население 18+ лет (%) | 2014 | 8 | 9 | 9 |
| | Ожирение | ✗ | Ожирение, взрослое население 18+ лет (%) | 2016 | 13 | 18 | 15 |
| | | | Ожирение, подростки 10-19 лет (%) | 2016 | 4 | 2 | 3 |
| | Загрязнение окружающей среды | - | Превышение уровня годовой концентрации PM2.5 предусмотренной в методических рекомендациях ВОЗ (кратное) | 2016 | - | - | 2 |
| | Бытовое загрязнение воздуха | - | Население с первичной зависимостью от загрязняющих видов топлива и технологий (%) | 2016 | - | - | 19 |

ВЫБРАННЫЕ ТРЕНДЫ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ


ТЕКУЩЕЕ ТАБАКОКУРЕНИЕ



ОЖИРЕНИЕ



ПОВЫШЕННОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ



МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

| | | | | | |
|--|---|---|---|------|-------------|
| | Лекарственная терапия для профилактики сердечных приступов и инсультов | ✓ | Доля населения с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или с существующим ССЗ | 2013 | 17% |
| | | | Доля лиц с высоким риском, получающих любую лекарственную терапию и консультирование для предотвращения сердечных приступов и инсультов | 2013 | 49% |
| | | | Доля центров первичной медико-санитарной помощи, осуществляющие стратификацию по риску сердечно-сосудистых заболеваний | 2017 | Менее 25% |
| | | | Наличие методических рекомендаций по ССЗ, которые используются не менее чем в 50% медицинских учреждений | 2017 | Да |
| | Основные лекарственные средства и базовые технологии для лечения основных НИЗ | ✓ | Количество основных лекарств от НИЗ, представленных как «общедоступные» | 2017 | 10 из 10-ти |
| | | | Количество основных технологий НИЗ, представленных как «общедоступные» | 2017 | 5 из 6-ти |