




MARRUECOS

2016 POBLACIÓN TOTAL: 35 277 000
2016 TOTAL DE MUERTES: 182 000

RIESGO DE MORTALIDAD PREMATURA DEBIDO A ENT (%)*



MORTALIDAD PROPORCIONAL*




39 400 VIDAS SE PUEDEN SALVAR PARA EL 2025 IMPLEMENTANDO TODAS LAS «MEJORES INVERSIONES» DE LA OMS

		OBJETIVO NACIONAL ESTABLECIDO		AÑO DE DATOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
MORTALIDAD*							
	Mortalidad prematura debida a las ENT	✓	Total de defunciones por ENT	2016	69 600	75 200	144 900
			Riesgo de mortalidad prematura entre 30-70 años (%)	2016	13	11	12
	La mortalidad por suicidio	-	Tasa de mortalidad por suicidio (por 100 000 población)	2016	-	-	3

FACTORES DE RIESGO

	Consumo nocivo de alcohol	✓	Consumo total de alcohol per cápita, adultos mayores de 15 años (litros de alcohol puro)	2016	1	0	1
	Inactividad física	✓	Inactividad física, adultos de mayores de 18 años (%)	2016	20	31	25
	Consumo de sal/sodio	✓	Promedio de ingesta de sal en la población, adultos mayores de 20 años (g/día)	2010	12	10	11
	Consumo de tabaco	✓	Consumo de tabaco actual, adultos mayores de 15 años (%)	2016	48	1	24
	Tensión arterial elevada	✓	Tensión arterial elevada, adultos mayores de 18 años (%)	2015	24	24	24
	Diabetes	✓	Glucosa en la sangre elevada, adultos mayores de 18 años (%)	2014	13	12	12
	Obesidad	X	Obesidad, adultos mayores de 18 años (%)	2016	19	32	26
			Obesidad, adolescentes de 10-19 años (%)	2016	9	9	9
	Contaminación del aire	-	Superación del nivel de guía WHO para concentración de PM2.5 anual (por un múltiplo de)	2016	-	-	3
	Contaminación del aire de interiores	-	Población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles y tecnología contaminantes (%)	2016	-	-	<5

TENDENCIAS DE FACTORES DE RIESGO DE ADULTOS SELECCIONADOS



RESPUESTA DE SISTEMAS NACIONALES

	Terapia con medicamentos para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares	✓	Proporción de población con alto riesgo de ECV o con ECV existente	2017	5%
			Proporción de personas de alto riesgo que reciben terapia farmacológica y asesoramiento para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares	2017	43%
			Proporción de centros de atención primaria de salud declarados que ofrecen estratificación de riesgo de ECV	2017	Menos de 25%
			Declarado tener guías de ECV que se utilizan en al menos el 50% de las instalaciones de salud	2017	Sí
	Medicamentos esenciales de ENT y tecnologías básicas para tratar las ENT principales	✓	Número de medicamentos esenciales de ENT declaradas como "generalmente disponibles"	2017	9 de 10
			Número de tecnologías esenciales de ENT declaradas como "generalmente disponibles"	2017	5 de 6

* Las estimaciones de mortalidad para este país tienen un alto nivel de incertidumbre porque no están basados sobre ningunos datos nacionales sobre mortalidad por ENTs (véanse las notas explicativas)