



葡萄牙

2016年人口总数: 10372000
2016年死亡总数: 107000

非传染性疾病导致的过早死亡风险(%)



死因构成比




到2025年,实施所有世卫组织的"最合算措施"可拯救 3500 条生命

死亡率	设定国家目标	数据年	男性	女性	合计
非传染性疾病导致的过早死亡	✓	2016	46000	45800	91800
		2016	16	7	11
自杀死亡率	-	2016	-	-	14

危险因素

危险因素	设定国家目标	数据年	男性	女性	合计
有害使用酒精	✗	2016	21	5	12
缺乏体力活动	✗	2016	40	52	46
盐/钠摄入量	✗	2010	11	10	11
烟草使用	✗	2016	27	13	20
高血压	✗	2015	35	29	32
糖尿病	✗	2014	11	8	9
肥胖	✓	2016	22	24	23
		2016	9	8	9
空气污染	-	2016	-	-	-
家庭空气污染	-	2016	-	-	<5

选定的成人危险因素趋势



国家系统应对

国家系统应对	设定国家目标	高风险或患有心血管疾病的的人口比例	高危人群接受药物治疗或咨询以预防心脏病发作和中风的比例	初级保健中心报告提供心血管疾病危险分层的比例	已报告至少50%的卫生机构使用心血管疾病指南	报告为"一般可得"的非传染疾病基本药物数量	报告为"一般可得"的非传染疾病基本技术数量
药物治疗预防心脏病发作和中风	✗	-	-	2017	2017	2017	2017
		超过50%	是	10中有10	6中有#4
基本非传染疾病药物和基本技术来治疗主要非传染疾病	✗	2017	2017	2017	2017	2017	2017
		10中有10	6中有#4				

... = 没有可用数据
° 不超过

世界卫生组织 - 非传染性疾病国家概况, 2018年。