




VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)

2016 POPULATION TOTALE : 31 568 000
NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS POUR 2016: 181 000

RISQUE DE DÉCÈS PRÉMATURÉ DÙ AUX MNT (%)



MORTALITÉ PROPORTIONNELLE



111 100 VIES PEUVENT ÊTRE SAUVÉES D'ICI 2025 EN METTANT EN ŒUVRE TOUS LES « MEILLEURS CHOIX » DE L'OMS

| | | CIBLES NATIONALES FIXÉES | ANNÉE | HOMMES | FEMMES | TOTAL | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------|--------|--------|---------|
| MORTALITÉ | | | | | | | |
| | Mortalité prématurée due aux MNT | X | Total des décès dus aux MNT | 2016 | 68 700 | 57 200 | 125 800 |
| | | | Risque de décès prématuré entre 30 et 70 ans (%) | 2016 | 22 | 15 | 18 |
| | Mortalité par suicide | - | Taux de mortalité par suicide (pour 100 000 habitants) | 2016 | - | - | 4 |

FACTEURS DE RISQUE


| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|-----|-----|-----|
| | Usage nocif d'alcool | X | Consommation totale d'alcool par habitant, adultes de 15 ans et plus (litres d'alcool pur) | 2016 | 10 | 2 | 6 |
| | Sédentarité | X | Inactivité physique, adultes de 18 ans et plus (%) | 2016 | 28 | 33 | 30 |
| | Consommation de sel/sodium | X | Consommation moyenne de sel de la population, adultes de 20 ans et plus (g/jour) | 2010 | 9 | 9 | 9 |
| | Tabagisme | X | Consommation actuelle de tabac, adultes de 15 ans et plus (%) | 2016 | ... | ... | ... |
| | Tension artérielle élevée | X | Tension artérielle élevée, adultes de 18 ans et plus (%) | 2015 | 20 | 15 | 17 |
| | Diabète | X | Élévation du taux de glucose dans le sang, adultes de 18 ans et plus (%) | 2014 | 9 | 9 | 9 |
| | Obésité | X | Obésité, adultes de 18 ans et plus (%) | 2016 | 22 | 28 | 25 |
| | | | Obésité, adolescents âgés de 10 à 19 ans (%) | 2016 | 13 | 12 | 12 |
| | Pollution de l'air ambiant | - | Dépassement de la valeur limite de l'OMS pour la concentration annuelle de PM2,5 (par un multiple de) | 2016 | - | - | 2 |
| | Pollution de l'air à l'intérieur des habitations | - | Population dépendant principalement de carburants et de technologies polluants (%) | 2016 | - | - | <5 |

TENDANCES DES FACTEURS DE RISQUE SÉLECTIONNÉS CHEZ LES ADULTES


CONSOMMATION ACTUELLE DE TABAC

DONNÉES NON DISPONIBLES

OBÉSITÉ



TENSION ARTÉRIELLE ÉLEVÉE



RÉPONSE DES SYSTÈMES NATIONAUX

| | | | | | |
|--|--|---|---|------|-------------|
| | | | Proportion de la population à haut risque de développer des MCV ou avec des MCV | - | ... |
| | | | Proportion de personnes à haut risque recevant un traitement médicamenteux et des conseils pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux | - | ... |
| | Traitement médicamenteux pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux | X | Proportion de centres de soins de santé primaires déclarés comme offrant une stratification du risque de MCV | 2017 | Ne sait pas |
| | | | Déclaré avoir des guides sur les maladies cardiovasculaires qui sont utilisés dans au moins 50% des établissements de santé | 2017 | Non |
| | Médicaments essentiels contre les MNT et technologies de base pour traiter les principales maladies non transmissibles | X | Nombre de médicaments essentiels contre les MNT déclarés comme "généralement disponibles" | 2017 | 10 sur 10 |
| | | | Nombre de technologies essentielles contre les maladies non transmissibles déclarés comme "généralement disponibles" | 2017 | 3 sur 6 |

... = pas de données disponibles

Organisation mondiale de la Santé- Profils des pays pour les maladies non transmissibles (MNT), 2018.