

## قائمة البلدان 1

الاشتراطات والتوصيات الخاصة بتطعيم المسافرين الدوليين؛ ووضع الملاريا في كل بلد

### مقدمة

تشمل المعلومات المقدمة عن كل بلد الاشتراطات المعلنة وتوصيات المنظمة المقدمة للمسافرين بشأن التطعيم ضد الحمى الصفراء<sup>2</sup>. ويرد وصف موجز لوضع مخاطر الملاريا والوقاية منها عند الاقتضاء. وتُنكر أيضاً الاشتراطات المعلنة لكل بلد إن وجدت<sup>3,4</sup>.

وقد أُعدت هذه الوثيقة بعد الرجوع إلى الدول الأطراف، وهي تتضمن مساهمات من الوحدات التقنية الموجودة بالمقر الرئيسي للمنظمة ومن المكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة. ويتم بصفة سنوية الرجوع إلى الدول لتأكيد أو تحديث اشتراطات البلدان بشأن المسافرين الدوليين<sup>4</sup>. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تقديم خرائط مخاطر الحمى الصفراء بالنسبة للمسافرين الدوليين وتوصيات المنظمة، إلى الفريق الاستشاري العلمي والتقني المعني بإعداد خرائط جغرافية لمخاطر الحمى الصفراء<sup>5</sup> للمرجعة.

ويمكن تغيير اشتراطات البلدان في أي وقت. ومن المهم أن يتأكد المسافرون من معرفة اشتراطات البلد الذي يسافرون إليه عن طريق الرجوع إلى القنصلية أو السفارة المعنية. ويمكن الاطلاع على أحدث المعلومات التي تلقتها المنظمة من البلدان على الموقع الإلكتروني الخاص بمطبوعة "السفر الدولي والصحة" الصادرة عن المنظمة<sup>6</sup>.

### الحمى الصفراء

#### التطعيم ضد الحمى الصفراء

يتم التطعيم ضد الحمى الصفراء لغرضين مختلفين:

#### 1- الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي

تحمي البلدان نفسها من مخاطر وفادة فيروس الحمى الصفراء أو المزيد من انتشاره عن طريق وضع اشتراطات تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء. والبلدان التي تشترط دليلاً لإثبات التطعيم هي تلك التي قد يحدث أو لا يحدث فيها المرض، والتي يوجد بها البعوض الناقل للمرض بالإضافة إلى مضيف محتمل للحمى الصفراء من الثدييات العليا غير البشرية. وقد تسفر أي وفادة للفيروس إلى هذه البلدان من خلال مسافرين مصابين إلى انتشار الفيروس وتوطده، مما يؤدي إلى مخاطر دائمة بالعدوى تحيق بالسكان. وغالباً ما يُشترط دليل لإثبات تطعيم المسافرين القادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وأحياناً للمسافرين العابرين لتلك البلدان. وتجدر الإشارة إلى أن بعض البلدان تشترط على جميع المسافرين تقديم دليل لإثبات التطعيم.

1 في هذه المطبوعة يشير مصطلح "بلد" و "بلدان" إلى البلدان والأراضي والمناطق.

2 تنشر المنظمة هذه الاشتراطات لأغراض الإعلام فقط. ولا تشكل هذه المطبوعة تأييداً أو تأكيداً بأن مثل هذه الاشتراطات وضعت بموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية.

3 إن اشتراط بعض البلدان بشأن تطعيم الرضع فوق سن 6 أشهر من العمر لم يتخذ بناءً على توصية المنظمة (الفصل 6). ومع ذلك ينبغي إبلاغ المسافرين بهذا الشرط لدخول البلدان المعنية.

4 عندما تكون المعلومات متاحة، يتم ذكر تاريخ آخر تحديث أو تأكيد بين قوسين في قائمة البلدان.

5 للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمنظمة على الرابط التالي:  
<http://www.who.int/ith/yellow-fever-risk-mapping/en/>

6 الموقع الإلكتروني الخاص بمطبوعة "السفر الدولي والصحة" الصادرة عن المنظمة. انظر التحديثات الواردة في القسم الخاص بالمسافرين على الرابط التالي: <http://www.who.int/ith/en/>

وقد اقترح اجتماع الخبراء المعني بالحمى الصفراء والذي تم تنظيمه في عام 2010 أن المكوث في المطار لأقل من 12 ساعة للمسافرين العابرين للمناطق المعرضة لمخاطر الحمى الصفراء، يجعل مخاطر الإصابة بالحمى الصفراء تكاد تكون منعدمة، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى دليل لإثبات التطعيم. ويتم تقديم هذه المعلومات للدول الأعضاء في المنظمة، ولكن على المسافرين التأكد من الاشتراطات الخاصة بكل بلد عن طريق الاتصال بقنصلية أو سفارة البلد الذي يعتزمون زيارته.

والبلدان التي تشترط التطعيم ضد الحمى الصفراء للدخول تفعل ذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005). وتعتبر الحمى الصفراء الآن هي المرض الوحيد الذي يلزم المسافرين بتقديم إثبات للتطعيم ضده كشرط لدخول دولة طرف بموجب المرفق 7 من اللوائح الصحية الدولية. وقد تم إجراء تعديل مهم في أيار/ مايو 2014 حيث اعتمدت جمعية الصحة العالمية مرفقاً محدثاً (المرفق 7)، والذي يمد صلاحية شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء من 10 أعوام لمدة حياة الشخص. وقد دخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 11 تموز/ يوليو 2016.

إن حقيقة عدم وجود اشتراطات للبلدان بشأن التطعيم ضد الحمى الصفراء لا تعني انتفاء مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

## 2- حماية آحاد المسافرين الذين قد يتعرضون للإصابة بالحمى الصفراء

تعتمد مخاطر انتقال الحمى الصفراء في بلد ما على وجود الفيروس لدى الإنسان، أو البعوض أو الحيوان. وبما أن الحمى الصفراء عادة ما تفكك بمن لم يتم تطعيمهم، لذلك يوصى بتطعيم جميع المسافرين (مع استثناءات قليلة، كما ورد في الفصل 6) الذين سيزورون المناطق التي تشهد مخاطر انتقال الحمى الصفراء. ويقدم المرفق 1 من مطبوعة السفر الدولي والصحة قائمة موجزة بالبلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء بشكل كلي أو جزئي على النحو الذي تعرفه المنظمة، بالإضافة إلى قائمة البلدان التي تشترط تقديم دليل لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء كشرط للدخول.

وتحدد المنظمة تلك المناطق التي يوجد بها "مخاطر انتقال الحمى الصفراء" على أساس تشخيص حالات الحمى الصفراء لدى الإنسان أو الحيوان، ونتائج المسوحات المصلية للحمى الصفراء، ووجود نواقل ومستودعات حيوانية. وقد تم إنشاء الفريق الاستشاري العلمي والتقني المعني بإعداد خرائط جغرافية لمخاطر الحمى الصفراء في عام 2015 للحفاظ على خرائط محدثة لمخاطر الحمى الصفراء، ولتقديم إرشادات بشأن تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء بالطرق التي من شأنها تيسير السفر الدولي.<sup>8</sup>

وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بإعطاء المسافرين لقاح الحمى الصفراء مع مراعاة عدة عوامل، بما في ذلك مخاطر الأمراض المرتبطة بفيروس الحمى الصفراء والمصاحبة للسفر، والاشتراطات الخاصة بالبلد، واحتمال حدوث أحداث سلبية ضارة عقب التطعيم ضد الحمى الصفراء (الفصل 6). وتتوافر الخرائط الجغرافية والرسوم البيانية المتعلقة بالحمى الصفراء في الموقع الإلكتروني للمنظمة.<sup>9</sup> ويلخص الجدول التالي توصيات المنظمة المنقحة بشأن تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء.

7 قرار جمعية الصحة العالمية جصع67-13 والمرفق 7 المحدث من اللوائح الصحية الدولية (2005):

[http://www.who.int/ith/A67\\_2014\\_Annex-7-en.pdf?ua=1](http://www.who.int/ith/A67_2014_Annex-7-en.pdf?ua=1)

8 للاطلاع على المزيد من المعلومات، انظر الموقع الإلكتروني للمنظمة على الرابط التالي:

<http://www.who.int/ith/yellow-fever-risk-mapping/en/>.

9 انظر الخرائط الجغرافية والرسوم البيانية للحمى الصفراء الصادرة عن المنظمة على الرابط التالي:

<http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/maps/en/>، وعلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالحمى الصفراء في موقع المنظمة على الرابط التالي: <http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/>.

## توصيات المنظمة بشأن تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء

فئة التطعيم ضد الحمى الصفراء	الأساس المنطقي للتوصية
يوصى به	يوصى بتطعيم جميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر ضد الحمى الصفراء في المناطق التي يوجد بها بينات على انتقال فيروس الحمى الصفراء بشكل مستمر أو دوري.
بشكل عام، لا يوصى به	بشكل عام لا يوصى بالتطعيم ضد الحمى الصفراء في المناطق التي ينخفض فيها احتمال التعرض لفيروس الحمى الصفراء (لم يتم أبداً الإبلاغ عن حالات إصابة بالحمى الصفراء بين البشر، وتشير البينات فقط إلى انخفاض مستويات انتقال فيروس الحمى في الماضي). ومع ذلك، يمكن النظر في تطعيم مجموعة فرعية صغيرة من المسافرين إلى هذه المناطق المعرضين بشكل كبير لمخاطر التعرض للبعوض أو الذين يتعذر عليهم تلافي لسع البعوض. وعند النظر في التطعيم، ينبغي لأي مسافر أن يأخذ بعين الاعتبار مخاطر العدوى بفيروس الحمى الصفراء، واشتراطات دخول البلدان، وكذلك عوامل المخاطر الفردية (مثل العمر والحالة المناعية) المرتبطة بالتعرض للأحداث السلبية الضارة المرتبطة باللقاح.

### شلل الأطفال

في 5 أيار/ مايو 2014، أعلنت المديرية العامة للمنظمة أن انتشار فيروس شلل الأطفال على الصعيد الدولي يمثل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً بموجب اللوائح الصحية الدولية، وأصدرت توصيات مؤقتة للحد من انتشار فيروس شلل الأطفال البري على الصعيد الدولي. وفيما يلي التوصيات المتعلقة بالمسافرين الدوليين الوافدين من البلدان المتضررة:

#### 1- بالنسبة للدول التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال البري (WPV1) أو فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح (cVDPV1 أو cVDPV3) مع مخاطر محتملة للانتشار دولياً، يوصى بما يلي:

- ينبغي أن يتلقى جميع المقيمين والزوار الذين يمكثون لمدة طويلة (أي الذين يقيمون لأربعة أسابيع فأكثر) من جميع الأعمار جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ أو لقاح فيروس شلل الأطفال المعطل قبل السفر الدولي بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً.
- بالنسبة للمسافرين الدوليين الذين يسافرون بشكل عاجل (في غضون 4 أسابيع) ولم يتلقوا جرعة من لقاح فيروس شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ أو لقاح شلل الأطفال المعطل قبل السفر بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً، ينبغي أن يتلقوا جرعة من لقاح شلل الأطفال على الأقل عند المغادرة لأن هذا سيفيد أيضاً ولاسيما في حالة المسافرين الدائمين.
- ينبغي تزويد المسافرين بشهادة تطعيم دولية لإثبات التطعيم أو الانتفاء بالشكل المحدد في المرفق 6 من اللوائح بهدف تسجيل حصولهم على التطعيم ضد شلل الأطفال وإثباته.
- ينبغي تقييد السفر الدولي لأي مقيم يفترق إلى الوثائق التي تثبت حصوله على التطعيم المناسب ضد شلل الأطفال عند نقطة المغادرة. وينطبق هذا على المسافرين الدوليين في جميع نقاط المغادرة بغض النظر عن طريقة الانتقال (على سبيل المثال براً، جواً، بحراً).

#### 2- بالنسبة للدول التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح (cVDPV2) مع مخاطر محتملة للانتشار دولياً، يوصى بما يلي:

- ينبغي أن يتلقى جميع المقيمين والزوار الذين يمكثون لمدة طويلة جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل قبل السفر الدولي بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً، أما في حالة من يسافرون بشكل عاجل (في غضون 4 أسابيع)، فإنه يتعين أن يتلقوا جرعة على الأقل عند المغادرة.
- ينبغي أن يتم إعطاء المسافرين الذين حصلوا على هذا التطعيم وثيقة مناسبة لتسجيل حالة تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

وتتوافر أحدث المعلومات بشأن الدول الموبوءة المتضررة الآن، سواء تلك التي يفد منها المرض أم لا، والبلدان الأشد تأثراً، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال<sup>10</sup>.

وتتطلب كذلك بعض آحاد البلدان الخالية من شلل الأطفال دليلاً لإثبات التطعيم ضد شلل الأطفال للحصول على تأشيرة أو للدخول إلى أراضيها. وعلى المسافرين التأكد من الاشتراطات الخاصة بهذه البلدان عن طريق الاتصال بقنصلية أو سفارة البلد الذي يعتزمون زيارته.

## المالريا

يشمل الفصل 7 معلومات عامة عن المالريا، والتوزيع الجغرافي لها، وتفاصيل التدابير الوقائية. كما يوضح الفصل 3 التدابير الوقائية من لسع البعوض. ويقدم هذا القسم معلومات محددة عن كل بلد بما في ذلك التفاصيل الوبائية لجميع البلدان التي توجد بها مناطق موبوءة بالمالريا (التوزيع الجغرافي والموسمي، والارتفاع، والأنواع السائدة، والمقاومة المبلغ عنها). ويشير أيضاً إلى أنواع الوقاية الموصى بها. وتحدد أنواع الوقاية لكل بلد على أساس العوامل التالية: مخاطر الإصابة بالمالريا؛ والأنواع السائدة من طفيليات المالريا في المنطقة؛ ومستوى مقاومة العقاقير المبلغ عنها في البلد ومدى انتشارها؛ واحتمال التعرض للآثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن استخدام الأدوية الوقائية. فعندما تظهر كل من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة، يتم إعطاء الأولوية للوقاية من المالريا المنجلية. ومخاطر المالريا إذا لم تتجم "حصرياً" عن بعض الأنواع (مثل المتصورات المنجلية أو المتصورات النشطة)، فقد يتعرض المسافرون لمخاطر أي من أنواع الطفيليات، بما في ذلك أنواع العدوى المختلطة. وتنتشر مقاومة المتصورات المنجلية للكولوروكين والسلفادوكسين - بيريميثامين في الوقت الحالي تقريباً في العالم برمته، ولم تعد تذكر بشكل محدد في قائمة البلدان الواردة أدناه. ولم يعد لهذين الدواءين الآن أي دور في وقاية المسافرين من المالريا المنجلية أو علاجها. وتبعاً لنوع مخاطر المالريا في المنطقة المحددة من البلدان/ الأراضي المزارة فإن طريقة الوقاية الموصى بها قد تكون الوقاية فقط من لسع البعوض، أو الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام الوقاية الكيميائية بالكولوروكين و/ أو العلاج المستخدم في حالات الطوارئ. وينبغي أن يأخذ اختيار الأدوية المستخدمة في الوقاية الكيميائية في الحسبان نمط مقاومة الأدوية في المنطقة، على النحو الموضح في الجدول الوارد أدناه، حيث تشير الأحرف "أ"، "ب"، "ج" إلى نوع الوقاية. ويرجى ملاحظة أن هذا الجدول يتضمن كل سيناريوهات الحالات المحتملة للوقاية من جميع أنواع المتصورات التي تُسبب المالريا لدى الإنسان. وعلى سبيل المثال فإن الوقاية من المتصورات النولسية مدرجة في النوع "ب". ويتوافر المزيد من المعلومات عن المالريا، بما في ذلك المرتسمات القطرية<sup>11</sup> وخرائط التهديدات،<sup>12</sup> في الموقع الإلكتروني للمنظمة<sup>13</sup>.

### الجدول: مخاطر المالريا ونوع الوقاية

نوع الوقاية	مخاطر المالريا
الوقاية فقط من لسع البعوض	مخاطر انتقال المالريا محدودة للغاية
الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام الوقاية الكيميائية بالكولوروكين أو اتوفاكون البروغوانيل أو الدوكسي سيكلين أو الميفلوكين (يتم الاختيار وفقاً لأنماط مقاومة الأدوية المبلغ عنها والآثار الجانبية وموانع الاستخدام)	مخاطر المالريا غير المتعلقة بالمتصورات المنجلية

10 انظر الصفحة الإلكترونية للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال الخاصة بأماكن عمل المبادرة على الرابط التالي: <http://polioeradication.org/where-we-work/>. والصفحة الإلكترونية للمنظمة الخاصة بشلل الأطفال على الرابط التالي: <http://www.who.int/topics/poliomyelitis/en/>.

11 المرتسم القطري للمالريا. انظر: <http://www.who.int/malaria/publications/country-profiles/en/>.

12 خريطة تهديدات المالريا. انظر: <http://apps.who.int/malaria/maps/threats/>.

13 الصفحة الإلكترونية للمنظمة عن المالريا. انظر: <http://www.who.int/malaria/en/>.

الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام الوقاية الكيميائية باللاتوفاكون البروغوانيل أو الدوكسي سيكلين أو الميفلوكين (يتم الاختيار وفقاً لأنماط مقاومة الأدوية المبلغ عنها والآثار الجانبية وموانع الاستخدام)أ، ب

مخاطر ملاريا المتصورات المنجلية

النوع "ج"

أ بدلاً من ذلك، في حالة السفر إلى المناطق الريفية التي تنخفض فيها مخاطر الإصابة بالملاريا، يمكن الجمع بين الوقاية من لسع البعوض والعلاج المستخدم في حالات الطوارئ.  
ب في بعض المناطق التي تشهد الملاريا المقاومة للأدوية المتعددة، لم يعد يوصى باستخدام الوقاية الكيميائية بالميفلوكين. وتشمل هذه المناطق في الوقت الحالي كمبوديا وجنوب شرق ميانمار وتايلند.

## الأمراض الأخرى

تتوافر المعلومات عن أهم الأمراض المعدية التي تهدد المسافرين، وتوزعها الجغرافي، والاحتياطات المرتبطة بها، علاوةً على المعلومات عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، على الموقع الإلكتروني لمطبوعة السفر الدولي والصحة الصادرة عن المنظمة. 14، 15

14 الصفحة الإلكترونية لمطبوعة السفر الدولي والصحة الصادرة عن المنظمة والخاصة بالأمراض المعدية ذات المخاطر المحتملة بالنسبة للمسافرين، انظر: [http://www.who.int/ith/other\\_health\\_risks/infectious\\_diseases/en/](http://www.who.int/ith/other_health_risks/infectious_diseases/en/).

15 الصفحة الإلكترونية لمطبوعة السفر الدولي والصحة الصادرة عن المنظمة، انظر الوثيقة الخاصة باللقاحات وبالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، [http://www.who.int/ith/ITH\\_chapter\\_6.pdf?ua=1](http://www.who.int/ith/ITH_chapter_6.pdf?ua=1).

## أفغانستان

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملاريا (2019)

مخاطر الملاريا - تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة والمتصورات المنجالية في الفترة من أيار/ مايو حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2000 متر.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يجب أن يكون لدى المسافرين القادمين من بلدان موبوءة بشلل الأطفال دليل يثبت تطعيمهم ضد هذا المرض. وبالنسبة للمقيمين أو المسافرين الذين يمكثون في أفغانستان أكثر من 4 أسابيع، فيمكن أن يُشترط تقديم دليل على التطعيم ضد شلل الأطفال عند مغادرة أفغانستان. وينبغي تلقي هذا التطعيم قبل فترة تتراوح بين 4 أسابيع و12 شهراً من المغادرة.

## ألبانيا

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الجزائر

### الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملاريا (2019)

تم الإشهاد على خلو البلد من الملاريا في عام 2019.

## ساموا الأمريكية، انظر الولايات المتحدة الأمريكية

16 في هذه المطبوعة، يشير مصطلح "بلد" و"بلدان" إلى البلدان والأراضي والمناطق.

17 قائمة البلدان والأراضي التي قامت المنظمة بالإشهاد على خلوها من الملاريا، انظر:

<https://www.who.int/malaria/areas/elimination/malaria-free-countries/en/>.

## أندورا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## أنغولا

### الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لكل المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### المالريا (2018)

تتواجد مخاطر المالريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## أنغولا، انظر المملكة المتحدة

## أنتيغوا وبربودا

### الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الأرجنتين

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر المتجهين الى مقاطعتي كورينتس ومسيونيس

لا يوصى به بشكل عام للمسافرين المتجهين إلى مقاطعة فورموسا ومناطق محددة من مقاطعات تشاكو، وجوجوي، وسالتا

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق ومقاطعات غير المذكورة أعلاه.

### المالريا (2019)

تم الإشهاد على خلو البلد من المالريا في عام 2019.

18 قائمة البلدان والأراضي التي قامت المنظمة بالإشهاد على خلوها من المالريا، انظر:

<https://www.who.int/malaria/areas/elimination/malaria-free-countries/en>.

## أرمينيا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## أروبا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. ولن يُحظر الدخول في حال تعدد تقديم شهادة صالحة للتطعيم.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزيرة أسينشين، /نظر المملكة المتحدة

## أستراليا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (باستثناء جزر غالاباغوس في الإكوادور)، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، (مع وجود نفس الاستثناء المذكور أعلاه).

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## النمسا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## آذربيجان

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات /النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في المناطق المنخفضة، وخاصة في المنطقة الواقعة بين نهري كورا وأراكس. ولا يوجد حالات انتقال للملايا في مدينة باكو (العاصمة). ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مكتسبة محلياً منذ عام 2013.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

## جزر البهاما

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## البحرين

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## بنغلاديش

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملاريا (2019)

تتواجد مخاطر الملاريا طوال العام وتبلغ ذروتها من أيار/ مايو وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر. ولكن الانتقال يحدث في 13 منطقة فقط من مجموع المناطق البالغ 64 منطقة وذلك في الأرياف والمراكز الحضرية على حد سواء. وترتفع المخاطر في مرتفعات جبل شيتاغونغ (بندريان، رانجاماتي، خاغراشاري)، ومنطقة شيتاغونغ، ومنطقة كوكس بازار. وتوجد مخاطر منخفضة في مناطق هوبيجونجي، كوريجرام، مولزيبزار، ميمينسينغ، نيتراكونا، شيربور، سومانجونج، سيلهيت. أما معظم أنحاء البلاد، بما فيها مدينة دكا، فإنها غير معرضة لمخاطر الإصابة بالملاريا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## بربادوس

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (باستثناء غيانا وجزيرة ترينيداد ما لم تكن هناك فاشية قائمة في المناطق الحضرية).

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## بيلاروس

### الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## بلجيكا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## بليز

### الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة في بعض مناطق ستان كريك ولا تكاد تذكر في أي مكان آخر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

جميع المسافرين القادمين من بلدان موبوءة بشلل الأطفال وكذلك مواطني بليز ومن يعيشون في بليز ويسافرون إلى بلدان تأكدت فيها حالات شلل الأطفال، يجب أن يكون لديهم دليل يثبت تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

## بنن

### الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجارية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## برمودا، /نظر المملكة المتحدة

**الحمى الصفراء (2019)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**الملاريا (2019)**

تتواجد مخاطر الملاريا طوال العام في الحزام الجنوبي من البلاد والذي يضم سبع مناطق: شوكا، داجانا، بيماجتشل، سامدروب، جونخار، سامتسي، ساريانغ، زمجانج. ولم تحدث حالات انتقال في المناطق الأربعة التالية: بومنانغ، جاسا، بارو، تيمفو. وتحدث حالات انتقال موسمية خلال أشهر الصيف الممطرة في المناطق المحورية في بقية بوتان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق ومواسم التعرض للمخاطر: "جيم"

**دولة بوليفيا المتعددة القوميات**

**الحمى الصفراء (2018)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر المتجهين إلى المناطق التالية شرق جبال الانديز والتي يقل ارتفاعها عن 2300 متر: جميع أجزاء بيني وباندو وسانتا كروز، ومناطق معينة من تشوكيساكا وكوتشابامبا ولا باز وتاريخا.

ولا يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق يزيد ارتفاعها على 2300 متر وجميع المناطق غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك مدينتا لاباز وسوكري.

**الملاريا (2018)**

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس برمتها تقريباً (99.9%) عن المتصورات النشطة طوال العام في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها على 2500 متر. وتصل مخاطر الملاريا إلى ذروتها في المناطق الشمالية من ليني وباندو، ولاسيما في محليات ريبيرالتا وجواياراميرين وسينا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "باء"

**بونير**

**الحمى الصفراء (2019)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**البوسنة والهرسك**

**الحمى الصفراء (2017)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من أو العابرين لبلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر حتى أيار/ مايو وحزيران/ يونيو في الأجزاء الشمالية من البلاد: بويروا، بوتيتي، تشوبي، نجاميلاند، ومناطق أوكافانغو وتوتومي/ المناطق الفرعية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

### البرازيل

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر عند الانتقال إلى المناطق التالية: ولايات أكر، وأمابا، وأمازوناس، المنطقة الاتحادية (بما في ذلك العاصمة برازيليا)، إسبيريتو سانتو، غوياس، مارانهاو، ماتو غروسو، ماتو غروسو دو سول، ميناس، جيرابيس، بارا، بارانا، بياوي، ريو دو جانيرو، ريو غراندي دو سول، روندونيا، رورايما، سانتا كاتارينا، ساو باولو، توكانتيوز؛ وكذلك مناطق معينة من ولاية باهيا. ويوصى أيضاً بتطعيم المسافرين لزيارة شلالات اجوازو.

ولا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك مدينتا فورتاليزا وريسيفي.

### الملايا (2019)

تظهر مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات النشطة (88.8%)، والمتصورات المنجلية (10.6%)، والعدوى المختلطة (0.5%) في معظم مناطق الغابات التي يقل ارتفاعها عن 900 متر داخل تسع ولايات من منطقة الأمازون (أكر، أمابا، أمازوناس، مارانهاو، ماتو غروسو [الجزء الشمالي]، بارا [باستثناء مدينة بيليم]، روندونيا، رورايما، توكانتيوز [الجزء الغربي]، وتتفاوت كثافة الانتقال من بلدية إلى أخرى، وتزيد في مناطق التعدين بالغابات، وفي المستوطنات الزراعية في مناطق السكان الأصليين، وفي بعض المناطق الحضرية على أطراف كروزيرو دو سول، وماناوس، وبورتو فيلهو. وتتواجد الملايا أيضاً على أطراف المدن الكبرى مثل بوا فيستا، ماكابا، مرابا، ريو برانكو، شنترين. إن مخاطر انتقال الملايا في الولايات خارج المنطقة الإدارية للأمازون لا تكاد يذكر أو غير موجودة على الإطلاق، ولكن ثمة مخاطر متبقية لانتقال المتصورات النشطة في مناطق الغابات الأطلسية في ولايات ساو باولو، وميناس جيريس، وريو دي جانيرو، وإسبيريتو سانتو. وتتوافر المعلومات المفصلة بشأن الوضع الوبائي للملايا في البرازيل على الرابط الإلكتروني [www.saude.gov.br/malaria](http://www.saude.gov.br/malaria).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "باء" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات النشطة؛ و"جيم" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات المنجلية.

### جزر فرجن البريطانية، انظر المملكة المتحدة

## إقليم المحيط الهندي البريطاني

### الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### بروني دار السلام

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2019)

تم الإبلاغ عن حالات إصابة بالمتصورات النولسية البشرية.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "باء"

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يلزم تلقي المسافرين القادمين من البلدان المتضررة بشلل الأطفال (البلدان التي يفد منها شلل الأطفال) للتطعيم المضاد لهذا المرض.

### بلغاريا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### بوركيينا فاسو

### الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجانية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2019)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

كابو فيردي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر محدودة للملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية في الفترة من آب/ أغسطس وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في جزر سانتياجو وجزر بوا فيستا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

كمبوديا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2019)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة طوال العام في المناطق الريفية التي تغطيها الغابات. ولا تتعرض مناطق بنوم بنه والمناطق القريبة من تونلي ساب (سيم ريب) للمخاطر. أما المخاطر التي تهدد المنطقة السياحية المحيطة بأنغكور وات فلا تكاد تذكر. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للأرتيسونات، والميفلوكين، واللوميفانترين والبيراكوين في غرب كمبوديا، وتمتد هذه المقاومة إلى وسط البلاد. كما تم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين في شرق كمبوديا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## الكاميرون

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لكل المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## كندا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر كناري، انظر أسبانيا

جزر كايمان، انظر المملكة المتحدة

## جمهورية أفريقيا الوسطى

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لكل المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## تشاد

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لكل المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والذين يذهبون إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق ضمن الصحراء الكبرى.

## الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجانية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## شيلي

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الصين

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. ولا ينطبق هذا الشرط على المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2019)

حققت الصين نجاحاً هائلاً في القضاء على الملايا منذ عام 2017. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات أصلية.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

## جزيرة كريسماس

(المحيط الهندي)

### الحمى الصفراء (قبل 2019)

نفس الاشتراطات الموجودة في الجزيرة الأسترالية.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## كولومبيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من أنغولا، والبرازيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد من البلدان المذكورة.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم كل المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين إلى كولومبيا باستثناء المناطق الموصوفة أدناه.  
بشكل عام لا يوصى بتطعيم المسافرين المتجهين إلى مدن بارانكيا وكالي وقرطاجنة وميدلين.  
لا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300 متر، ومقاطعة سان أندريس يا بروفيدينسيا، والعاصمة بوغوتا.

## الملايا (2018)

ترتد مخاطر الملايا في البلديات التالية في مناطق أنتيوكيا (البحري، فيجيا ديل فويرتي، سيجوفيا تارزا، زراجوزا، كاسيرس، نيشي، موريندو، أنوري، ريميدوس، موتاتا، فرونتينو، سان بيدرو يه أورابا، دابيبيا، فالديفيا، كوكاسيا)، وأمازوناس (تاراباكا، لا بدريرا، بويرتو نارينيو، ليتيسيا، ميريتي-بارانا، لا شوريرا)، وبوليفار (مونتو كريستو، نوروسي، تيكويسيو، سان بابلو)، وكوكا (تيمبيكي)، وشوكا (باغادو، نوفيتا، ليورو، تادو، ريو كيتو، إل كانتون ديل سان بابلو، ريو إرو، أتراتو، بوخايا، سان خوزيه ديل بالمار، كيبو، باخو باودو، ميديو سان خوان، كارمن دي دارين، نوكي، ميديو باودو، ألتو باودو، إستميئا، باهيا سولانو، ميديو اتراتو، خواردو، سيبي، يونيون باناماريكانا، كوندوتو، شيرتيغي)، وكوردوبا (بويرتو ليبيرتادور، تييرالتا)، وغواينيا (إنيريدا، لا غوادالوبي)، ونارينيو (روبيرتو بايان، أولايا هيريرا، إيل شاركو، موسكيرا، بارياكواس، سانتا باريرا، ماغوي، فرانثيسكو بيزارو، سان إنديس دي توماكو)، وريسارلدا (بويلو ريكو، لا فيرجينيا)، وفالي ديل كوكا (كارتاغو)، وفوبيس (تارايرا، يافاراتي)، وفيشادا (بويرتو كارينيو، كوماريبو).

وهناك مخاطر معتدلة للملايا في البلديات التالية في مناطق أنتيوكيا (أروا، شيفغورودو، أبارتادو، نيكوكلي، يوندو)، وأمازوناس (إيل إنكانتو، بويرتو سانتاندير)، وبوليفار (سانتا روزا ديل سور، ريو فييخو)، وكوكا (غواي، لوبيز)، وشوكو (إيل ليتورال دي سان خوان، ريسوشيو، أكاندي، أونغيا)، وكوردوبا (سان خوزيه دي أوري، لا أبارتادا) وغوافياري (سان خوزيه دي غوافياري، ميرافلوريس، كالامار، إيل ريتورنو)، ونارينيو (لا تولا)، وفوبيس (باكوا).

وثمة مخاطر أقل في بعض بلديات أمازوناس، وكاكيتا، وغوافياري، وغولينا، وميتا، ويوتومايو، وفابوبيس، وفيشادا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في جميع المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## جزر القمر

### الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## الكونغو

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## جزر كوك

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## كوستاريكا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء مع إضافة تنزانيا وزامبيا في إقليم أفريقيا؛ واستثناء الأرجنتين وبنما في إقليم الأمريكتين؛ ومع المواصفات التالية لتلك البلدان: كولومبيا (جميع أنحاء البلد باستثناء بارانكيا، كالي، كارتاجينا، ميدابين، سان أندريس بروفينديسيا يا بوغوتا)؛ وإكوادور (تتطبق فقط على مورونا-سانتياغو، نابو، أوريلانا، باستازا، سوكونمبيوس يا زامورا-شنشيببي، وتستبعد بقية البلد)؛ وباراغوي (جميع أنحاء البلد باستثناء أسانسيون العاصمة)؛ وبيرو (جميع أنحاء البلد باستثناء ليما العاصمة، كوزكو، إيل ماشو بيكشو، لا روتا دي لو إينكاس، لامبايكي، تومبيس، بيورا، كاخاماركا)؛ وترينيدادا وتوباغو (جميع أنحاء البلد باستثناء المناطق الحضرية لبورت أوف سبين، وللمسافرين العابرين أو الذين تقتصر مسارات تنقلاتهم على جزيرة توباغو).

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملاريا (2019)

على مدى التاريخ كانت مخاطر الملاريا المنخفضة للغاية تعزى بشكل حصري تقريباً إلى المتصورات النشطة. وهناك مخاطر ضئيلة أو لا تكاد تذكر بشأن انتقال الملاريا في البلاد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

## كوت ديفوار

### الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لكل المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## كرواتيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## كوبا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

قبرص

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الجمهورية التشيكية

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة بشكل محدود في بعض المناطق الجنوبية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجانية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## الدانمرك

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## جيبوتي

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملاريا (2019)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## دومينيكا

### الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الجمهورية الدومينيكية

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من ولايات مينا جيريس، وإسبريتو سانتو، وساو باولو، وريو دي جانيرو في البرازيل، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار ولاية من الولايات البرازيلية ذاتها المذكورة أعلاه.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملاريا (2019)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام وخاصة في المقاطعات الغربية لداجابون والياس بينا وسان خوان. وفي عام 2015 ارتفعت معدلات الانتقال في المنطقة الوطنية ومقاطعتي ساننتو دومينجو ولا ألتاجراسيا، ولاسيما في منطقة بافارو. وتعتبر المخاطر في المناطق الأخرى منخفضة بدرجة لا يعتد بها. ولا يوجد أي بينات على مقاومة المتصورات المنجلية لأي دواء مضاد للملاريا.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

**الحمى الصفراء (2019)**

الإشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من البرازيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد من البلدان المذكورة.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والمتجهين إلى المقاطعات الواقعة شرق جبال الأنديز والتي يقل ارتفاعها عن 2300 متر: مورون سانتياغو، نابو، أوريلانا، باستازا، سوكونمبيوس، زامورا-شنشيببي، ومقاطعة إزميرالدا غرب كوروديليرا.

وبشكل عام لا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المقاطعات التالية غرب جبال الأنديز بما فيها تلك التي يكون ارتفاعها أقل من 2300 متر: غواياس، لوس ريوس، سانتا هيلينا، سانتو دومينغو دي لوس تساشيلاس، ومناطق معينة من ازواي، بوليفار، كنار، كارشي، شمبورازو، كوتوباكسي، أورو، إيمبابورا، لوجا، بيتشينتشا، تونجراهوا.

ولا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300 متر، ومدينتي غواياكيل وكيكو، وجزر غالاباغوس.

**الملايا (2019)**

تتواجد مخاطر الملاريا، الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (67%) والمتصورات المنجلية (33%)، طوال العام في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1500 متر، مع وجود مخاطر معتدلة في المقاطعات الساحلية. وتخفض المخاطر في كيتو وفي المقاطعات التي تشكل جزءاً من المنطقة الواقعة بين جبال الأنديز أو إقليم سييرا. وتتواجد مخاطر ملاريا المتصورات النشطة في بعض مقاطعات البلد، بصفة أساسية في إقليم الأمازون، ولاسيما مقاطعات مورون سانتياغو، وباستازا، وأوريلانا، وسوكومبيوس. وتتواجد مخاطر ملاريا المتصورات المنجلية في بعض مقاطعات البلد مع انتشارها بصفة أساسية على الساحل، ولاسيما مقاطعة إزميرالدا علاوةً على إقليم الأمازون، ولاسيما مقاطعتي باستازا ومورانو سانتياغو.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

**مصر****الحمى الصفراء (2019)**

الإشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع إضافة إريتريا ورواندا والصومال وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا) وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع نفس الإضافات المذكورة أعلاه). وفي حالة عدم وجود شهادة تطعيم، يتم احتجاز الشخص في الحجر الصحي لمدة قد تصل إلى 6 أيام من تاريخ مغادرة المنطقة المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**الملايا (2019)**

تتواجد مخاطر محدودة جداً للملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في محافظة الفيوم. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات أصلية منذ عام 1998.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: لا توجد

## الإشترطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يُطلب التطعيم ضد شلل الأطفال بغض النظر عن العمر وحالة التطعيم. وللحصول على تأشيرة دخول يشترط تقديم المسافرين القادمين من أفغانستان، ونيجيريا، وباكستان، وياو غينيا الجديدة، والصومال دليلاً لإثبات تلقي جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل وذلك على شكل شهادة تطعيم دولية، على النحو المحدد في المرفق 6 من اللوائح الصحية الدولية، صادرة خلال الـ 12 شهراً السابقة وقبل المغادرة بنحو 4 أسابيع على الأقل. كما أن على جميع المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، والنيجر، والجمهورية العربية السورية تقديم دليل لإثبات التطعيم بلقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل.

## السلفادور

### الحمى الصفراء (2019)

الإشترطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2019)

تتواجد مخاطر محدودة جداً للملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة في المناطق الريفية المعرضة للهجرة من بلدان وسط أمريكا. ويتم الإبلاغ عن حالات متفرقة من ملايا المتصورات النشطة من أجزاء معينة من البلاد. توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

## غينيا الاستوائية

### الحمى الصفراء (2019)

الإشترطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في جميع أنحاء البلد. توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## إريتريا

### الحمى الصفراء (2019)

الإشترطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى الولايات التالية: أنسيبا، دبوب، غاش بركا، ماي كل، سمنوي كي بهري.

لا يوصى به لجميع المناطق الأخرى غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك جزر أرخبيل دهلك.

### الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات المنجنية (65%) والمتصورات النشطة (35%) طوال العام في جميع أنحاء البلد التي يقل ارتفاعها عن 2200 متر. ولا توجد مخاطر في أسمره.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## إستونيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## إسواتيني

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في كل الأراضي الواطنة (أساساً بيغ بيند، مهلومي، سيمونيه، تشهانيني). وتصل المخاطر إلى ذروتها من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى نهاية أيار/ مايو.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## إثيوبيا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر باستثناء ما سيلبي أدناه.

لا يوصى بالتطعيم للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مقاطعة أفار والمقاطعات الصومالية.

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية بنسبة 60% والمتصورات النشطة بنسبة 40% طوال العام في جميع أنحاء البلد التي يقل ارتفاعها عن 2000 متر. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين. ولا توجد مخاطر للملايا في أديس أبابا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## جزر فولكلاند (مالفيناس)، /نظر المملكة المتحدة

## جزر فارو

### الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## فيجي

### الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## فنلندا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## فرنسا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## غيانا الفرنسية

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لجميع المسافرين من عمر عام واحد فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2018)

ترتفع مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية بنسبة (45%)، والمتصورات النشطة بنسبة (55%) طوال العام في 9 بلديات من الإقليم الحدودي مع البرازيل (وادي نهر أويابوكوبي) وسورينام (وادي نهر ماروني ادي). وتتنخفض مخاطر انتقال الملايا في البلديات الـ 13 الأخرى أو لا تكاد تذكر. وتم الإبلاغ عن مقاومة امتصاصات المنجلية للأدوية المتعددة في المناطق الخاضعة لتأثير الهجرة البرازيلية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## بولينزيا الفرنسية

### الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لجميع المسافرين من عمر عام واحد فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

جزر غالاباغوس، انظر إكوادور

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2013)

يشترط التطعيم المضاد لالتهاب السحايا للمكورات السحائية

الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2018)

قد تتواجد مخاطر محدودة للملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة محلياً في الفترة من حزيران/ يونيو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في الجزء الشرقي من البلاد على الحدود مع أذربيجان. ولم يتم الإبلاغ عن حالات مكتسبة محلياً منذ عام 2010.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2018)

يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من البلدان والأراضي المعرضة لمخاطر انتقال شلل الأطفال. وبالنسبة للمسافرين الذين لم يتم تطعيمهم أو تعذر عليهم تقديم شهادة التطعيم، يعرض عليهم تلقي لقاح شلل الأطفال العموي عند الحدود.

## ألمانيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## غانا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## جبل طارق، انظر المملكة المتحدة

## اليونان

### الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2017)

تتواجد مخاطر محدودة للغاية للملايا (المتصورات النشطة فقط) في الفترة من أيار/ مايو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في مناطق زراعية معينة عالية المخاطر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق الزراعية العالية المخاطر: "ألف"

## غرينلاند

### الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## غرينادا

### الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**الحمى الصفراء (2019)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

غوام، انظر الولايات المتحدة الأمريكية

**غواتيمالا**

**الحمى الصفراء (2017)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**الملايا (2017)**

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (99.9%) طوال العام في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1500 متر.

وتصل مخاطر الملايا إلى نروتها في أقسام إيسكوينتلا (ولاسيما بلديات جوميرا، ماسجوا، سانتا لوسيا، كوتزوماالجوبا، تيكويزات) وألتا فيراباز (في مقاطعات تليمان، بانزوس، لا تينتا).

ومخاطر الملايا معتدلة في أقسام سوشيتييكويز وريتالهللو وإيزابل.

وهذه المخاطر منخفضة في بقية الأقسام (شيكيومالا، زاكابا، باجا فيراباز، سان ماركوس، بيتن، جوتيابا، جالابا، إيلبروجرسو، سانتا روزا، غواتيمالا، وشيمالتانجو، هوهوتيانجو، كيشي).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "باء"

**غينيا**

**الحمى الصفراء (2019)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

**الملايا**

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## غينيا - بيساو

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لجميع المسافرين من عمر عام واحد فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملاريا (2019)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## غيانا

### الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملاريا (2018)

ترتفع مخاطر الملاريا الناجمة عن المتصورات النشطة (36%) والمتصورات المنجلية (53%) وأنواع العدوى المختلطة (11%) طوال العام في جميع المناطق الداخلية. وترتفع المخاطر في المناطق 1 و7-9، وتتنخفض للغاية في المناطق 3-6. وقد تم الإبلاغ عن حالات متفرقة من الملاريا من الحزام الساحلي المكتظ بالسكان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## هايتي

### الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد. ولم يتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للكلوروكين.

التوصيات الخاصة بالوقاية: "جيم"

## هندوراس

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات النشطة (79%) والمتصورات المنجلية (20%) وأنواع العدوى المختلفة (0.8% ~) حيث ترتفع مخاطر انتقال المتصورات النشطة في أقسام كولون وغراسياس آديوس، وتكون معتدلة في أتلانتيدا، الباراييسو، اولانجو، بي يورو. وترتفع مخاطر انتقال المتصورات المنجلية في كولون وغراسياس آديوس. ولم يتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للكولوروكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "باء" في مناطق مخاطر المتصورات النشطة والمخاطر المختلفة؛ و"جيم" في مناطق مخاطر المتصورات المنجلية

## هنغاريا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## أيسلندا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الهند

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يتم احتجاز كل من يصل براً أو بحراً (باستثناء الأطفال حتى سن 9 أشهر) بدون شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء في حالة عزل لمدة تصل إلى 6 أيام إذا كان هذا الشخص (1) قد وصل في غضون 6 أيام من مغادرة منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، أو (2) عبر مثل هذه المنطقة (باستثناء الركاب وأفراد الطاقم الذين، مكثوا طوال مدة العبور داخل المطار ووافق المسؤول على هذا الإعفاء)، أو (3) وصل على متن سفينة بدأت رحلتها أو توقفت في أي ميناء في منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء حتى 30 يوماً قبيل الوصول إلى الهند، ما لم يكن قد تم إبادة الحشرات في هذه السفينة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، أو (4) وصل على متن طائرة قادمة من منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وتم إبادة الحشرات بها وفقاً للقواعد الهندية للصحة العمومية بالطائرات، لعام 1954، أو على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

والبلدان والمناطق التي ينظر إليها باعتبارها معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء هي، في أفريقيا: أنغولا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، كينيا، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب السودان، السودان، توغو، أوغندا. وفي الأمريكتين: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، إكوادور، غيانا الفرنسية، غيانا، بنما، باراغواي، بيرو، سورينام، ترينيداد وتوباغو (ترينيداد فقط)، جمهورية فنزويلا البوليفارية. ملاحظة: عندما يتم الإبلاغ عن حالة حمى صفراء في أي بلد، تعتبر حكومة الهند أن هذا البلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء ويتم إضافته إلى القائمة الواردة أعلاه.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة طوال العام في جميع أنحاء البلد التي يقل ارتفاعها عن 2000 متر. ومعظم تبليغات الملايا في الهند ترد من الأجزاء الشرقية والوسطى ومن الولايات التي تضم مناطق غابية، وجبلية، وقبلية واسعة. وتشمل هذه الولايات أوديشا، وتشهاتيسجاره، وجهارخاند، و ماهيا براديش، ومهارثرا، وبعض الولايات الشمالية الشرقية مثل تريبورا، وميغالايا، وميزورام. ولا توجد حالات انتقال في أجزاء من ولايات هيماشال براديش، وجامو وكشمير، وسيكيم.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2018)

يشترط تقديم دليل لإثبات تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال قبل أربعة أسابيع على الأقل من المغادرة للمسافرين الوطنيين المقيمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال (أفغانستان، نيجيريا، باكستان) والبلدان المعرضة لسراية فيروس شلل الأطفال عقب الوفاة (جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، كينيا، الصومال، الجمهورية العربية السورية).

## إندونيسيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا طوال العام في معظم مناطق المقاطعات الخمس الشرقية وهي شرق نوسا تينغارا، مالوكو، مالوكو الشمالية، بابوا، بابوا الغربية. وفي الأجزاء الأخرى من البلاد، تظهر مخاطر الملايا في بعض المناطق، باستثناء بلدية جاكرتا، وفي المدن والمناطق الحضرية، ومناطق المنتجعات السياحية الرئيسية. وتم الإبلاغ عن مقاومة/المتصورات/النشطة للكولروكين. كما جرى الإبلاغ عن حالات إصابة بالمتصورات النولسية البشرية في محافظة كاليمانتان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019):

يشترط تقديم دليل على التطعيم المضاد لالتهاب السحايا بالمكورات السحائية (المجموعات A، C، Y، W-135) للمسافرين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية أو القادمين منها.

## جمهورية إيران الإسلامية

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة ومخاطر محدودة للغاية للمتصورات المنجلية في الفترة من آذار/ مارس إلى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في المناطق الريفية من مقاطعات هرمزكان وكرمان (الجزء الاستوائي) والجزء الجنوبي من سيستان وبلوشستان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2018)

يشترط تقديم دليل لإثبات تلقي التطعيم المضاد لشلل الأطفال قبل السفر إلى إيران بفترة تتراوح بين 4 أسابيع و12 شهراً لجميع المسافرين من كل الأعمار القادمين من بلد موبوء بشلل الأطفال (أفغانستان، نيجيريا، باكستان). وإذا ما تعذر تقديم مثل هذه الشهادة فإن المسافرين سيتلقون جرعة من اللقاح المضاد لشلل الأطفال عند الدخول.

## العراق

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر محدودة للملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة في الفترة من أيار/ مايو إلى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في المناطق الشمالية التي يقل ارتفاعها عن 1500 متر (محافظات دهاوك وأرييل والسليمانية). ولم يتم الإبلاغ عن أية حالات أصلية منذ عام 2009.

توصية المنظمة بشأن الوقاية بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: لا توجد

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2018)

يلزم التطعيم ضد شلل الأطفال لجميع المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بشلل الأطفال وللمسافرين من العراق إلى البلدان الموبوءة بشلل الأطفال.

## أيرلندا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## إسرائيل

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## إيطاليا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## جامايكا

### الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## اليابان

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الأردن

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يشترط تقديم المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال التي تحددها المنظمة ما يثبت الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال القموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل خلال الـ 12 شهراً السابقة وقبل المغادرة بنحو 4 أسابيع على الأقل للحصول على تأشيرة دخول.

## كازاخستان

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## كينيا

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر باستثناء ما يلي.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: المقاطعة الشمالية الشرقية برمتها؛ ولايات كيليفي، كوالي، لامو، ماليندي، تاناريفر في المنطقة الساحلية؛ ومدينتي نيروبي ومومباسا.

## الملايا (قبل 2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد. وعادة ما تكون المخاطر منخفضة في مدينة نيروبي والمناطق المرتفعة (التي تزيد على 2500 متر) في المقاطعات الوسطى والشرقية ونيانزا والوادي المتصدع والمقاطعات الغربية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## كيريباتي

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الكويت

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## قيرغيزستان

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الملايا (قبل 2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد إلا في فينتيان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## لاتفيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يلزم تطعيم جميع المسافرين القادمين من البلدان المتضررة أو المتوجهين إليها ضد شلل الأطفال، وفقاً لتوصيات المنظمة. كما يلزم تقديم دليل لإثبات التطعيم المضاد لالتهاب السحايا بالمكورات السحائية (المجموعات A، C، Y، W-135) للمسافرين لإداء الحج، والعمرة، وللمغادرين إلى بعض البلدان الأفريقية.

ليسوتو

الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 6 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

ليبيريا

الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجانية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

ليبيا

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يشترط تقديم دليل لإثبات التطعيم المضاد لالتهاب السحايا بالمكورات السحائية (المجموعات A، C، Y، W-135). كما يشترط تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال قبل فترة تتراوح بين 4 أسابيع و12 شهراً من الدخول للمسافرين القادمين من أفغانستان وباكستان.

## ليختنشتاين

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## ليتوانيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## لكسمبرغ

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## مدغشقر

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### المالريا (2018)

تتواجد مخاطر المالريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد، مع وجود أعلى درجة من المخاطر في المناطق الساحلية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## جزر ماديرا، انظر البرتغال

## ملاوي

### الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## المالريا (2018)

تتواجد مخاطر المالريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## ماليزيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### المالريا (2019)

توجد مخاطر المالريا فقط في بؤر محدودة في المناطق النائية البعيدة لولايات صباح وسراواك والمناطق الوسطى من شبه جزيرة ماليزيا. وتخلو المناطق الحضرية، والضواحي، والمناطق الساحلية من المالريا. وتم الإبلاغ عن العدوى بالمتصورات النولسية البشرية.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## ملديف

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

يشترط تقديم دليل على تطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين والمغادرين البلدان التي يفد منها فيروس شلل الأطفال بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين.

## مالي

### الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر ويسافرون الى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.  
لا يوصى به لجميع المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق ضمن الصحراء الكبرى.

### المالريا (2018)

تتواجد مخاطر المالريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. وبناءً على أسباب وبائية قد يتم عزل أو ترصد الرضع ممن يقل عمرهم عن 9 أشهر في حالة وصولهم من منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر مارشال

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

مارتينيك

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

موريتانيا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والمتجهين إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.  
لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق ضمن الصحراء الكبرى.

الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجبية طوال العام في جميع أنحاء البلاد، ما عدا المناطق الشمالية (دخلة - نواذيبو وتيريس - زمور). وفي أدرار وإنشيري تظهر مخاطر الملاريا خلال موسم الأمطار (من تموز/ يوليو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر).  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

مايوت

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2019)

انخفاض كبير في عبء الملاريا مع انتقال الجزيرة إلى مرحلة القضاء على المرض. وهناك مخاطر ملاريا منخفضة تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجبية طوال العام.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

المكسيك

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة بشكل متقطع طوال العام في بعض المناطق الريفية التي لا يرتادها السياح في كثير من الأحيان وتوجد مخاطر منخفضة في بعض المحليات في ولاية تشياباس الدولة (كوستا). وتوجد المحليات ذات المخاطر المنخفضة للغاية في ولايات تشيواوا، دورانجو، ناياريت، كوينتانا رو وسينالوا.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

موناكو

الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## منغوليا

### الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الجبل الأسود

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## مونتسرات

### الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## المغرب

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يلزم تقديم شهادة دولية بالتمنيع تثبت حصول جميع المسافرين القادمين من بلدان متضررة بشلل الأطفال على جرعة من لقاح شلل الأطفال خلال الـ 12 شهراً السابقة وقبل المغادرة بنحو 4 أسابيع.

## موزامبيق

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2019)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في المناطق الريفية، والجبلية، والغابية النائية من البلاد، وكذلك في بعض المناطق الساحلية في ولاية راكين. ولا يوجد انتقال للحالات في المدن والمناطق الحضرية. وعلى الرغم من أن السهول الوسطى والمنطقة الجافة عموماً خالية من الملاريا ولكن لاتزال هناك بعض جيوب الانتقال. وقد أبلغت ولاية كايبين والجزء الشرقي من ولاية شان عن مقاومة المفلوكين. ويشتهر في ظهور مقاومة الأرتيميسينين في جنوب شرق ميانمار. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكولروكين، وكذلك عن العدوى بالمتصورات النولسية البشرية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

ناميبيا

الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2018)

تعزى مخاطر الملاريا إلى المتصورات المنجلية وهي موجودة في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نهاية حزيران/يونيو في المناطق التالية: أوهانغوين، أوماهيكي، أوموساتي، أوشانا، أوشيكتو، أوتجوزوندجوبا. وتوجد مخاطر طوال العام على طول نهر كونين في منطقة كونين، ونهر زامبيزي في منطقة زامبيزي، ونهر أوكافانغو في منطقة كافانغو (غرباً وشرقاً).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

ناورو

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

نيبال

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الملايا (2019)

تتواجد العدوى في إقليم تيراي الجنوبي، وفي الغالب في المنطقة الداخلية من تيراي (السهول)، على امتداد الغابات، والتلال، والحافات الحرجية، وأعلى وديان الأنهار الجبلية. ويتسم انتقال الملايا في معظم الأحيان بالطابع الموسمي (أذار/ مارس - تشرين الأول/ أكتوبر): أما أشهر الذروة فهي خلال موسم الأمطار (أيار/ مايو - آب/ أغسطس). وترجع المخاطر بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة، مع نقشي حالات عرضية من المتصورات المنجلية في الفترة من تموز/ يوليو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يشترط التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من أفغانستان، وكينيا، ونيجيريا، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والصومال.

## هولندا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## كاليدونيا الجديدة

### الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

ملاحظة. في حالة وجود خطر الوباء في الإقليم، قد تكون هناك حاجة إلى شهادة تطعيم محددة.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## نيوزيلندا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## نيكاراغوا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات النشطة (79.2%) والمتصورات المنجلية (20.8%) طوال العام في عدد من البلديات، خاصة في المنطقة المستقلة لشمال الأطلسي مع وجود حالات انتقال متفرقة في بواكا، تشينانديغا، جينوتيكيا، ليون، ماتاغلبا. ويتم الإبلاغ عن حالات من البلديات الأخرى في الإدارات المركزية والغربية وإن كانت

المخاطر في هذه المناطق منخفضة للغاية أو لا تكاد تذكر. والمخاطر الناجمة عن المتصورات المنجلية عالية أساساً في المنطقة المستقلة لشمال الأطلسي، وخصوصاً في بلديات روزيتا، سيونا، بونانزا، بويرتو كابيزاس، واسبان. ولم يتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للكوروكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "باء" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات المنجلية؛ و"جيم" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات المنجلية.

## النيجر

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر، ويوصى بتطعيم المسافرين المغادرين للنيجر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والمتجهين إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق ضمن الصحراء الكبرى.

### الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد. توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## نيجيريا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لكل المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد. توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## نيووي

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزيرة نورفولك، /نظر أستراليا

جزر ماريانا الشمالية، /نظر الولايات المتحدة الأمريكية

## مقدونيا الشمالية

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### النرويج

### الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### عمان

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2019)

حالات انتقال متفرقة من المتصورات المنجبية والمتصورات النشطة قد تحدث عقب الوفادة الدولية للطفلييات. وفي عام 2010، تم الإبلاغ عن فاشيات محلية من المتصورات المنجبية والمتصورات النشطة في المحافظة الشرقية الشمالية. وتم الإبلاغ عن حالات محلية أيضاً في عامي 2011 و2012.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: لا توجد

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يلزم تطعيم المسافرين القادمين من البلدان التي يفد منها شلل الأطفال باللقاح المضاد له.

### باكستان

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة والمتصورات المنجبية طوال العام في جميع المناطق التي تقل عن 2000 متر، وخاصة في المناطق الريفية في الفترة من تموز/ يوليو إلى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي الإلزامي لجميع المسافرين الدوليين المغادرين والمسافرين القادمين الذين سيمكثون لفترة طويلة (أي أكثر من 4 أسابيع) من جميع الأعمار. وسيتم إصدار شهادة تطعيم دولية لإثبات التطعيم.

**الحمى الصفراء (قبل 2013)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**بنما****الحمى الصفراء (2019)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء ومن البلدان التي تشهد فاشية نشطة للحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء أو يشهد انتقالاً نشطاً لهذا المرض.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر المتجهين إلى المناطق المرتفعة الواقعة شرق المنطقة المحيطة بالقناة (لمقاطعتي السكان الأصليين في أمبيرا وكونا يالا، ومحافظة داربين ومناطق محافظات كولون وبنما الواقعة شرق القناة).

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق غرب القناة، مدينة بنما، ومنطقة القناة نفسها، وجزر بالبو (جزر اللؤلؤ)، وجزر سان بلاس.

**الملايا (2019)**

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (أكثر من 99%) طوال العام في المحافظات التالية ومقاطعتي السكان الأصليين على طول ساحل المحيط الأطلسي والحدود مع كوستاريكا وكولومبيا: بوكاس ديل تورو، تشيريكوي، كولون، دارين، كونا يالا، جابي بوجلي، بنما، فيراغواس. وفي مدينة بنما، ومنطقة القناة، والمحافظات الأخرى فإن مخاطر انتقال الملايا لا تكاد تذكر أو معدومة.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "باء"؛ وفي المناطق الشرقية الموبوءة على الحدود مع كولومبيا: "جيم"

**بابوا غينيا الجديدة****الحمى الصفراء (2019)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**الملايا (2019)**

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في كل مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 1800 متر. وتم الإبلاغ عن ظهور مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

**الحمى الصفراء (2019)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر، باستثناء ما هو مذكور أدناه. عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين تقتصر مسارات تنقلاتهم على مدينة أسونسيون.

**الملاريا (2019)**

مخاطر منخفضة جداً للملاريا: تعود آخر حالة أصلية إلى عام 2011. ويتواصل قدر من الاستقبالية وسرعة التأثر في المناطق الموبوءة تاريخياً مثل ألتو بارانا وكانينديو وكاغوازو، وذلك حصراً للمتصورات النشطة.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

**بيرو**

**الحمى الصفراء (2018)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر المتجهين إلى المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2300 متر في مناطق أمازوناس، لوريتو، مادري دي ديوس، سان مارتن، أوكايالي، بونو، كوزكو. جونين، باسكو، هوانوكو، وللمتجهين إلى مناطق معينة من المناطق التالية: أقصى شمال أبوريماك؛ أقصى شمال هوانكافليكا، أقصى شمال شرق انكاش؛ شرق لا ليريتادا؛ شمال وشرق كاخاماركا؛ شمال وشمال شرق اياكوتشو، شرق بيورا.

عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على الجهات الواقعة غرب جبال الأنديز: مناطق لامبايكي وتومبيس والمناطق المعينة من بيورا الغربية وجنوب وغرب ووسط كاخاماركا.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300 متر، والمناطق الواقعة غرب جبال الأنديز غير المذكورة أعلاه، مدينة كوزكو، العاصمة ليما، ماتشو بيتشو، درب الإنكا.

**الملاريا (2018)**

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (84%)، والمتصورات المنجلية (16%) - طوال العام في المناطق الريفية الموجودة بالوديان الواقعة بين جبال الأنديز في الارتفاعات التي تقل عن 2300 متر وفي مناطق غابات الأمازون المرتفعة والمنخفضة. وتتمثل المناطق الخمس والأربعون الأشد تعرضاً للمخاطر، والتي يتركز بها العدد الأكبر من الحالات، في مناطق أمازوناس، وجونين، وسان مارتن، وبصفة أساسية لوريتو. وقد تم الإبلاغ عن ثمانية وتسعين في المئة من حالات المتصورات المنجلية في لوريتو، التي تقع في منطقة الأمازون والتي تشتمل على 14 مقاطعة من المقاطعات الأشد خطراً في البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "باء" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات النشطة؛ و"جيم" في منطقة وريتو.

## الفلبين

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### المالاريا (2019)

توجد مخاطر المالاريا طوال العام في المقاطعات الموبوءة المتبقية التسع (بلاوان، سلطان كودورات، دافاو ديل نورتي، ماغوينداناو، سولو، مندورو الغربية، تاوي-تاوي، وادي كاغافان، مدينة دافاو).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

يلزم تقديم شهادة دولية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين أو المغادرين إلى البلدان ذات المخاطر العالية. كما يشترط على الحجاج تلقي اللقاح المضاد للمكورات السحائية.

## جزر بيتكيرن

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## بولندا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## البرتغال

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## بورتوريكو

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2017)

يلزم تقديم الشهادة الدولية للتطعيم ضد شلل الأطفال وفقاً للوائح الصحية الدولية (اللوائح الصحية الدولية، المرفق 6) لجميع المسافرين القادمين من البلدان التي يفد منها شلل الأطفال.

**جمهورية كوريا**

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2019)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات/النشطة في المناطق الشمالية من محافظتي جانج وون دو وجيونج جي دو وفي مدينة إنتشون (تجاه المنطقة المنزوعة السلاح).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

**جمهورية مولدوفا**

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**ريونيون**

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**رومانيا**

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الاتحاد الروسي

### الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2016)

تعتبر مخاطر الملايا محدود للغاية وهي تنجم بالأساس عن المتصورات النشطة وتوجد في المناطق الواقعة تحت تأثير الهجرة المكثفة من دول الجنوب في رابطة الدول المستقلة.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: لا توجد

## رواندا

### الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى رواندا.

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

التوصية الخاصة بالوقاية: "جيم"

## سابا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## سانت بارتيليمي

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## سانت هيلينا

### الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

يلزم تلقي التطعيم الفموي المضاد لشلل الأطفال للمسافرين القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال على النحو الذي حددته المنظمة.

سانت لوسيا

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سانت مارتين

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سان بيار وميكلون

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سانت فنسنت وغرينادين

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**الحمى الصفراء (2013)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**سان مارينو****الحمى الصفراء (قبل 2013)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**سان تومي وبرينسيبي****الحمى الصفراء (2015)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى سان تومي وبرينسيبي.

**الملايا (2018)**

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

**المملكة العربية السعودية****الحمى الصفراء (2019)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

**الملايا (2019)**

يعتبر البلد في مرحلة ما قبل القضاء على الملايا. وتم الإبلاغ عن حالات انتقال محلية فقط في قرى على الحدود اليمنية (باستثناء المناطق عالية الارتفاع من منطقة عسير) وتعزى في الغالب إلى المتصورات المنجالية وهي تظهر أساساً في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى نهاية كانون الثاني/يناير. وقد تم تقليص معدل العدوى إلى أقل من 0.3 حالة لكل 100 000 نسمة. ولا توجد مخاطر في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## الإشترطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

### التهاب السحايا بالمكورات السحائية

يُشترط على البالغين والأطفال ممن يزيد عمرهم على عامين القادمين للعمرة، أو الحج، أو العمل الموسمي في مناطق الحج، تقديم شهادةصالحة تثبت تلقي التطعيم بلقاح رباعي التكافؤ مضاد للمكورات السحائية (ACYW) قبل 10 أيام على الأقل من السفر المزمع إلى المملكة العربية السعودية. ومن المقبول أن يكون التطعيم بأحد اللقاحات التالية:

- لقاح عديد السكاريد رباعي التكافؤ (ACYW) في غضون السنوات الثلاث الماضية.
- لقاح متقارن رباعي التكافؤ (ACYW) في غضون السنوات الخمس الماضية.

وتشير البيّنات العلمية الراهنة إلى أن اللقاحات المتقارنة مأمونة وفعالة لمن هم فوق الخامسة والخمسين من العمر. وعلى السلطات الصحية في بلدان الحجاج ضمان تطعيم حجاجهم ضمن فترة الصلاحية المطلوبة والتأكد من أن نوع اللقاح ظاهر بوضوح في شهادة التطعيم. وإذا لم يكن نوع اللقاح مدرجاً في الشهادة فستكون هذه الشهادةصالحة لمدة ثلاث سنوات.

كما يلزم التطعيم باللقاح المتقارن الرباعي التكافؤ (ACYW) لمن يلي:

- الحجاج المحليون
- المقيمون في مكة المكرمة والمدينة المنورة
- أي شخص قد يحتك بالحجاج، بما في ذلك العاملون في سياقات الرعاية الصحية والسلطات الأخرى.

وقد تُقرر وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية إعطاء المضادات الحيوية الاتقائية لبعض المسافرين في نقاط الدخول إذا اعتُبر ذلك ضرورياً.

### شلل الأطفال

على المسافرين من مناطق تشهد انتقالاً نشطاً لفيروس شلل الأطفال (أي ذات الانتقال النشط لفيروس شلل الأطفال البري أو المشتق من اللقاح) ومن بلدان معرضة لمخاطر عودة ظهور شلل الأطفال تقديم شهادةصالحة للتطعيم المضاد لشلل الأطفال. أما المسافرون القادمون من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وغينيا الجديدة والجمهورية العربية السورية والصومال واليمن فعليهم تقديم دليل يثبت تطعيمهم بواحد على الأقل من اللقاحات التالية:

- جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ خلال الـ 12 شهراً الماضية وقبل 4 أسابيع على الأقل من الوصول، أو
- جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال المعطل خلال الـ 12 شهراً الماضية وقبل 4 أسابيع على الأقل من الوصول.

وسيتلقى كذلك المسافرون القادمون من أفغانستان وميانمار ونيجيريا وباكستان وباكستان وغينيا الجديدة والجمهورية العربية السورية والصومال واليمن جرعة واحدة من لقاح شلل الأطفال الفموي عند النقاط الحدودية لدى الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

### السنغال

#### الحمى الصفراء (2016)

الإشترطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر القادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

#### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في جميع أنحاء البلد. وتوجد مخاطر أقل في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية حزيران/يونيو في المناطق الغربية الوسطى.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## صربيا

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## سيشيل

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2018)

يلزم التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من البلدان التي ظهرت فيها فاشيات شلل الأطفال.

## سيراليون

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لجميع المسافرين.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (قبل 2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## سنغافورة

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## سانت يوستاتIOS

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 6 أشهر فأكثر والقادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سلوفاكيا

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سلوفينيا

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر سليمان

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

المالريا (2019)

تتواجد مخاطر الماريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجبية طوال العام في جميع أنحاء البلد إلا في عدد قليل من الجزر الصغيرة النائية الشرقية والجنوبية. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

الصومال

الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى المناطق التالية: باكول، بنادير، خليج، جادو، جالجادود، حيران، جوبا السفلى، جوبا الوسطى، شبيلي السفلى، شبيلي الوسطى.

لا يوصى به للمسافرين لجميع المناطق الأخرى غير المذكورة أعلاه.

## الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد. وتوجد مخاطر منخفضة نسبياً وموسمية في الشمال؛ وهي أعلى في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## **جنوب أفريقيا**

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في المناطق المنخفضة الارتفاع من مقاطعة مبومالانغا (بما في ذلك حديقة كروجر الوطنية)، مقاطعة ليمبوبو، مقاطعة شمال شرق كوازولو ناتال. وتصل المخاطر إلى أعلى معدلاتها في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى نهاية أيار/مايو.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## **جنوب السودان**

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لكل المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

## الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## **أسبانيا**

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## **سري لانكا**

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر المتوجهين إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق ضمن الصحراء الكبرى ومدينة الخرطوم.

الملاريا (2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد. وتوجد مخاطر منخفضة وموسمية في الشمال؛ وتبلغ أعلى معدلاتها في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد. وتعتبر مخاطر الملاريا على ساحل البحر الأحمر محدودة للغاية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2019)

واصلت مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية (40%)، والمتصورات النشطة (58%)، والعدوى المختلطة (2%) انخفاضها في السنوات الأخيرة. وتخرط سورينام في عملية للقضاء على الملاريا. وتتواجد مخاطر الملاريا طوال العام في المناطق الداخلية من البلد والتي تقع خلف منطقة السافانا الساحلية، مع تسجيل أعلى درجة من المخاطر بشكل أساسي على طول الحدود الشرقية ومناطق تعدين الذهب. ومدينة بارامارibo والمناطق الساحلية السبع الأخرى خالية من انتقال الملاريا منذ عام 1968. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للميفلوكين. كما جرى الإبلاغ عن بعض الانخفاض في حساسية الكينين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الجمهورية العربية السوريةالحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر محدودة للغاية للملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات *النشطة* في الفترة من أيار/ مايو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في بؤر على طول الحدود الشمالية، وخاصة في المناطق الريفية في محافظة الحسكة. ولم يتم الإبلاغ عن أية حالات أصلية منذ عام 2005، ولكن نظام الإبلاغ قد تعطل منذ عام 2010.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2015)

يلزم التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من الكاميرون وغينيا الاستوائية وباكستان وللمسافرين من الجمهورية العربية السورية إلى البلدان الأخرى.

طاجيكستانالحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

لم يتم الإبلاغ عن أية حالات أصلية منذ عام 2009 ولا عن حالة للمتصورات *النشطة* منذ عام 2015. وتواجدت المخاطر السابقة للملايا الناجمة في الغالب عن المتصورات *النشطة* (في الفترة من حزيران/ يونيو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر)، ولاسيما في المناطق الجنوبية (منطقة الحكم الذاتي في خاتلون)، وفي بعض المناطق الوسطى (دوشنبه)، والغربية (غورنو بدخشان) و(منطقة لينين آباد) والمناطق الشمالية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

تاييلندالحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا طوال العام في المناطق الريفية، وخاصة مناطق الغابات والتلال، وخاصة بالقرب من الحدود الدولية، بما في ذلك المقاطعات الجنوبية. ولا توجد أية مخاطر في المدن (مثل بانكوك، شيانغ ماي، باتايا)، والمناطق الحضرية، وجزيرة ساموي، والمنتجعات السياحية الرئيسية في جزيرة بوكيت. ومع ذلك، توجد مخاطر في بعض المناطق والجزر الأخرى. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للميفلوكين والكينين في المناطق القريبة من الحدود مع كمبوديا وميانمار. وظهرت مقاومة الأرتيميسينين قرب الحدود مع ميانمار. وتم كذلك الإبلاغ عن مقاومة المتصورات/النشطة للكوروكين، وعن ظهور العدوى بالمتصورات النولسية البشرية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للخطر: "ألف"؛ في المناطق القريبة من الحدود مع كمبوديا وميانمار: "دال"

## تيمور - لشتي

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2019)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## توغو

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## توكيلاو، انظر نيوزيلندا

## تونغا

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## ترينيداد وتوباغو

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر المتجهين إلى مناطق الغابات الكثيفة في جزيرة ترينيداد. عموماً لا يوصى به للمسافرين على متن السفن السياحية والطائرات العابرين أو المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جزيرة توباغو.

## تريستان دا كونها، انظر المملكة المتحدة

## تونس

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## تركس وكايكوس، انظر المملكة المتحدة

## تركيا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### المالريا (2018)

تسنى وقف انتقال المالريا على المستوى المحلي؛ ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مكتسبة محلياً منذ عام 2010. ولا توجد أية مخاطر للمالريا في البلاد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: لا توجد

## تركمانستان

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## توفالو

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## أوغندا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء لكل المسافرين من عمر عام واحد فأكثر.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## أوكرانيا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2019)

على الزائرين لفترات طويلة لبلدان تشهد انتقالاً لفيروس شلل الأطفال البري أو فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح تقديم دليل لإثبات التطعيم بجرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ أو جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال المعطل خلال الـ 12 شهراً السابقة وقبل 4 أسابيع على الأقل من الوصول. ومن الواجب تمنيع الأشخاص المضطرين إلي القيام بسفر دولي عاجل بجرعة منفردة من لقاح شلل الأطفال قبل مغادرتهم. وسيزود المسافرون بشهادة دولية للتطعيم أو الاتقاء وفقاً للوائح الصحية الدولية لتسجيل تطعيمهم المضاد لشلل الأطفال واستخدامها كدليل لإثبات التطعيم.

## الإمارات العربية المتحدة

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## المملكة المتحدة (مع جزر تشانيل وجزيرة مان)

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### جمهورية تنزانيا المتحدة

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى جمهورية تنزانيا المتحدة.

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 1800 متر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

### الولايات المتحدة الأمريكية

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر فرجن الأمريكية، انظر الولايات المتحدة الأمريكية

### أوروغواي

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### أوزبكستان

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (2018)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في بعض القرى الواقعة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد على الحدود مع أفغانستان وقرغيزستان وطاجيكستان. ولم تظهر حالات مكتسبة محلياً منذ عام 2011.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ألف"

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

المالريا (2019)

تمثل المالريا مخاطر ما بين المنخفضة والمعتدلة والتي تعزي في الغالب إلى المتصورات النشطة وهي موجودة طوال العام في معظم أنحاء البلد. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين. ولا تزال مخاطر المالريا الناجمة عن المتصورات المنجلية موجودة.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

جمهورية فنزويلا البوليفارية

الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من البرازيل وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار في البرازيل.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر، باستثناء ما هو مذكور أدناه.

عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: كامل ولايات آراغوا، كارابوبو، ميراندا، فارغاس، يراكوي، والمقاطعة الاتحادية.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300 متر في ولايات ميريدا، تروخيو، تانتشيرا، وولايتا فالكون ولازا؛ وجزيرة مارغريتا؛ والعاصمة كاراكاس؛ ومدينة فالنسيا.

المالريا (2018)

تتواجد مخاطر المالريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (74.6%) والمتصورات المنجلية (25.4%) بدرجة مرتفعة طوال العام في بعض المناطق في ولايات أمازوناس، بوليفار، دلتا أماكورو، سوكري. وثمة مخاطر معتدلة في ولاية زوليا. وهناك مخاطر منخفضة في ولايتي أنزواتيغي وموناغاس. وتقتصر مخاطر المالريا المنجلية في الغالب على بلدات في مناطق أمازوناس (ألتو أورينوكو، أتابابو، أتورس، أوتانا، مانابيارى) وبوليفار (أنجوستورا، سيدينيو، إل كالاو، غران سابانا، هريس، بيار، روسيو، سيفونتس)، وولايتي دلتا أماكورو وسوكري (بينيتيز، بيرموديز، كايغال، أريزميندي).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "باء" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات النشطة؛ و"جيم" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات المنجلية.

فييت نام

الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

المالريا (2019)

تتواجد مخاطر المالريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية في جميع أنحاء البلد، باستثناء المراكز الحضرية، ودلتا النهر الأحمر، ودلتا نهر الميكونغ، ومناطق السهول الساحلية في وسط فييتنام. وتتركز المناطق العالية المخاطر في

المناطق المرتفعة الأقل من 1500 متر جنوب خط العرض 18 شمالاً، ولاسيما في مرتفعات المحافظات الوسطى الأربعة لداك لاك، داك نونغ، جيا لاي، كون توم، ومقاطعة بينه فوك، والأجزاء الغربية من المحافظات الساحلية خانه هوا، نينه ثوان، كوانج نام، كوانج تري. وتم الإبلاغ عن مقاومة للميفلوكين.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

## جزيرة ويك

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## واليس وفوتونا

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

## اليمن

### الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### الملايا (قبل 2018)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجبية طوال العام، وتظهر أساساً في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى نهاية شباط/فبراير في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 2000 متر. ولا توجد أية مخاطر في مدينة صنعاء، كما أن مخاطر الملاريا في جزيرة سقطرى محدودة للغاية.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"؛ جزيرة سقطرى: "ألف"

## زامبيا

### الحمى الصفراء (2018)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر عام واحد فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.  
توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد  
عموماً لا يوصى به للمسافرين الى المناطق التالية: المقاطعات الشمالية الغربية والغربية بأكملها.  
لا يوصى به لجميع المناطق الأخرى التي لم تذكر أعلاه.

## المالريا (2018)

تتواجد مخاطر المالريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.  
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "جيم"

## زبابوي

### الحمى الصفراء (2019)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين من عمر 9 أشهر فأكثر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

### المالريا (2019)

تعزى مخاطر المالريا في الغالب إلى المتصورات المنجلية وهي موجودة من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى نهاية حزيران/ يونيو في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1200 متر وطوال العام في وادي زامبيزي. والمخاطر في بولاوايو وهراري لا تكاد تنكر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "جيم"

== =

© منظمة الصحة العالمية 2019. بعض الحقوق محفوظة. هذه المطبوعة متاحة بمقتضى الترخيص CC BY-NC-SA 3.0 IGO

إن الحدود المعروضة والتسميات المستخدمة في هذه المطبوعة لا تعبر إطلاقاً عن رأي منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها، أو تخومها.