

THAILAND NATIONAL LIST OF ESSENTIAL MEDICINES (NLEM)

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติประกอบด้วย

1. บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
2. บัญชียาจากสมุนไพร

1. “**บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข**” หมายความว่า รายการยาแผนปัจจุบันสําหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ตามภาคผนวก 1 ซึ่งประกอบด้วยบัญชีย่อย 5 บัญชี ได้แก่ บัญชี ก บัญชี ข บัญชี ค บัญชี ง และบัญชี จ รวมทั้งรายการยามาตรฐานตัวรับโรงพยาบาล ตามภาคผนวก 2

บัญชี ก	รายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสิทธิผลการใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียง และเป็นยาที่ควรได้รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งชี้ของยานั้น
บัญชี ข	รายการยาที่ใช้สําหรับข้อบ่งชี้หรือโรคบางชนิดที่ใช้ยาในบัญชี ก ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล หรือใช้เป็นยาแทนยาในบัญชี ก ตามความจำเป็น
บัญชี ค	รายการยาที่ต้องใช้ในโรคเฉพาะทางโดยผู้ชำนาญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการของสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยสถานพยาบาลจะต้อง (1) มีมาตรการกํากับการใช้อย่าง (2) มีความพร้อม ตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจาก (2.1) ถ้าใช้ยากลุ่มนี้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย หรือเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย หรือ (2.2) เป็นยาที่มีแนวโน้มในการใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ หรือไม่คุ้มค่า หรือมีการนำใช้ในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่จำกัด หรือมีประสิทธิผลการใช้ในประเทศไทยอย่างจำกัด
บัญชี ง	รายการยาที่มีหลายข้อบ่งชี้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งชี้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่มีราคาแพง จำเป็นสําหรับผู้ป่วยบางราย แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย หรือก่อปัญหาเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรง การสั่งใช้ยาให้สมเหตุสมผล คุ้มค่า สมประโยชน์ สถานพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ใช้ยาตามข้อบ่งชี้และเงื่อนไขที่กำหนด (2) วินิจฉัยและสั่งใช้ยา โดยผู้ชำนาญเฉพาะโรคที่ได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานฝึกอบรม หรือได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรจากแพทยสภา หรือทันตแพทยสภาเท่านั้น สําหรับการสั่งยาในครั้งต่อไป สถานพยาบาลอาจมอบให้แพทย์ผู้ชำนาญรับผิดชอบในการสั่งยาได้ โดยต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ชำนาญเฉพาะโรคดังกล่าว (3) มีระบบกํากับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดยต้องเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านี้เพื่อตรวจสอบในอนาคต
บัญชี จ(1)	รายการยาสําหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีงบประมาณ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินโครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน มีการกำหนดวิธีการใช้และแนวทางในการติดตามประเมินการใช้จ่ายตามโครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นระยะตามความเหมาะสมและเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยมีการคำนวณผลกระทบระยะยาวต่อประเทศในกรณีทีโครงการมีการขยายผล เพื่อพิจารณาจัดเข้าประเภทของบัญชีย่อยอื่นในบัญชียาหลักต่อไปเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ
บัญชี จ(2)	รายการยาสําหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุสมผล คุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในกํากับการใช้จ่ายภายใต้ความร่วมมือของระบบประกันสุขภาพ ซึ่งดูแลโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางกํากับการใช้จ่ายตามภาคผนวก ๓ “รายการยาสําหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ” ตามบัญชี จ(๒) หมายความว่า ยาที่จำเป็นต้องใช้สําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยมีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งชี้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้องหรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ เป็นยาที่มีราคาแพงมาก หรือส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งหมดของสังคม และผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกํากับและอนุมัติการสั่งใช้ยา (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด สถานพยาบาลจะต้องมีระบบการกํากับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา และมีเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดย กลไกกลางในอนาคตได้

“เภสัชตัวรับโรงพยาบาล” หมายความว่า รายการยาที่โรงพยาบาลสามารถผลิตขึ้นใช้ภายในโรงพยาบาลตามเภสัชตัวรับของโรงพยาบาลที่เป็นรายการยาตามทีระบุในภาคผนวก 1 หรือภาคผนวก 2 หรือภาคผนวก 4

2. “บัญชียาจากสมุนไพร” หมายความว่า รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ซึ่งมีตัวยาในสูตรตำรับ และรายละเอียดตาม ภาคผนวก 4 โดยมีรายการยาจากสมุนไพรที่แนบรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลรวมอยู่แล้ว

ภาคผนวก 1: รายการยาในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

คำอธิบายรายการยาในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

รายละเอียดของรายการยาประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา รูปแบบของยา บัญชีย่อย นอกจากนี้ยังอาจมี ความแรงของยา ขนาดบรรจุยา เจือจาง (การส่งใช้ยาหรือการเลือกยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล) คำเตือนและข้อควรระวัง หมายเหตุรายละเอียดสถานะของยา และข้อกำหนดอื่น ๆ ให้อธิบายยาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้น เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

การแสดงชื่อสามัญทางยา (generic name) และรูปแบบยา (dosage form)

ส่วนใหญ่ชื่อสามัญทางยาจะแสดงด้วยชื่อ International Nonproprietary Name (INN) หากชื่อ INN นั้นไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จะแสดงด้วยชื่อ INN ตามด้วยชื่ออื่นไว้ในวงเล็บ ในกรณีชื่อนั้นไม่มีชื่อ INN ให้ใช้ชื่ออื่นแทน เช่น British Approved Names (BAN), United States Approved Name (USAN) เป็นต้น

ยาทุกรายการ หมายถึง ยาที่มีสารออกฤทธิ์ 1 ชนิดที่มีรูปแบบยาตามที่ระบุไว้เท่านั้น เว้นแต่ยาสูตรผสมจะแสดงชื่อสามัญทางยาของสารออกฤทธิ์ในสูตรยารายการนั้นทั้งหมด

รูปแบบยาที่แสดงในบัญชียา หมายถึง รูปแบบยาทั่วไป ที่มีได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเป็นพิเศษหรือเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีรูปแบบยาที่มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเป็นพิเศษหรือจำเพาะเจาะจง จะระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ โดยระบุรูปแบบยานั้น ๆ อย่างชัดเจน ตัวอย่างรูปแบบที่มีการพัฒนารูปแบบยาเป็นพิเศษ เช่น ยาเตรียมสำหรับออกฤทธิ์นานทุกชนิด vaginal tablet, rectal suppository, sublingual tablet, enteric coated tablet, effervescent tablet, orodispersible tablet, microspheres suspension for injection เป็นต้น ตัวอย่างการจำเพาะเจาะจงรูปแบบยาบางชนิด เช่น Ibuprofen film coated tablet หมายถึง ยาเม็ด ibuprofen ชนิดเคลือบฟิล์ม ไม่รวมถึงชนิดเคลือบน้ำตาล ชนิดดอกอัดเม็ดธรรมดา รวมทั้งชนิดออกฤทธิ์นาน เป็นต้น

ในกรณีเป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาลจะระบุอักษร “hosp” ไว้ในวงเล็บท้ายรูปแบบยา เช่น sol (hosp) หมายถึง ยาที่สถานพยาบาลผลิตเองในรูปแบบ solution เป็นต้น

คำจำกัดความรูปแบบยาที่สำคัญ

- tab / cap หมายถึง ยาเม็ด หรือแคปซูล แบบ immediate release (IR) สำหรับกินทั่วไป ที่มีได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเป็นการเฉพาะหรือเป็นพิเศษ เช่น compressed tablet, film coated tablet, sugar coated tablet เป็นต้น
- SR tab / cap หมายถึง ยาเม็ดหรือแคปซูลสำหรับรับประทานที่เป็นยาออกฤทธิ์นานทุกชนิด เช่น controlled release, extended release, modified release, slow release เป็นต้น
- EC tab / cap หมายถึง ยาเม็ดหรือแคปซูล สำหรับรับประทานที่ออกแบบให้ตัวยาละลายในลำไส้ (enteric coated)
- dry syrup หมายถึง ผงแห้งของส่วนผสมตัวยาหรือสารเคมี ที่ต้องเติมน้ำหรือสารละลายที่เหมาะสมก่อนใช้ ซึ่งจะได้น้ำเชื่อมตามต้องการ เช่น ยาน้ำแขวนตะกอน สารละลายใส เป็นต้น
- syrup หมายถึง ยาน้ำใสหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มความหวานเพื่อกลบรสขมของยา ตัวอย่างสารให้ความหวานที่ใช้ในตำรับ เช่น sucrose, dextrose นอกจากนี้อาจใช้สารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานต่ำ เช่น saccharin, sorbitol, mannitol และ aspartame เป็นต้น
- eye drop หมายถึง ยาเตรียมปราศจากเชื้อสำหรับหยอดตา
- sterile solution หมายถึง ยาปราศจากเชื้อในรูปแบบของสารละลาย สำหรับฉีด หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือ irrigation

ข้อกำหนดเฉพาะของรายการยา

ข้อกำหนดเฉพาะของรายการยาที่สำคัญ มีดังนี้

1) ความแรง ยบบางรายการที่ระบุความแรงของสารออกฤทธิ์ไว้ ให้อธิบายรายการยาที่มีความแรงตามที่กำหนดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น โดยแสดงรายละเอียดเฉพาะของความแรงยาไว้ในวงเล็บท้ายรูปแบบยา เช่น

- Ofloxacin tab (เฉพาะ 100, 200 มิลลิกรัม) หมายถึง ไม่รวมยา Ofloxacin ในความแรงอื่น เช่น Ofloxacin 300 มิลลิกรัม เป็นต้น
- Sodium phosphates enema มีตัวยาสำคัญต่อ 100 ml คือ Sodium biphosphate 15.2-16.8 กรัม และ Sodium phosphate 5.7-6.3 กรัม ทั้งนี้ไม่รวมสูตรที่มีสัดส่วนของส่วนประกอบที่แตกต่างจากที่กำหนด เช่น มี Sodium biphosphate น้อยกว่า 15.2 กรัม
- Amino acid solution ชนิด high essential amino acid มีสัดส่วนของ essential amino acid > 60% ของ total amino acid ทั้งนี้ไม่รวมถึงสูตรที่มี essential amino acid ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 60%

2) **ขนาดบรรจุ** ยาบารายการที่ระบุขนาดบรรจุไว้ อาทิ ยาในกลุ่ม contrast media เป็นต้น ให้ถือว่ายามีขนาดบรรจุตามที่กำหนดเท่านั้นเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

3) **เงื่อนไข ซึ่งประกอบไปด้วย**

3.1) เงื่อนไขการสั่งใช้ยา บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นมาตรการหนึ่งในระบบยาแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างสมเหตุผล ดังนั้น หากรายการยามีหลายข้อบ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มว่าจะมีการสั่งใช้ไม่ถูกต้อง ก็ได้รับข้อบ่งใช้ไว้ในเงื่อนไขการสั่งยา เพื่อเป็นแนวทางในการสั่งใช้ยาสำหรับแพทย์ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับสถานพยาบาลเพื่อประกอบการจัดระบบกำกับ ติดตาม ให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมทั้ง **การระบุเงื่อนไขการสั่งใช้นั้นมีหลักการเพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าถึงยาโดยมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล** โดย **ยาในบัญชี ก และ ข** จะระบุเงื่อนไขที่ต่อเมื่อพิจารณาว่ายานี้อยู่ในบัญชี ก หรือ ข เมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะภาวะหรือโรคนั้นเท่านั้น

ยาในบัญชี ค และ ง ควรมีการระบุเงื่อนไขทุกรายการ เนื่องจากยาในกลุ่มนี้มีหลายข้อบ่งใช้มีแนวโน้มการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ยามีราคาแพง มักจะใช้ได้หลายกรณี ในกรณีที่บัญชี ค ไม่มีการระบุข้อบ่งใช้เฉพาะของโรคระบบนั้นให้ถือว่าใช้นี้ในระบบอื่นได้

สำหรับยาในบัญชี จ(2) เป็นยาที่มีการจัดกลไกสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะให้สามารถเข้าถึงยาดังขึ้น การระบุเงื่อนไขจึงต้องกำหนดแนวทางกำกับการใช้ยาเพิ่มเติมจากข้อบ่งใช้ที่คัดเลือกไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ แนวทางกำกับการใช้ยาบัญชี จ(2) ตามภาคผนวก 3 ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ คือ

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. ระบบอนุมัติการใช้ยา | 5. ขนาดยาที่แนะนำ/วิธีการให้ยา |
| 2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล | 6. ระยะเวลาในการรักษา |
| 3. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา | 7. การติดตาม/การประเมินผลการรักษา |
| 4. เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา/เกณฑ์การวินิจฉัยโรค | 8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |

โดยการขออนุมัติใช้ยา สถานพยาบาลต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดทุกข้อ และมีการเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้

คำอธิบายของแต่ละหัวข้อเป็น ดังนี้

1. ระบบอนุมัติการใช้ยา

เป็นระบบที่ใช้ในการกำกับการใช้ยาของหน่วยงานสิทธิประโยชน์ หรือหน่วยงานกลาง ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

- ระบบที่ต้องขออนุมัติก่อนการรักษา (Pre-Authorization)

เป็นระบบที่ต้องขออนุมัติการใช้จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์ หรือหน่วยงานกลาง ก่อนให้การรักษา ซึ่งใช้ในกรณีที่ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน โดยรายละเอียดของระบบอนุมัติการใช้ยาในแต่ละแนวทางกำกับการใช้ยา ได้พิจารณาตามความเหมาะสมของยาและข้อบ่งใช้

- ระบบที่ต้องขออนุมัติภายหลังการรักษา (Post- Authorization)

เป็นระบบที่ต้องขออนุมัติการใช้จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางภายหลังการรักษา ซึ่งใช้ในกรณีที่เมื่อผู้ป่วยมาด้วยภาวะฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องได้รับยาในทันที มีเช่นนั้นผู้ป่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยรายละเอียดของระบบอนุมัติการใช้ยาในแต่ละแนวทาง การใช้ยาได้พิจารณาตามความเหมาะสมของยาและข้อบ่งใช้ ทั้งนี้มีบางรายการมีระบบอนุมัติการใช้ยาทั้งแบบก่อนการรักษา และระบบภายหลังการรักษา เช่น ยา Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) ในข้อบ่งใช้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (primary immunodeficiency diseases) เป็นต้น

2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล

สถานพยาบาลที่มีการใช้ยาต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีความเหมาะสมในประเด็นที่คาดไว้ เช่น

- ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการรักษา/วินิจฉัยโรค
- ความพร้อมของบุคลากรที่ต้องใช้ในการรักษา/วินิจฉัยโรค เป็นต้น

โดยมีการลงทะเบียนสถานพยาบาลกับหน่วยงานสิทธิประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

แพทย์ผู้สั่งใช้ยาดังมีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ยาให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลตามแนวทางกำกับการใช้ยาที่กำหนด โดยมีการลงทะเบียนแพทย์ผู้ทำการรักษา กับหน่วยงานสิทธิประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย

4. เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา / เกณฑ์การวินิจฉัยโรค

เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา หรือเกณฑ์การวินิจฉัยโรค ได้แก่ ข้อกำหนดในการวินิจฉัยโรค หรือการใช้ยาให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาและหลักฐานทางวิชาการ เนื่องจากบัญชียา (2) เป็นยาที่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษา

5. ขนาดยาที่แนะนำ / วิธีการให้ยา

ขนาดยาที่แนะนำ หรือวิธีการให้ยา มีข้อกำหนดตามมาตรฐานการรักษาและหลักฐานทางวิชาการ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศด้วย

6. ระยะเวลาในการรักษา

ระยะเวลาในการรักษา มีข้อกำหนดตามมาตรฐานการรักษาและหลักฐานทางวิชาการ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศด้วย

7. การติดตาม / การประเมินผลการรักษา

การติดตาม หรือประเมินผลการรักษา มีข้อกำหนดตามมาตรฐานการรักษา และหลักฐานทางวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงผลการรักษา อาการไม่พึงประสงค์ และการพิจารณาตรวจวินิจฉัยที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงแนวทางการรักษาผู้ป่วยตามความเหมาะสม

8. ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ข้อแนะนำที่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษา

3.2) เงื่อนไขการจัดหายา ในกรณีที่มียามากกว่า 1 รายการ มีข้อบ่งใช้เหมือนกัน จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อผลารักษายาอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง ไม่มีความแตกต่างทางด้านราคาอย่างชัดเจน จึงกำหนดให้สถานพยาบาลคัดเลือกรายการยาที่จัดซื้อแล้วมีราคาต่ำที่สุดเพียงรายการเดียวเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ยาที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจะระบุเงื่อนไขว่า "ให้เลือก หนึ่งในรายการระหว่าง.....กับ..... ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า"

3.3) ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของรายการยา เช่น ค่าเดือนและข้อควรระวัง หมายเหตุที่สำคัญของตัวยานั้น

- ค่าเดือน และข้อควรระวัง ระบุในกรณีซึ่งมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่มีความสำคัญ เช่น พบบ่อยหรืออาจเป็นอันตราย ทั้งที่มีระบุไว้ในเอกสารกำกับยาหรือเป็นข้อมูลใหม่ ที่ควรสื่อสารให้ผู้รับบริการทราบโดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจน
 - หมายเหตุ ได้แก่ คำแนะนำ ข้อสังเกต คำอธิบาย ที่สำคัญซึ่งต้องการสื่อสารให้ผู้รับบริการทราบ
- หมายเหตุ อักษรย่อ

cap	=	capsule	mg	=	milligram
COPD	=	chronic obstructive pulmonary disease	ml	=	milliliter
DPI	=	dry powder inhaler	mmol	=	millimole
EC	=	enteric coated	mOsm	=	milliosmole
g	=	gram	oint	=	ointment
GnRH	=	gonadotrophin-releasing hormone	pwdr	=	powder
hosp	=	hospital formulary (เภสัชตำรับโรงพยาบาล)	sol	=	solution
inj	=	injection	SR	=	ยาออกฤทธิ์นาน
IM	=	intramuscular	supp	=	suppository
IU	=	International unit	susp	=	suspension
mcg	=	microgram	syr	=	syrup
MDI	=	metered dose inhaler	tab	=	tablet
mEq	=	milliequivalent	U	=	unit
mixt	=	mixture	USP	=	United States Pharmacopeia

*ภาคผนวก 2 : รายการยาเภสัชตำรับโรงพยาบาล (ที่เป็นยาแผนปัจจุบัน)

*ภาคผนวก 3 : แนวทางการกำกับการใช้ยา บัญชี จ(2)

*ภาคผนวก 4 : บัญชียาจากสมุนไพร

*ภาคผนวก 5 : รายละเอียดรายการยาตามบัญชียาจากสมุนไพร

หมายเหตุ สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_home
http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news_detail/index/204
http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news_detail/index/215

สารบัญหมวดหมู่ของกลุ่มยา
ของบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

1. Gastro-intestinal system	A20	6.6. Drugs affecting bone metabolism.....	A34
1.1. Antacids and other drugs for dyspepsia	A20	6.7. Other endocrine drugs	A34
1.2. Antispasmodics and other drugs altering gut motility.....	A20	7. Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders	A34
1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding.....	A20	7.1. Drugs used in obstetrics	A34
1.4. Drugs used in acute diarrhoea.....	A20	7.2. Treatment of vaginal and vulval conditions.....	A34
1.5. Drugs used in chronic bowel disorders.....	A21	7.3. Contraceptives.....	A34
1.6. Laxatives	A21	7.4. Drugs for genito-urinary disorders.....	A35
1.7. Local preparations for anal and rectal disorders.....	A21	8. Malignant disease and immunosuppression	A35
1.8. Drugs affecting intestinal secretions.....	A21	8.1. Cytotoxic drugs.....	A35
2. Cardiovascular system	A21	8.2. Drugs affecting the immune response	A36
2.1. Positive inotropic drugs.....	A21	8.3. Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease.....	A36
2.2. Diuretics	A21	9. Nutrition and blood	A37
2.3. Anti-arrhythmic drugs	A21	9.1. Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders	A37
2.4. Beta-adrenoceptor blocking drugs.....	A22	9.2. Fluids and electrolytes.....	A37
2.5. Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs	A22	9.3. Vitamins.....	A38
2.6. Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators	A22	9.4. Intravenous nutrition	A39
2.7. Sympathomimetics.....	A22	9.5. Minerals.....	A40
2.8. Anticoagulants.....	A23	9.6. Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers.....	A41
2.9. Antiplatelet drugs	A23	9.7. Metabolic disorders.....	A41
2.10. Fibrinolytic drugs	A23	10. Musculoskeletal and joint diseases	A41
2.11. Hemostatics	A23	10.1. Drugs used in rheumatic diseases and gout.....	A41
2.12. Lipid-regulating drugs.....	A23	10.2. Drugs used in neuromuscular disorders.....	A41
3. Respiratory system	A23	10.3. Drugs for relief of soft-tissue inflammation	A42
3.1. Bronchodilators.....	A23	11. Eye	A42
3.2. Corticosteroids.....	A24	11.1. Anti-infective eye preparations	A42
3.3. Leukotriene receptor antagonists.....	A24	11.2. Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations	A42
3.4. Antihistamines.....	A24	11.3. Mydriatics and cycloplegics	A43
3.5. Pulmonary surfactants.....	A24	11.4. Drugs for treatment of glaucoma	A43
3.6. Cough preparations.....	A24	11.5. Local anaesthetics.....	A43
3.7. Systemic nasal decongestants.....	A25	11.6. Tear deficiency, ocular lubricants and astringents.....	A43
3.8. Other respiratory preparations.....	A25	11.7. Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment.....	A43
4. Central nervous system	A25	12. Ear, nose, oropharynx and oral cavity	A43
4.1. Hypnotics and anxiolytics.....	A25	12.1. Drugs acting on the ear	A43
4.2. Drugs used in psychoses and related disorders.....	A25	12.2. Drugs acting on the nose	A44
4.3. Antidepressant drugs	A26	12.3. Drugs acting on the oropharynx and oral cavity.....	A44
4.4. Central nervous system stimulants.....	A26	13. Skin	A45
4.5. Drugs used in nausea and vertigo	A26	13.1. Anti-infective skin preparations.....	A45
4.6. Analgesics and antipyretics.....	A26	13.2. Emollient and barrier preparations.....	A45
4.7. Analgesics.....	A26	13.3. Topical antipruritics.....	A45
4.8. Antiepileptics	A27	13.4. Topical corticosteroids	A45
4.9. Drugs used in movement disorders	A28	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	A46
4.10. Drugs used in substance dependence	A28	13.6. Preparations for warts and calluses	A46
4.11. Drugs used in dementia.....	A28	13.7. Preparations for hyperhidrosis	A46
5. Infections	A28	14. Immunological products and vaccines	A46
5.1. Antibacterial drugs	A28	15. Anesthesia	A47
5.2. Antifungal drugs.....	A30	15.1. General anesthesia.....	A47
5.3. Antiviral drugs.....	A31	15.2. Local anesthesia.....	A48
5.4. Antiprotozoal drugs.....	A32	16. Antidotes	A48
5.5. Anthelmintics.....	A32	17. Contrast media and Radiopharmaceuticals	A49
5.6. Antiseptics.....	A32	17.1. Water soluble iodinated contrast.....	A49
6. Endocrine system	A32	17.2. Non-iodinated gastrointestinal X-ray contrast media.....	A49
6.1. Drugs used in diabetes.....	A32	17.3. Magnetic resonance contrast media.....	A49
6.2. Thyroid and antithyroid drugs.....	A33	17.4. Radiopharmaceuticals	A49
6.3. Corticosteroids.....	A33		
6.4. Sex hormones.....	A33		
6.5. Hypothalamic and pituitary hormones.....	A34		



รายการยาในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563
Drug Listed by Therapeutic Classification
รายชื่อยาจัดเรียงตามหมวดหมู่ของกลุ่มยาและการรักษา กลุ่มที่ 1-17

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
1. Gastro-intestinal system				
1.1. Antacids and other drugs for dyspepsia				
1 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide		chewable tab, tab, susp, susp (hosp)	ก	-
2 Simeticone	Simethicone	chewable tab, susp	ก	-
3 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simeticone 25-50 mg		chewable tab, tab, susp	ก	-
4 Compound Cardamom Mixture เฉพาะสูตรที่ไม่มี sodium bicarbonate	Mist Carminative	mixt, mixt (hosp)	ก	-
5 Aluminium hydroxide		chewable tab, tab, susp, susp (hosp)	ข	-
1.2. Antispasmodics and other drugs altering gut motility				
1 Dicycloverine hydrochloride	Dicyclomine hydrochloride	tab	ก	-
2 Domperidone		tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก	-
3 Hyoscine butylbromide	Hyoscine-n-butylbromide	tab, syr, sterile sol	ก	-
4 Metoclopramide		tab, syr, sterile sol	ก	-
5 Mebeverine hydrochloride		tab	ข	-
1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding				
1 Omeprazole		EC cap (as base)	ก	-
2 Ranitidine hydrochloride		film coated tab	ก	-
3 Omeprazole sodium		sterile pwdr	ข	ดูเพิ่ม
4 Ranitidine hydrochloride		sterile sol	ข	-
5 Pantoprazole sodium		sterile pwdr	ค	-
6 Sucralfate		tab, susp	ค	ดูเพิ่ม
7 Bismuth subsalicylate		tab	ง	ดูเพิ่ม
8 Lauromacrogol 400	Polidocanol	sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
9 Octreotide acetate		sterile sol (เฉพาะ 0.1 mg/ 1 ml) ยกเว้นชนิดออกฤทธิ์นาน	ง	ดูเพิ่ม
1.4. Drugs used in acute diarrhea				
1 Oral rehydration salts เมื่อผสมน้ำแล้วมีตัวยาล้ำค่าคือต่อลิตร ดังนี้ - Sodium chloride 2.6 g - Trisodium citrate dihydrate 2.9 g - Potassium chloride 1.5 g - Glucose 13.5 g และมี molar concentration ต่อลิตรดังนี้ - Glucose 75 mEq - Sodium 75 mEq - Chloride 65 mEq - Potassium 20 mEq - Citrate 10 mmol - Osmolarity 245 mOsm	ORS	oral pwdr, oral pwdr (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
2 Zinc sulfate		oral sol (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
3 Loperamide hydrochloride		cap, tab	ข	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
1.5. Drugs used in chronic bowel disorders				
1	Mesalazine	EC tab, SR tab, enema, rectal supp	ค	ดูเพิ่ม
2	Sulfasalazine	tab, EC tab	ค	ดูเพิ่ม
1.6. Laxatives				
1	Bisacodyl	EC tab, rectal supp	ก	-
2	Castor oil	oil	ก	-
3	Glycerol	rectal supp	ก	-
4	Ispaghula Husk	Psyllium Husk powder for oral suspension, granules for oral suspension	ก	-
5	Magnesium hydroxide	tab, susp, susp (hosp)	ก	-
6	Magnesium sulfate	mixt, mixt (hosp), sol, sol (hosp)	ก	-
7	Senna	tab	ก	-
8	Sodium phosphates มีตัวยาสำคัญต่อ 100 ml ดังนี้ - Sodium biphosphate 15.2-16.8 g - Sodium phosphate 5.7-6.3 g	enema	ก	-
9	Lactulose	syrr	ข	ดูเพิ่ม
10	Macrogols with electrolytes	Polyethylene glycol, PEG oral powdr (hosp)	ค	ดูเพิ่ม
11	Sodium phosphates มีตัวยาสำคัญต่อ 5 ml ดังนี้ - Sodium biphosphate 0.9 g - Sodium phosphate 2.4 g	oral sol	ค	ดูเพิ่ม
1.7. Local preparations for anal and rectal disorders				
1	Local anesthetic + Corticosteroid with/without astringent	cream, oint, rectal supp	ข	ดูเพิ่ม
1.8. Drugs affecting intestinal secretions				
1	Colestyramine	Cholestyramine oral powdr	ข	ดูเพิ่ม
2	Pancreatic enzymes ต้องมี lipase activity ไม่น้อยกว่า 1,200 USP units/cap หรือ tab	cap, tab, EC cap, EC tab	ง	ดูเพิ่ม
3	Ursodeoxycholic acid	Ursodiol cap	ง	ดูเพิ่ม
2. Cardiovascular system				
2.1. Positive inotropic drugs				
1	Digoxin	tab, elixir, sterile sol	ก	-
2	Milrinone lactate	sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
2.2. Diuretics				
1	Furosemide	tab, sterile sol	ก	-
2	Hydrochlorothiazide	HCTZ tab	ก	-
3	Mannitol	sterile sol	ก	-
4	Spironolactone	tab	ก	-
5	Amiloride hydrochloride + Hydrochlorothiazide	HCTZ tab (เฉพาะ 5 + 50 mg)	ข	-
2.3. Anti-arrhythmic drugs				
1	Adenosine	sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
2	Atropine sulfate	sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
3	Lidocaine hydrochloride (preservative free) ยกเว้นพรีพาร์	sterile sol (เฉพาะ 1%,2%)/sterile sol (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
4	Magnesium sulfate	sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
5	Verapamil	sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
6	Amiodarone hydrochloride	tab, sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
7	Flecainide acetate	tab	ง	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
8 Propafenone hydrochloride		tab	ง	ดูเพิ่ม
2.4. Beta-adrenoceptor blocking drugs				
1 Atenolol		tab	ก	-
2 Metoprolol tartrate		immediate release tab	ก	-
3 Propranolol hydrochloride		tab	ก	-
4 Carvedilol		tab	ค	ดูเพิ่ม
5 Labetalol hydrochloride ยาก้ำพริ้ว		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
6 Esmolol hydrochloride		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
2.5. Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs				
2.5.1. Vasodilator antihypertensive drugs				
1 Hydralazine hydrochloride ยาก้ำพริ้วเฉพาะรูปแบบ sterile pwdr		tab, sterile pwdr	ก	ดูเพิ่ม
2 Sodium nitroprusside ยาก้ำพริ้ว		sterile pwdr	ก	ดูเพิ่ม
2.5.2. Centrally acting antihypertensive drugs				
1 Methyldopa		tab	ก	ดูเพิ่ม
2.5.3. Alpha-adrenoceptor blocking drugs				
1 Prazosin hydrochloride		tab	ข	-
2 Doxazosin mesilate		immediate release tab	ค	-
2.5.4. Angiotensin-converting enzyme inhibitors				
1 Enalapril maleate		tab	ก	-
2 Captopril		tab	ก	ดูเพิ่ม
3 Lisinopril		tab	ค	ดูเพิ่ม
2.5.5. Angiotensin-II receptor antagonists				
1 Losartan potassium		tab (เฉพาะ 50, 100 mg)	ข	ดูเพิ่ม
2.6. Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators				
2.6.1. Nitrates				
1 Glyceryl trinitrate		sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
2 Isosorbide dinitrate		tab, sublingual tab	ก	-
3 Isosorbide mononitrate		tab	ก	-
2.6.2. Calcium-channel blockers				
ยากลุ่มนี้ชนิดที่เป็น short-acting dihydropyridine (เช่น nifedipine immediate release) ไม่แนะนำให้ใช้รักษา essential hypertension, hypertensive emergencies, hypertensive urgency และ angina pectoris เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกว่า				
1 Amlodipine besilate		tab	ก	-
2 Diltiazem hydrochloride		slow release cap/tab (เฉพาะ 120 mg) ไม่รวมชนิด controlled release	ก	ดูเพิ่ม
3 Verapamil hydrochloride		tab, SR tab (เฉพาะ 240 mg)	ก	ดูเพิ่ม
4 Diltiazem hydrochloride		immediate release tab	ข	ดูเพิ่ม
5 Lercanidipine hydrochloride		tab (เฉพาะ 20 mg)	ข	ดูเพิ่ม
6 Manidipine hydrochloride		tab (เฉพาะ 20 mg)	ข	ดูเพิ่ม
7 Nicardipine hydrochloride		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
8 Nifedipine		SR cap/SR tab (เฉพาะ 20 mg)	ง	ดูเพิ่ม
9 Nimodipine		tab, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
2.6.3. Other vasodilators				
1 Sildenafil (as citrate)		tab	ง	ดูเพิ่ม
2.7. Sympathomimetics				
2.7.1. Inotropic sympathomimetics				

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
1 Dopamine hydrochloride		sterile sol	ก	-
2 Isoprenaline hydrochloride	Isoproterenol hydrochloride	sterile sol	ก	-
3 Dobutamine hydrochloride		sterile sol	ข	-
2.7.2. Vasoconstrictor sympathomimetics				
1 Norepinephrine	Noradrenaline	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ก	-
2 Ephedrine hydrochloride		sterile sol	ค	-
3 Midodrine hydrochloride ยากำพรั้ง		tab	ค	ดูเพิ่มเติม
2.7.3. Drugs used in cardiopulmonary resuscitation				
1 Epinephrine	Adrenaline	sterile sol	ก	-
2.8. Anticoagulants				
1 Warfarin sodium		tab	ค	-
2 Heparin sodium		sterile sol	ค	-
3 Enoxaparin sodium		sterile sol	ค	ดูเพิ่มเติม
4 Fondaparinux sodium		sterile sol (2.5 mg/0.5 ml)	ง	ดูเพิ่มเติม
2.9. Antiplatelet drugs				
1 Aspirin	Acetylsalicylic acid	tab (เฉพาะ 75-325 mg), EC tab (เฉพาะ 75-325 mg)	ก	-
2 Clopidogrel bisulfate		tab	ค	ดูเพิ่มเติม
3 Dipyridamole		sterile sol	ง	ดูเพิ่มเติม
4 Eptifibatide		sterile sol	ง	ดูเพิ่มเติม
5 Ticagrelor		tab (เฉพาะ 90 mg)	ง	ดูเพิ่มเติม
2.10. Fibrinolytic drugs				
1 Streptokinase		sterile pwdr	ก	-
2 Alteplase	Recombinant tissue - type plasminogen activator	sterile pwdr	ง	ดูเพิ่มเติม
3 Tenecteplase		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่มเติม
2.11. Hemostatics				
1 Tranexamic acid		sterile sol	ก	ดูเพิ่มเติม
2 Tranexamic acid		cap	ค	ดูเพิ่มเติม
3 Human thrombin + Calcium chloride + Fibrinogen +Tranexamic acid		sterile sol	ง	ดูเพิ่มเติม
4 Factor VIII concentrate, dried		sterile preparation for intravenous use	จ(2)	ดูเพิ่มเติม
5 Factor IX concentrate, dried		sterile preparation for intravenous use	จ(2)	ดูเพิ่มเติม
6 Factor IX complex (coagulation factors II, VII, IX, X) concentrate, dried		sterile preparation for intravenous use	จ(2)	ดูเพิ่มเติม
2.12. Lipid-regulating drugs				
1 Gemfibrozil		cap (เฉพาะ 300, 600 mg), tab (เฉพาะ 600 mg)	ก	-
2 Nicotinic acid		immediate release tab	ก	-
3 Simvastatin		tab (เฉพาะ 10, 20 และ 40 mg)	ก	ดูเพิ่มเติม
4 Colestyramine	Cholestyramine	oral pwdr	ข	-
5 Fenofibrate		cap (เฉพาะ 100, 200)	ค	-
6 Atorvastatin		tab (เฉพาะ 40 mg)	ง	ดูเพิ่มเติม
3. Respiratory system				
3.1. Bronchodilators				

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
3.1.1. Adrenoceptor agonists				
1 Procaterol hydrochloride		syr	ก	-
2 Salbutamol sulfate		tab, aqueous sol, DPI, MDI, sol for nebulizer	ก	-
3 Terbutaline sulfate		tab, syr, sterile sol	ก	-
4 Terbutaline sulfate		sol for nebulizer	ก	-
5 Procaterol hydrochloride		tab	ข	-
3.1.2. Compound antimuscarinic bronchodilators				
1 Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide		MDI, sol for nebulizer	ก	-
2 Tiotropium bromide		DPI (เฉพาะ 18 mcg)	ค	ดูเพิ่ม
3.1.3. Theophylline				
1 Aminophylline		tab, sterile sol	ก	-
2 Theophylline		SR cap, SR tab	ก	-
3 Theophylline + Glyceril guaiacolate		syr (50 + 30 mg in 5 ml)	ก	ดูเพิ่ม
3.2. Corticosteroids				
1 Budesonide		DPI, MDI, susp for nebulizer	ก	-
2 Fluticasone propionate		susp for nebulizer	ก	-
3 Fluticasone propionate		MDI	ค	ดูเพิ่ม
4 Budesonide + Formoterol		DPI	ค	ดูเพิ่ม
5 Fluticasone propionate + Salmeterol		DPI, MDI	ค	ดูเพิ่ม
3.3. Leukotriene receptor antagonists				
1 Montelukast sodium		chewable tab (เฉพาะ 5 mg), film coated tab (เฉพาะ 10 mg), oral granules (เฉพาะ 4 mg)	ค	ดูเพิ่ม
3.4. Antihistamines				
ไม่ค่อยใช้ antihistamines เป็นประจำ (routinely) ในโรคหวัด (common cold) เนื่องจากมีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาหลอก (placebo)				
1 Brompheniramine maleate		tab, syr	ก	-
2 Chlorpheniramine maleate	Chlorphenamine maleate	cap, tab, syr, sterile sol	ก	-
3 Diphenhydramine hydrochloride		cap, sterile sol	ก	-
4 Hydroxyzine hydrochloride		tab, syr	ก	-
5 Cetirizine hydrochloride		tab, syr	ก	-
6 Loratadine		tab, syr	ก	-
3.5. Pulmonary surfactants				
1 Phospholipids (ชนิด Poractant alfa หรือ Beractant)		sterile intratracheal susp	ง	ดูเพิ่ม
3.6. Cough preparations				
3.6.1. Cough suppressants				
1 Dextromethorphan hydrobromide		tab, syr	ก	-
2 Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound	Brown Mixture ; Mist. Tussis	mixt (hosp)	ก	-
3 Squill and Ammonia Mixture		mixt (hosp)	ก	-
4 Codeine phosphate + Glyceril guaiacolate		tab/cap (เฉพาะ 10 + 100 mg)	ค	-
3.6.2. Expectorant and demulcent cough preparations				
ยาละลายเสมหะ (mucolytics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีประสิทธิผลทางคลินิกที่ชัดเจน				
1 Ammonium carbonate and senega mixture		mixt (hosp)	ก	-

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
2	Glyceril guaiacolate	tab, syr	ก	-
3.7. Systemic nasal decongestants				
1	Pseudoephedrine hydrochloride วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	tab, syr	ก	-
3.8. Other respiratory preparations				
1	Aromatic Ammonia Spirit	spirit, spirit (hosp)	ก	-
4. Central nervous system				
4.1. Hypnotics and anxiolytics				
ยานอนหลับ (hypnotics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากควรรักษาที่ต้นเหตุของการนอนไม่หลับ การใช้ยาเกินความจำเป็นมีแนวโน้มไปสู่ปัญหาการติดยา				
1	Chloral hydrate วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	oral sol (hosp)	ก	-
2	Chlordiazepoxide วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab	ก	-
3	Diazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab, sterile sol	ก	-
4	Lorazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	tab	ก	-
5	Clonazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	tab	ข	-
6	Dipotassium clorazepate วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab	ข	-
7	Hydroxyzine hydrochloride	tab, syr	ข	-
4.2. Drugs used in psychoses and related disorders				
4.2.1. Antipsychotic drugs				
1	Chlorpromazine hydrochloride	tab, sterile sol	ก	-
2	Fluphenazine	tab (as hydrochloride), sterile sol (as decanoate)	ก	-
3	Haloperidol	tab (as base), oral sol (as base), sterile sol (as base or decanoate)	ก	-
4	Perphenazine	tab	ก	-
5	Trifluoperazine hydrochloride	tab	ก	-
6	Risperidone	tab (ไม่รวมชนิดละลายในปาก), oral sol, oral sol/syr (hosp)	ข	ดูเพิ่ม
7	Clozapine	tab	ค	ดูเพิ่ม
8	Flupentixol	Flupentixol tab (as hydrochloride), sterile sol (as decanoate)	ค	ดูเพิ่ม
9	Pimozide	tab	ค	ดูเพิ่ม
10	Thioridazine hydrochloride	tab	ค	-
11	Zuclopenthixol	tab (as hydrochloride), sterile sol/sterile emulsion (as acetate or decanoate)	ค	ดูเพิ่ม
12	Quetiapine fumarate	Immediate release tab (เฉพาะ 200mg)	ง	ดูเพิ่ม
4.2.2. Antimanic drugs				
1	Carbamazepine	tab	ก	-
2	Lithium carbonate	cap, tab	ก	-
3	Sodium valproate	EC tab, oral sol	ก	-
4	Carbamazepine	SR tab	ข	-
5	Sodium valproate	SR tab	ข	-
6	Lamotrigine	tab (เฉพาะ 25, 50, 100 mg)	ค	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
4.3. Antidepressant drugs				
1 Amitriptyline hydrochloride		tab	ก	-
2 Fluoxetine hydrochloride		cap, tab	ก	-
3 Imipramine hydrochloride		tab	ก	-
4 Nortriptyline hydrochloride		tab	ก	-
5 Mianserin hydrochloride		tab	ข	-
6 Sertraline		tab (เฉพาะ 50 mg)	ข	-
7 Clomipramine hydrochloride		cap, tab	ค	-
8 Trazodone hydrochloride		tab	ค	-
4.4. Central nervous system stimulants				
1 Methylphenidate วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		tab (เฉพาะ 10 mg)	ค	ดูเพิ่ม
4.5. Drugs used in nausea and vertigo				
4.5.1. Drugs used in nausea and vomiting				
1 Domperidone		tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก	-
2 Metoclopramide		tab, syr, sterile sol	ก	-
3 Ondansetron		tab (as base or hydrochloride), sterile sol (hydrochloride)	ข	-
4 Olanzapine		tab (เฉพาะ 5 และ 10mg ไม่รวมชนิดเม็ดละลายในน้ำปาก)	ง	ดูเพิ่ม
4.5.2. Drugs used in vestibular disorders				
1 Dimenhydrinate		compressed tab, film coated tab, syr, sterile sol	ก	-
2 Betahistine mesilate	Betahistine mesylate	tab (เฉพาะ 6, 12 mg)	ข	-
4.6. Analgesics and antipyretics				
1 Paracetamol	Acetaminophen	tab, syr	ก	ดูเพิ่ม
2 Aspirin	Acetylsalicylic acid	compressed tab, film coated tab (เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)	ก	ดูเพิ่ม
3 Ibuprofen		film coated tab, susp	ก	ดูเพิ่ม
4.7. Analgesics				
4.7.1. Opioid analgesics				
1 Buprenorphine hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sublingual tab, sterile sol	ค	-
2 Codeine phosphate วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		tab	ค	-
3 Fentanyl วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sterile sol (as citrate), transdermal therapeutic system (as base)	ค	ดูเพิ่ม
4 Methadone hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		tab, oral sol	ค	-
5 Morphine sulfate วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		cap, tab, SR cap, SR tab, oral sol, sterile sol	ค	-
6 Nalbuphine hydrochloride		sterile sol	ค	-
7 Pethidine hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sterile sol	ค	-
8 Tramadol hydrochloride		cap, tab, SR cap, SR tab, sterile sol	ค	-
4.7.2. Drugs for neuropathic pain				
1 Amitriptyline hydrochloride			ก	-
2 Nortriptyline hydrochloride		tab	ก	-

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
3 Carbamazepine		tab	ก	-
4 Carbamazepine		SR tab	ข	-
5 Gabapentin		cap (เฉพาะ 100, 300, 400 mg), tab (เฉพาะ 600 mg)	ง	ดูเพิ่ม
4.7.3. Antimigraine drugs				
4.7.3.1. Drugs for acute migraine attack				
1 Paracetamol	Acetaminophen	tab	ก	-
2 Aspirin	Acetylsalicylic acid	compressed tab, film coated tab (เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)	ก	ดูเพิ่ม
3 Ibuprofen		film coated tab	ก	-
4 Ergotamine tartrate + Caffeine		compressed tab, film coated tab (เฉพาะ 1 + 100 mg)	ค	-
5 Dihydroergotamine mesilate ยาแก้ปวด		sterile sol (เฉพาะ 1mg/ml)	ง	ดูเพิ่ม
4.7.3.2. Drugs used in the prophylaxis of migraine				
1 Amitriptyline hydrochloride		tab	ก	-
2 Propranolol hydrochloride		tab	ก	-
3 Cyproheptadine hydrochloride		tab	ข	-
4 Sodium valproate		EC tab, SR tab	ง	ดูเพิ่ม
5 Topiramate		tab	ง	ดูเพิ่ม
4.8. Antiepileptics				
4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy				
1 Carbamazepine		tab, syr, susp	ก	-
2 Magnesium sulfate		sterile sol	ก	-
3 Phenobarbital วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	Phenobarbitone	tab (as base), sterile powdr, sterile sol	ก	-
4 Phenytoin base		chewable tab	ก	-
5 Phenytoin sodium		cap, SR cap, sterile sol	ก	-
6 Sodium valproate		EC tab, SR tab, oral sol, sterile powdr	ก	-
7 Carbamazepine		SR tab	ข	-
8 Clonazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		tab	ข	-
9 Lamotrigine		tab (เฉพาะ 25, 50, 100 mg)	ง	ดูเพิ่ม
10 Levetiracetam		tab (เฉพาะ 250 และ 500 mg), oral sol	ง	ดูเพิ่ม
11 Nitrazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		tab	ง	ดูเพิ่ม
12 Topiramate		cap, tab	ง	ดูเพิ่ม
13 Vigabatrin		tab	ง	ดูเพิ่ม
4.8.2. Drugs used in status epilepticus				
1 Diazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		sterile sol	ก	-
2 Lorazepam ยาแก้ปวด		inj	ก	-
3 Phenobarbital sodium วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	Phenobarbitone sodium	sterile powdr, sterile sol	ก	-
4 Phenytoin sodium		sterile sol	ก	-
5 Sodium valproate		sterile powdr	ค	-
6 Levetiracetam		concentrate for solution for infusion	ง	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
7 Midazolam hydrochloride วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
4.9. Drugs used in movement disorders				
1 Diazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		cap, tab	ก	-
2 Levodopa + Benserazide as hydrochloride	Co-beneldopa	cap/tab (200 + 50 mg)	ก	-
3 Levodopa + Carbidopa as monohydrate	Co-careldopa	tab (100 + 25 mg, 250 + 25 mg)	ก	-
4 Propranolol hydrochloride		tab	ก	ดูเพิ่ม
5 Trihexyphenidyl hydrochloride		tab	ก	-
6 Baclofen		tab	ข	-
7 Clonazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		tab	ข	-
8 Levodopa + Benserazide as hydrochloride	Co-beneldopa	CR cap/dispersible tab (100 + 25 mg)	ข	-
9 Bromocriptine mesilate		tab	ค	-
10 Absolute Alcohol ยาแก้พริ้ว		inj	ง	ดูเพิ่ม
11 Amantadine hydrochloride ยาแก้พริ้ว		tab (เฉพาะ 100mg)	ง	ดูเพิ่ม
12 Entacapone		tab	ง	ดูเพิ่ม
13 Phenol ยาแก้พริ้ว	Phenyl Alcohol	inj	ง	ดูเพิ่ม
14 Ropinirole		SR tab (เฉพาะ 2mg,4mg)	ง	ดูเพิ่ม
15 Tetrabenazine ยาแก้พริ้ว		tab (เฉพาะ 12.5mg, 25mg)	ง	ดูเพิ่ม
16 Botulinum A toxin		sterile pwdr (เฉพาะ 100 และ 500 IU)	จ(2)	ดูเพิ่ม
4.10. Drugs used in substance dependence				
4.10.1. Drugs used in alcohol dependence				
1 Disulfiram		tab	ค	ดูเพิ่ม
4.10.2. Drugs used in smoking cessation				
1 Nortriptyline hydrochloride		tab	ก	-
4.10.3. Drugs used in opioid dependence				
1 Clonidine hydrochloride		tab	ข	ดูเพิ่ม
2 Methadone hydrochloride ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		oral sol	ง	ดูเพิ่ม
4.11 Drugs used in dementia				
1 Donepezil hydrochloride		tab (เฉพาะ 5 mg และ 10 mg ไม่รวมชนิดละลายในปาก)	จ(2)	ดูเพิ่ม
5. Infections				
5.1. Antibacterial drugs				
5.1.1. Penicillins				
1 Amoxicillin trihydrate		cap, dry syr	ก	-
2 Ampicillin sodium		sterile pwdr	ก	-
3 Cloxacillin sodium		sterile pwdr	ก	-
4 Dicloxacillin sodium		cap, dry syr	ก	-
5 Phenoxyethylpenicillin potassium	Penicillin V	cap, tab, dry syr	ก	-
6 Benzylpenicillin	Penicillin G	sterile pwdr (as sodium or potassium)	ก	-
7 Benzathine benzylpenicillin	Penicillin G benzathine	sterile pwdr	ก	-
8 Procaine benzylpenicillin	Penicillin G procaine	sterile sol, sterile susp	ก	-
9 Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Co-amoxiclav	tab (เฉพาะ 500/125, 875/125 mg), dry syr (เฉพาะ 400/57 mg)	ค	ดูเพิ่ม
10 Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate	Co-amoxiclav	sterile pwdr	ค	ดูเพิ่ม
11 Ampicillin sodium + Sulbactam sodium		sterile pwdr	ค	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
12 Piperacillin sodium + Tazobactam sodium		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams				
1 Cefalexin	Cephalexin	cap, dry syr	ก	ดูเพิ่ม
2 Cefazolin sodium		sterile pwdr	ก	ดูเพิ่ม
3 Cefuroxime axetil		tab, dry syr	ข	ดูเพิ่ม
4 Cefotaxime sodium		sterile pwdr	ค	ดูเพิ่ม
5 Ceftriaxone sodium		sterile pwdr	ค	ดูเพิ่ม
6 Ceftazidime		sterile pwdr	ค	ดูเพิ่ม
7 Cefixime		cap, dry syr	ง	ดูเพิ่ม
8 Cefoperazone sodium + Sulbactam sodium		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
9 Cefoxitin sodium		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
10 Ertapenem sodium		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
11 Imipenem + Cilastatin sodium		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
12 Meropenem		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
5.1.3. Tetracyclines				
1 Doxycycline hyclate	Doxycycline hydrochloride	cap, tab	ก	-
2 Tetracycline hydrochloride		cap, tab	ก	-
5.1.4. Aminoglycosides				
ยา streptomycin sulfate, amikacin sulfate และ kanamycin sulfate ดูที่ Antituberculous drugs				
1 Neomycin sulfate		tab	ก	ดูเพิ่ม
2 Gentamicin sulfate		sterile sol	ก	-
3 Amikacin sulfate		sterile sol	ข	ดูเพิ่ม
4 Netilmicin sulfate		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
5.1.5. Macrolides				
1 Erythromycin estolate		susp/dry syr	ก	ดูเพิ่ม
2 Erythromycin stearate or succinate		dry syr	ก	-
3 Roxithromycin		cap/tab (เฉพาะ 100 และ 150 mg)	ก	-
4 Azithromycin		cap (ไม่รวมชนิดออกฤทธิ์นาน), dry syrup (ไม่รวมชนิดของและชนิดออกฤทธิ์นาน)	ง	ดูเพิ่ม
5 Azithromycin		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
6 Clarithromycin		tab, dry syr	ง	ดูเพิ่ม
5.1.6. Quinolones				
1 Norfloxacin		tab	ก	-
2 Ofloxacin		tab (เฉพาะ 100, 200 mg)	ข	ดูเพิ่ม
3 Ciprofloxacin hydrochloride		tab	ง	ดูเพิ่ม
4 Ciprofloxacin lactate		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
5 Levofloxacin hemihydrate		tab (เฉพาะ 500 mg)	ง	ดูเพิ่ม
6 Levofloxacin hemihydrate		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
5.1.7. Some other antibacterials				
1 Chloramphenicol sodium succinate		sterile pwdr	ค	ดูเพิ่ม
2 Metronidazole		cap/tab (as base), susp (as benzoate), sterile sol (as base)	ก	-
3 Clindamycin		cap (as hydrochloride), sterile sol (as phosphate)	ข	ดูเพิ่ม
4 Nitrofurantoin		tab	ข	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
5 Colistimethate sodium	Sodium colistimethane-sulphonate	sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
6 Fosfomycin sodium		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
7 Sodium fusidate		tab	ง	ดูเพิ่ม
8 Vancomycin hydrochloride		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
9 Linezolid		tab	จ(2)	ดูเพิ่ม
5.1.8. Sulphonamides and trimethoprim				
1 Sulfamethoxazole + Trimethoprim	Co-trimoxazole	cap, tab, susp, sterile sol	ก	-
2 Trimethoprim		tab	ข	ดูเพิ่ม
5.1.9. Antituberculous drugs				
1 Ethambutol hydrochloride		film coated tab	ก	-
2 Isoniazid		tab	ก	-
3 Pyrazinamide		tab	ก	-
4 Rifampicin		cap, tab, dry syr, syr, susp	ก	-
5 Rifampicin ยากำพรั้		oral form (for pediatric use)	ก	ดูเพิ่ม
6 Streptomycin sulfate		sterile pwdr	ก	-
7 Tuberculin Purified Protein Derivative	Tuberculin PPD	inj	ก	-
8 Isoniazid + Rifampicin		cap/tab (เฉพาะ 100 + 150 mg และ 150 + 300 mg)	ข	ดูเพิ่ม
9 Isoniazid + Rifampicin ยากำพรั้		oral form (for pediatric use)	ข	-
10 Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide		tab (เฉพาะ 75 + 150 + 400 mg)	ข	ดูเพิ่ม
11 Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide + Ethambutol hydrochloride		tab (เฉพาะ 75 + 150 + 400 + 275 mg)	ข	ดูเพิ่ม
12 Amikacin sulfate		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
13 Cycloserine		cap	ค	ดูเพิ่ม
14 Ethionamide		tab	ค	ดูเพิ่ม
15 Kanamycin sulfate		sterile pwdr	ค	ดูเพิ่ม
16 Para-aminosalicylic acid	PAS	EC tab	ค	ดูเพิ่ม
17 Levofloxacin hemihydrate		tab (เฉพาะ 500 mg), sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
18 Bedaquiline fumarate		tab	จ(1)	ดูเพิ่ม
19 Clofazimine		cap	จ(1)	ดูเพิ่ม
20 Delamanid		tab	จ(1)	ดูเพิ่ม
21 Linezolid		tab	จ(1)	ดูเพิ่ม
22 Moxifloxacin hydrochloride		tab	จ(1)	ดูเพิ่ม
23 Protionamide		tab	จ(1)	ดูเพิ่ม
5.1.10. Antileprotic drugs				
1 Clofazimine		cap	ก	ดูเพิ่ม
2 Dapsone		tab	ก	-
5.2. Antifungal drugs				
1 Fluconazole		cap	ก	ดูเพิ่ม
2 Griseofulvin		tab	ก	-
3 Nystatin		oral susp	ก	-
4 Saturated solution of potassium iodide	SSKI	sol (hosp)	ก	-
5 Itraconazole		cap	ค	ดูเพิ่ม
6 Amphotericin B		sterile pwdr (เฉพาะ conventional formulations)	ค	ดูเพิ่ม
7 Fluconazole		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
8 Flucytosine ยากำพรั้า		tab (เฉพาะ 500mg)	ง	ดูเพิ่ม
9 Itraconazole		oral sol	ง	ดูเพิ่ม
10 Liposomal amphotericin B		sterile pwdr	จ(2)	ดูเพิ่ม
11 Micafungin sodium		sterile pwdr (เฉพาะ 50mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
12 Voriconazole		tab, sterile pwdr	จ(2)	ดูเพิ่ม
5.3. Antiviral drugs				
5.3.1. Non-antiretrovirals				
Aciclovir ชนิด topical (Aciclovir cream) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากมีประสิทธิผลต่ำและไม่แนะนำให้ใช้				
1 Aciclovir	Acyclovir	tab, oral susp, oral susp (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
2 Aciclovir sodium	Acyclovir sodium	sterile pwdr, sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
3 Cidofovir ยากำพรั้า		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
4 Ganciclovir sodium		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
5 Peramivir ยากำพรั้า		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
6 Oseltamivir phosphate		cap, dry syr	จ(1)	ดูเพิ่ม
5.3.2. Antiretrovirals				
ยากลุ่มนี้เป็นยาตามนโยบายเอ็ดส์แห่งชาติของกรมควบคุมโรค สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง				
1 Efavirenz	EFV	cap, tab	ก	-
2 Lamivudine	3TC	tab, syr	ก	-
3 Nevirapine	NVP	tab, susp	ก	-
4 Tenofovir disoproxil fumarate	TDF	tab	ก	-
5 Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine	TDF+FTC	tab (300 + 200 mg)	ก	-
6 Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine + Efavirenz	TDF+FTC+EFV	tab (300 + 200 + 600 mg)	ก	-
7 Zidovudine	AZT	cap, oral sol	ก	-
8 Zidovudine + Lamivudine	AZT+3TC	tab (เฉพาะ 300+150 mg)	ก	-
9 Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine	AZT+3TC+NVP	tab (เฉพาะ 250 + 150 +200 mg)	ก	-
10 Lamivudine + Stavudine + Nevirapine	3TC+d4T+NVP	tab (เฉพาะ 150+30+200 mg)	ข	-
11 Rilpivirine	RPV	tab	ข	ดูเพิ่ม
12 Stavudine	d4T	cap, dry syr	ข	-
13 Atazanavir sulfate	ATV	cap	ค	-
14 Lopinavir + Ritonavir	LPV+RTV	tab, oral sol	ค	-
15 Ritonavir	RTV	cap, oral sol, tab	ค	-
16 Abacavir	ABC	tab	ง	ดูเพิ่ม
17 Abacavir + Lamivudine	ABC+3TC	tab (600 + 300 mg)	ง	ดูเพิ่ม
18 Didanosine	ddl	tab, oral pwdr	ง	ดูเพิ่ม
19 Darunavir (DRV)	DRV	tab (เฉพาะ 300และ 600mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
20 Raltegravir	RAL	tab (เฉพาะ 400mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
21 Dolutegravir	DTG	tab (เฉพาะ 50 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
5.3.3. Viral hepatitis				
1 Lamivudine	3TC	tab (เฉพาะ 100, 150 mg)	ง	ดูเพิ่ม
2 Tenofovir disoproxil fumarate		tab	ง	ดูเพิ่ม
3 Ribavirin		cap/tab (เฉพาะ 200 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
4 Entecavir		tab (เฉพาะ0.5mg)	ง	ดูเพิ่ม
5 Sofosbuvir + Velpatasvir		tab (เฉพาะ 400 mg + 100 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
5.4. Antiprotozoal drugs				
5.4.1. Antimalarials				
ยากลุ่มนี้ให้ใช้ได้ตามข้อกำหนดในแนวเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักโรคติดต่ออันตราย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เป็นยารักษาโรคมาลาเรียเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการป้องกันโรคมาลาเรีย				
1	Chloroquine phosphate	tab	ก	-
2	Primaquine phosphate	tab	ก	-
3	Quinine	compressed/film coated tab (as sulfate), sterile sol (as dihydrochloride)	ก	-
4	Artesunate	tab (ไม่รวม lactab และ rectocap), sterile powdr	ค	-
5	Mefloquine hydrochloride	tab	ค	-
5.4.2. Other antiprotozoal drugs				
1	Metronidazole	cap/tab (as base), susp (as benzoate), sterile sol (as base)	ก	ดูเพิ่ม
2	Pyrimethamine	tab	ก	ดูเพิ่ม
3	Sulfadiazine	tab	ก	ดูเพิ่ม
4	Pentamidine isethionate	Pentamidine isethionate sterile powdr	ง	ดูเพิ่ม
5.5. Anthelmintics				
1	Albendazole	tab, susp	ก	-
2	Diethylcarbamazine citrate	tab	ก	-
3	Mebendazole	tab, susp, susp (hosp)	ก	-
4	Niclosamide	tab	ก	-
5	Praziquantel	tab	ก	-
6	Ivermectin	tab	ข	ดูเพิ่ม
7	Ivermectin ยากำพร้าว	sterile sol	ง	
5.6. Antiseptics				
1	Chlorhexidine gluconate	sol (aqueous) (เฉพาะ 2%, 4% และ 5%), sol/sol (hosp) (เฉพาะ 2%, 4% in 70% alcohol)	ก	ดูเพิ่ม
2	Ethyl alcohol	sol, sol (hosp), gel (hosp)	ก	-
3	Gentian violet	sol (paint)	ก	-
4	Hydrogen peroxide	sol	ก	-
5	Potassium permanganate	powdr (hosp)	ก	-
6	Povidone-iodine	sol, sol (hosp)	ก	-
6. Endocrine system				
6.1. Drugs used in diabetes				
6.1.1. Insulins				
1	Biphasic isophane insulin	Soluble insulin + Isophane insulin	sterile susp	ก -
2	Isophane insulin	NPH; Isophane protamine insulin	sterile susp	ก -
3	Soluble insulin	Neutral insulin; insulin injection	sterile sol	ก -
4	Insulin aspart		sterile sol	ง ดูเพิ่ม
5	Insulin aspart + insulin aspart protamine		sterile susp (เฉพาะ 30%+70%)	ง ดูเพิ่ม
6	Insulin lispro		sterile sol	ง ดูเพิ่ม
7	Insulin lispro+insulin lispro protamine		sterile susp (เฉพาะ 25%+75%)	ง ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name		ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
8	Insulin glargine		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
6.1.2. Oral antidiabetic drugs					
1	Glibenclamide		tab (เฉพาะ 2.5, 5 mg)	ก	ดูเพิ่ม
2	Glipizide		tab	ก	-
3	Metformin hydrochloride		tab	ก	-
4	Acarbose		tab	ค	ดูเพิ่ม
5	Pioglitazone hydrochloride		tab (เฉพาะ 15, 30 mg)	ง	ดูเพิ่ม
6	Repaglinide		tab (เฉพาะ 0.5, 1, 2 mg)	ง	ดูเพิ่ม
6.1.3. Treatment of hypoglycemia					
1	Diazoxide ยากำพรั้า		tab	ง	ดูเพิ่ม
2	Glucagon,human ยากำพรั้า		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
6.2. Thyroid and antithyroid drugs					
6.2.1. Thyroid hormones					
1	Levothyroxine sodium	L-thyroxine sodium	tab	ก	-
2	Liothyronine sodium ยากำพรั้า		tab	ง	ดูเพิ่ม
6.2.2. Antithyroid drugs					
1	Lugol's solution	Aqueous iodine oral solution, Strong iodine solution	oral sol (hosp)	ก	-
2	Propylthiouracil		tab	ก	-
3	Saturated solution of potassium iodide	SSKI	oral sol (hosp)	ก	-
4	Thiamazole	Methimazole	tab	ก	-
6.3. Corticosteroids					
1	Dexamethasone		cap/tab (as base), sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก	-
2	Hydrocortisone ชนิดเม็ดเป็นยากำพรั้า		tab (as base), sterile pwdr (as sodium succinate), sterile susp (as acetate)	ก	ดูเพิ่ม
3	Prednisolone		cap, tab	ก	-
4	Fludrocortisone acetate ยากำพรั้า		tab	ข	ดูเพิ่ม
5	Methylprednisolone		sterile pwdr/sterile susp (as hemisuccinate or sodium succinate or acetate)	ค	-
6	Triamcinolone acetonide		sterile susp	ค	ดูเพิ่ม
6.4. Sex hormones					
6.4.1. Female sex hormones					
1	Conjugated estrogens		tab	ก	-
2	Medroxyprogesterone acetate		tab (เฉพาะ 2.5, 5 และ 10 mg)	ก	-
3	Norethisterone		tab	ก	-
4	Estradiol (17β-estradiol)		gel (เฉพาะ 0.06%)	ข	-
5	Estradiol valerate		tab	ข	-
6	Hydroxyprogesterone caproate		sterile oily sol for inj	ข	-
7	Conjugated estrogens		sterile pwdr	ค	-
6.4.2. Male sex hormones and antagonists					
1	Testosterone enantate	Testosterone enanthate	sterile oily sol for inj	ค	-
2	Cyproterone acetate		tab	ง	ดูเพิ่ม
6.5. Hypothalamic and pituitary hormones					
6.5.1. Hypothalamic and anterior pituitary hormones					
1	Chrorionic gonadotrophin	Human Chorionic Gonadotrophin : HCG	sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
2 Octreotide acetate		sterile powdr (ชนิดออกฤทธิ์นาน เฉพาะ 20 และ 30 mg/vial)	จ(2)	ดูเพิ่ม
3 Tetracosactide ยากำพร้าว	Cosyntropin	sterile powdr	ง	ดูเพิ่ม
4 Thyrotropin alfa		sterile powdr	จ(2)	ดูเพิ่ม
6.5.2. Posterior pituitary hormones and antagonists				
1 Chlorpropamide		tab	ง	ดูเพิ่ม
2 Desmopressin acetate	DDAVP	tab, nasal spray, nasal sol, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
6.6. Drugs affecting bone metabolism				
1 Alendronate sodium		tab (เฉพาะ 70 mg)	ง	ดูเพิ่ม
2 Calcitonin-salmon		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
3 Disodium pamidronate		sterile powdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
4 Zoledronic acid		sterile sol (เฉพาะ 4 mg/5 ml)	ง	ดูเพิ่ม
6.7. Other endocrine drugs				
6.7.1. Bromocriptine and other dopaminergic drugs				
1 Bromocriptine mesilate		tab	ค	ดูเพิ่ม
6.7.2. Drugs affecting gonadotrophins				
1 Leuporelin acetate		sterile powdr (เฉพาะ 3.75 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
2 Triptorelin pamoate		sterile powdr (เฉพาะ 11.25 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
6.7.3. Drugs used in endogenous glucocorticoid and androgen overproduction				
1 Ketoconazole		tab	ง	ดูเพิ่ม
7. Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders				
7.1. Drugs used in obstetrics				
7.1.1. Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics				
1 Methylergometrine maleate		sterile sol	ก	-
2 Oxytocin		sterile sol	ก	-
3 Alprostadil		sterile sol (เฉพาะ 0.5 mg/ml)	ง	ดูเพิ่ม
4 Indomethacin sodium ยากำพร้าว		sterile powdr	ง	ดูเพิ่ม
5 Sulprostone		sterile powdr	ง	ดูเพิ่ม
6 Misoprostol+Mifepristone		tab (200mcg+200mg ชนิด combination pack)	จ(1)	ดูเพิ่ม
7.1.2. Myometrial relaxants				
1 Terbutaline sulfate		tab, sterile sol	ก	-
7.2. Treatment of vaginal and vulval conditions				
1 Clotrimazole		vaginal tab	ก	-
2 Nystatin		vaginal tab	ก	-
3 Conjugated estrogens		vaginal cream	ข	-
7.3. Contraceptives				
1 Etonogestrel		implant 1 rod (68 mg/rod)	ก	-
2 Ethinylestradiol + Levonorgestrel		tab (เฉพาะ 30 + 150 mcg)	ก	-
3 Levonorgestrel		tab (เฉพาะ 750 mcg), implant 2 rods (75 mg/rod)	ก	ดูเพิ่ม
4 Medroxyprogesterone acetate		sterile susp	ก	-
5 Ethinylestradiol + Desogestrel		tab (เฉพาะ 20 + 150 mcg)	ข	-
6 Lynestrenol		tab (เฉพาะ 0.5 mg)	ข	-

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
7.4. Drugs for genito-urinary disorders				
7.4.1. Drugs for benign prostatic hyperplasia				
1	Alfuzosin hydrochloride	SR tab (เฉพาะ 10 mg)	ค	-
2	Doxazosin mesilate	immediate release tab (เฉพาะ 2 และ 4 mg)	ค	-
3	Finasteride	tab (เฉพาะ 5 mg)	ง	ดูเพิ่ม
7.4.2. Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence				
1	Oxybutynin hydrochloride	immediate release tab	ค	ดูเพิ่ม
7.4.3. Drugs used in alkalisation of urine				
1	Potassium citrate	oral sol (hosp), dry pwdr for oral sol (hosp)	ก	-
2	Sodium citrate + Citric acid	Shohl's solution	ก	-
3	Sodium citrate + Potassium citrate	oral sol (hosp)	ก	-
8. Malignant disease and immunosuppression				
8.1. Cytotoxic drugs				
8.1.1. Alkylating drugs				
1	Busulfan	tab	ค	-
2	Chlorambucil	tab	ค	ดูเพิ่ม
3	Cyclophosphamide	tab, sterile pwdr	ค	-
4	Melphalan	tab	ค	-
5	Carmustine ยากำพรั	sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
6	Ifosfamide	sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
7	Procarbazine hydrochloride ยากำพรั	cap, tab	ง	ดูเพิ่ม
8.1.2. Cytotoxic antibiotics				
1	Bleomycin	sterile pwdr (as sulfate or as hydrochloride)	ค	-
2	Dactinomycin	sterile pwdr	ค	-
3	Doxorubicin hydrochloride	sterile pwdr, sterile susp, sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
4	Idarubicin hydrochloride	sterile pwdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
5	Mitomycin	sterile pwdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
6	Mitoxantrone hydrochloride	sterile pwdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
8.1.3. Antimetabolites				
1	Cytarabine	sterile pwdr, sterile sol	ค	-
2	Fluorouracil	sterile sol	ค	-
3	Mercaptopurine	6-MP	ค	-
4	Methotrexate	tab (as base or sodium), sterile pwdr/ sterile sol (as sodium)	ค	-
5	Capecitabine	tab	ง	ดูเพิ่ม
6	Fludarabine phosphate	sterile pwdr (เฉพาะ 50mg)	ง	ดูเพิ่ม
7	Gemcitabine hydrochloride	sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
8	Oxaliplatin	sterile pwdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
9	Tegafur + uracil	cap (100/224 mg)	ง	ดูเพิ่ม
10	Tioguanine	6-TG	ง	ดูเพิ่ม
8.1.4. Vinca alkaloids and etoposide				
1	Etoposide	cap (as base), sterile sol (as base)	ค	-
2	Vinblastine sulfate	sterile pwdr, sterile sol	ค	-
3	Vincristine sulfate	sterile pwdr, sterile sol	ค	-
4	Vinorelbine tartrate	sterile sol (เฉพาะ 10mg/ml)	ง	-

ชื่อยา Generic name		ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
8.1.5. Other antineoplastic drugs					
1	Asparaginase		sterile pwdr	ค	-
2	Cisplatin		sterile pwdr, sterile sol	ค	-
3	Carboplatin		sterile pwdr, sterile sol	ค	-
4	Hydroxycarbamide	Hydroxyurea	cap	ค	-
5	Arsenic trioxide ยากำพร้า		sterile sol, sterile sol (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
6	Calcium folinate	Leucovorin calcium	cap, tab, sterile pwdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
7	Dacarbazine ยากำพร้า		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
8	Mitotane ยากำพร้า		tab (เฉพาะ 500mg)	ง	ดูเพิ่ม
9	Tretinoin	all-trans-Retinoic acid	cap	ง	ดูเพิ่ม
10	Paclitaxel		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
11	Topotecan		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
12	Docetaxel		sterile sol	จ(2)	ดูเพิ่ม
13	Erlotinib		tab (เฉพาะ 150 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
14	Imatinib mesilate		tab (เฉพาะ 100 และ 400 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
15	Nilotinib hydrochloride		cap (เฉพาะ 200 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
16	Dasatinib		tab (เฉพาะ 50 mg และ 70 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
17	Rituximab		sterile sol	จ(2)	ดูเพิ่ม
18	Trastuzumab		sterile pwdr (เฉพาะ 150 mg และ 440 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
8.2. Drugs affecting the immune response					
1	Dexamethasone		cap (as base), tab (as base), sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก	-
2	Prednisolone		cap, tab	ก	-
3	Azathioprine		tab	ค	-
4	Ciclosporin	Cyclosporin	cap, oral sol, oral susp, sterile sol	ค	-
5	Methylprednisolone		sterile pwdr/sterile susp (as hemisuccinate or sodium succinate or acetate)	ค	-
6	Antithymocyte immunoglobulin, rabbit	ATG	sterile pwdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
7	Basiliximab		sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
8	Mycophenolate mofetil		cap, tab	ง	ดูเพิ่ม
9	Tacrolimus		cap, sterile sol (concentrate for infusion)	ง	ดูเพิ่ม
10	Sirolimus	Rapamycin	oral sol (เฉพาะ 1 mg/ml), tab (เฉพาะ 1 mg)	ง	ดูเพิ่ม
11	BCG	Bacillus Calmette-Guérin	freeze-dried pwdr for bladder instillation	ง	ดูเพิ่ม
12	Human normal immunoglobulin, intravenous	IVIG	sterile pwdr, sterile sol	จ(2)	ดูเพิ่ม
13	Everolimus		tab (เฉพาะ 0.25 mg และ 0.5 mg)	ง	ดูเพิ่ม
8.3. Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease					
8.3.1. Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors					
1	Tamoxifen citrate		tab	ค	ดูเพิ่ม
2	Letrozole		tab (เฉพาะ 2.5 mg)	จ(2)	ดูเพิ่ม
3	Megestrol acetate		tab	ง	ดูเพิ่ม
8.3.2. Prostate cancer					
1	Flutamide		tab	ง	ดูเพิ่ม
2	Ketoconazole		tab	ง	ดูเพิ่ม
3	Leuprorelin acetate		sterile pwdr (เฉพาะ 11.25, 22.5 mg)	ง	ดูเพิ่ม
4	Triptorelin pamoate		sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 mg)	ง	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
9. Nutrition and blood				
9.1. Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders				
9.1.1. Whole blood and blood products				
1	Fresh dried plasma		ก	-
2	Fresh frozen plasma		ก	-
3	Frozen cryoprecipitate		ก	-
4	Leukocyte depleted platelets concentrate		ก	-
5	Leukocyte depleted pooled platelets concentrate, random donor	LD-PPC	ก	-
6	Lyophilized cryoprecipitate		ก	-
7	Packed red cell		ก	-
8	Packed red cell, leukocyte depleted		ก	-
9	Packed red cell, leukocyte poor		ก	-
10	Platelets concentrate, random donor		ก	-
11	Platelets concentrate, single donor		ก	-
12	Whole blood		ก	-
13	Leukocyte depleted platelets concentrate, single donor		ข	ดูเพิ่ม
14	Packed red cell, leukocyte depleted single donor 2 units		ข	ดูเพิ่ม
15	Packed red cell, irradiated		ค	ดูเพิ่ม
16	Packed red cell, leukocyte poor, irradiated		ค	ดูเพิ่ม
17	Platelets concentrate, irradiated		ค	ดูเพิ่ม
18	Packed red cell, leukocyte depleted irradiated		ง	ดูเพิ่ม
9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias				
1	Folic acid	tab (เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 mg)	ก	-
2	Oxymetholone	tab	ข	-
3	Deferiprone	tab (เฉพาะ 500 mg)	ค	-
4	Desferrioxamine mesilate	Desferrioxamine mesilate sterile pwdr	ค	ดูเพิ่ม
5	Iron sucrose	sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
6	Antithymocyte immunoglobulin, rabbit	ATG sterile pwdr, sterile sol	จ(2)	ดูเพิ่ม
7	Deferasirox	tab	จ(2)	ดูเพิ่ม
8	Epoetin alfa	epoetin alpha sterile pwdr/sterile sol (เฉพาะ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 IU)	จ(2)	ดูเพิ่ม
9	Epoetin beta	sterile sol (เฉพาะ 2000, 3000, 5000 IU)	จ(2)	ดูเพิ่ม
9.1.3. Drugs used in bone marrow transplantation				
1	Filgrastim	sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
2	Lenograstim	sterile pwdr	ง	ดูเพิ่ม
9.2. Fluids and electrolytes				
1	Glucose with/without sodium chloride	sterile sol	ก	-
2	Intermittent peritoneal dialysis	sterile sol	ก	-
3	Potassium acetate	sterile sol (hosp)	ก	-
4	Potassium chloride	syr, syr (hosp), elixir, elixir (hosp), compressed tab, EC tab, sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
5	Potassium citrate	oral sol (hosp), dry pwdr for oral sol (hosp)	ก	-
6	Sodium acetate	sterile sol (hosp)	ก	-
7	Sodium bicarbonate	tab, sterile sol	ก	-
8	Sodium chloride	tab (เฉพาะ 300 mg), sterile sol	ก	-

ชื่อยา Generic name		ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
9	Sodium lactate intravenous infusion compound	Ringer-Lactate solution for injection ; Hartmann's solution for injection	sterile sol	ก	-
10	Water for injection		sterile sol	ก	-
11	Calcium polystyrene sulfonate		oral pwdr	ข	-
12	Continuous ambulatory peritoneal dialysis		basic bag sol, double bag sol	ค	-
9.3. Vitamins					
Multivitamins ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีวิตามินเป็นส่วนประกอบเท่านั้น การผสมแร่ธาตุ (mineral) หรือด้วยยาสำคัญอื่น ๆ ไม่ถือเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ					
1	Folic acid		cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)	ก	-
2	Multivitamins มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวันดังนี้ - Vitamin A 1,300 - 2,000 IU - Vitamin D 200 - 1,000 IU		syr	ก	ดูเพิ่ม
	- Vitamin B1 ≥ 0.5 mg - Vitamin B2 ≥ 0.5 mg - Vitamin B6 ≥ 0.5 mg - Vitamin B12 ≥ 0.9 mcg - Niacinamide ≥ 6 mg - Vitamin C ≥ 40 mg		dry syr		
3	Multivitamins มีวิตามินอย่างน้อย 9 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้ - Vitamin A 1,000 - 1,167 IU - Vitamin D 600 - 2,500 IU - Vitamin B1 ≥ 0.6 mg - Vitamin B2 ≥ 0.6 mg - Vitamin B6 ≥ 0.6 mg - Vitamin B12 ≥ 1.2 mcg - Niacinamide ≥ 8 mg - folic acid 180 - 1,000 mcg - Vitamin C ≥ 40 mg			ก	ดูเพิ่ม
4	Multivitamins มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวันดังนี้ - Vitamin A 1,300 - 2,000 IU - Vitamin D 200 - 1,000 IU - Vitamin B1 ≥ 0.3 mg - Vitamin B2 ≥ 0.4 mg - Vitamin B6 ≥ 0.3 mg - Vitamin B12 ≥ 0.5 mcg - Niacinamide ≥ 4 mg - Vitamin C ≥ 35 mg		drop	ก	ดูเพิ่ม
5	Multivitamins มีวิตามินอย่างน้อย 9 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวันดังนี้ - Vitamin A 2,000 - 5,600 IU - Vitamin D 200 - 2,000 IU - Vitamin B1 ≥ 0.9 mg - Vitamin B2 ≥ 0.9 mg - Vitamin B6 ≥ 1.0 mg - Vitamin B12 ≥ 1.8 mcg - Niacinamide ≥ 12 mg - Folic acid 300-1,000 mcg - Vitamin C ≥ 45 mg		cap, tab	ก	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
6 Vitamin A		cap, tab (เฉพาะ 25,000-50,000 IU ต่อ 1 cap/tab)	ก	-
7 Vitamin B1	Thiamine as hydrochloride or mononitrate	tab (เฉพาะ 10-100 mg), sterile sol (เฉพาะ 100 mg/ml)	ก	-
8 Vitamin B2		tab (เฉพาะไม่ต่ำกว่า 10 mg)	ก	-
9 Vitamin B6	Pyridoxine hydrochloride	tab (เฉพาะ 10-100 mg), sterile sol (เฉพาะ 100 mg/ml)	ก	ดูเพิ่ม
10 Vitamin B12	Cyanocobalamin หรือ Hydroxocobalamin	tab (เฉพาะไม่ต่ำกว่า 100 mcg), sterile sol (เฉพาะ 1,000 mcg/ml)	ก	-
11 Vitamin B complex		cap, tab	ก	ดูเพิ่ม
12 Vitamin C		tab (เฉพาะ 50, 100 mg)	ก	-
13 Vitamin D2	Ergocalciferol	cap	ก	ดูเพิ่ม
14 Vitamin K1	Phytomenadione	sterile sol	ก	-
15 Vitamin B complex มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิด ที่ให้ปริมาณยาต่อวันดังนี้ - Vitamin B1 ≥ 0.9 mg - Vitamin B1 ≥ 0.9 mg - Vitamin B2 ≥ 0.9 mg - Vitamin B6 ≥ 1.0 mg - Vitamin B12 ≥ 1.8 mcg - Folic acid 300-1,000 mcg - Niacinamide ≥ 12 mg - Pantothenic acid ≥ 4 mg - Biotin ≥ 20 mcg		cap, tab	ก	ดูเพิ่ม
16 Vitamin C		sterile sol	ข	-
17 Vitamin B complex ประกอบด้วยวิตามินอย่างน้อย 4 ชนิด ที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้ - Vitamin B1 ≥ 0.9 mg - Vitamin B2 ≥ 0.9 mg - Vitamin B6 ≥ 1.0 mg - Niacinamide ≥ 12 mg		sterile sol	ข	ดูเพิ่ม
18 Alfalcidol	1 alpha-hydroxyvitamin D3	cap, tab	ค	ดูเพิ่ม
19 Calcitriol	1,25-Dihydroxyvitamin D3	cap	ค	ดูเพิ่ม
20 Vitamin E		emulsion (hosp), syr	ค	ดูเพิ่ม
9.4. Intravenous nutrition				
การให้อาหารทางหลอดเลือดดำมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ				
1	Amino acid solution for infants มีกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง 9 ชนิด คือ isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine, histidine และอย่างน้อยต้องมี arginine, cysteine, tyrosine และ taurine โดยต้องไม่มี sugar alcohol ในสูตร	sterile sol	ค	-
2	Amino acid solution ชนิด high branchedchain amino acid มีสัดส่วนของ branch chain amino acid 35-45% ของ total amino acid	sterile sol	ค	-
3	Amino acid solution ชนิด high essential amino acid มีสัดส่วนของ essential amino acid > 60% ของ total amino acid	sterile sol	ค	-
4	Amino acids with/without minerals	sterile sol	ค	-

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
5 Complete water-soluble and fat soluble vitamins preparation Complete water-soluble and fat soluble vitamins preparation ที่ได้จากการผสม ตำรับที่มี fat soluble vitamins 4 ชนิด คือ A, D, E, K กับ ตำรับที่มี water soluble vitamins 9 ชนิด คือ B1, B2, B6, B12, niacinamide, folic acid, pantothenic acid, biotin และ Vitamin C		preparation for intravenous use (sterile pwr, sterile sol, sterile emulsion)	ค	ดูเพิ่ม
6 Complete water-soluble vitamin preparation ที่ประกอบด้วย water soluble vitamins 9 ชนิด คือ B1, B2, B6, B12, niacinamide, folic acid, pantothenic acid, biotin และ vitamin C		preparation for intravenous use (sterile pwr)	ค	ดูเพิ่ม
7 Complete fat-soluble vitamin preparation ที่ประกอบด้วย fat soluble vitamins 4 ชนิด คือ A, D, E และ K		preparation for intravenous use (sterile pwr, sterile sol, sterile emulsion)	ค	ดูเพิ่ม
8 Multivitamin injection ที่ประกอบด้วย fat soluble vitamins 3 ชนิด คือ A, D และ E กับ water soluble vitamins 9 ชนิด คือ B1, B2, B6, B12, niacinamide, folic acid, pantothenic acid, biotin และ vitamin C		preparation for intravenous use (sterile sol)	ค	ดูเพิ่ม
9 Dextrose solution with minerals with electrolytes มี dextrose ไม่น้อยกว่า 20% และมี minerals อย่างน้อย 2 ชนิด		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
10 Fat emulsion ประกอบด้วย long chain triglycerides และ phospholipids ซึ่งมีหรือไม่มี medium chain triglycerides (MCT)		sterile emulsion (เฉพาะ 20%)	ค	-
11 Multiple trace mineral solution อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Zn,Cu และ I		sterile sol	ค	-
12 Two-in-one parenteral nutrition ประกอบด้วย glucose และ amino acids		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
13 Three-in-one parenteral nutrition ประกอบด้วย glucose, amino acid และ fat emulsion		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
9.5. Minerals				
1 Calcium carbonate		cap, tab	ก	-
2 Calcium gluconate		sterile sol	ก	-
3 Ferrous sulfate		cap, tab, oral sol, drop	ก	-
4 Magnesium hydroxide		tab, susp, susp (hosp)	ก	-
5 Magnesium sulfate		sterile sol, oral sol, oral sol(hosp)	ก	-
6 Sodium fluoride		tab, oral sol, oral sol (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
7 Trace element solution อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Zn, Cu, I และ Cr		oral sol (hosp)	ก	-
8 Zinc sulfate		oral sol (hosp), cap, tab, sterile sol (hosp)	ก	-
9 Aluminium hydroxide		tab, susp, susp (hosp)	ข	ดูเพิ่ม
10 Ferrous fumarate		cap, tab, oral sol, susp	ข	-
11 Iron (III) hydroxide polymaltose complex	Iron polymaltose complex	syr	ข	ดูเพิ่ม
12 Copper sulfate solution		sterile sol (hosp), oral sol (hosp)	ค	-
13 Dipotassium hydrogen phosphate		sterile sol	ค	-
14 Oral acidic phosphate solution มีตัวยาสาคัญ คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/dibasic	Joulié's solution	oral sol (hosp)	ค	-

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
15 Oral neutral phosphate solution มีตัวยาสกัดคือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/dibasic		oral sol (hosp)	ค	-
16 Sodium glycerophosphate		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
9.6. Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers				
1 Ferrous fumarate		tab (เฉพาะ 65 mg as iron)	ก	ดูเพิ่ม
2 Ferrous sulfate		tab (เฉพาะ 60 และ 65 mg as iron)	ก	ดูเพิ่ม
3 Folic acid		cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)	ก	ดูเพิ่ม
4 Ferrous salt + Folic acid		tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg)	ก	ดูเพิ่ม
5 Ferrous salt + Folic acid + Potassium iodide		tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine)	ก	ดูเพิ่ม
6 Potassium iodide		tab (เฉพาะ 150mcg as iodine)	ก	ดูเพิ่ม
9.7. Metabolic disorders				
1 Penicillamine ยากำพรั้า	D-Penicillamine	cap, tab	ค	ดูเพิ่ม
2 Imiglucerase		sterile pwdr	จ(2)	ดูเพิ่ม
10. Musculoskeletal and joint diseases				
10.1. Drugs used in rheumatic diseases and gout				
10.1.1. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)				
1 Aspirin	Acetylsalicylic acid	tab, EC tab	ก	-
2 Diclofenac sodium		EC tab, sterile sol	ก	-
3 Ibuprofen		film coated tab, susp	ก	ดูเพิ่ม
4 Indomethacin		cap	ก	-
5 Naproxen		compressed tab (as base)	ก	-
6 Piroxicam		cap (as base), compressed tab (as base), film coated tab (as base)	ข	-
10.1.2. Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)				
1 Chloroquine phosphate		compressed tab, film coated tab	ข	ดูเพิ่ม
2 Hydroxychloroquine sulfate		tab	ข	ดูเพิ่ม
3 Azathioprine		tab	ค	ดูเพิ่ม
4 Methotrexate		tab (as base or sodium), sterile pwdr/ sterile sol (as sodium)	ค	ดูเพิ่ม
5 Sulfasalazine		EC tab	ค	-
6 Ciclosporin	Cyclosporin	cap, oral sol, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
7 Leflunomide		tab (เฉพาะ 20mg)	ง	ดูเพิ่ม
8 Sodium aurothiomalate		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
10.1.3. Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia				
1 Colchicine		tab	ก	ดูเพิ่ม
2 Allopurinol		tab	ก	ดูเพิ่ม
3 Probenecid		film coated tab	ก	ดูเพิ่ม
4 Benzbromarone		tab	ค	ดูเพิ่ม
5 Febuxostat		tab (เฉพาะ 80 mg)	ง	ดูเพิ่ม
10.2. Drugs used in neuromuscular disorders				
10.2.1. Drugs which enhance neuromuscular transmission				
1 Pyridostigmine bromide		tab	ก	-
2 Neostigmine methylsulfate		sterile sol	ข	-

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
10.2.2. Skeletal muscle relaxants				
1. ยากลุ่มนี้ใช้บรรเทาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เป็นรุนแรงในโรคบางชนิด เช่น บาดทะยัก การบาดเจ็บของไขสันหลัง และ multiple sclerosis				
2. ไม่ใช้ยากลุ่มนี้กับอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาหรือการบาดเจ็บ				
3. ควรใช้ยากลุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการลด muscle tone อาจเพิ่ม disability ให้กับผู้ป่วย				
1	Diazepam	cap, tab, sterile sol	ก	-
2	Baclofen	tab	ข	-
3	Tizanidine hydrochloride	tab	ข	-
10.3. Drugs for relief of soft-tissue inflammation				
10.3.1. Rubifaciants				
1	Methyl salicylate cream compound	cream, cream (hosp)	ก	-
2	Methyl salicylate ointment compound	Analgesic Balm oint, oint (hosp)	ก	-
11. Eye				
11.1. Anti-infective eye preparations				
11.1.1. Antibacterials and eye wash solution				
1. ใช้เป็นยาสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น				
2. ควรใช้ยาให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อ เช่น ชนิดกรัมบวก หรือกรัมลบ				
1	Boric acid	eye wash sol	ก	-
2	Chloramphenicol	eye drop, eye oint	ก	-
3	Tetracycline hydrochloride ยาแก้พรีา	eye oint	ก	ดูเพิ่ม
4	Gentamicin sulfate	eye drop, eye oint	ข	ดูเพิ่ม
5	Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin	eye drop	ค	ดูเพิ่ม
6	Cyclosporine	eye drop (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
7	Fusidic acid	eye drop (in gel base)	ง	ดูเพิ่ม
11.1.2. Antibacterials with corticosteroids				
1. การใช้ยากลุ่มนี้ควรอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพราะยาที่มีใช้จำกัด หากใช้ยาไม่ถูกต้องอาจไม่ปลอดภัย				
2. ห้ามใช้ในอาการตาแดงที่ยังมิได้รับการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่ชัดเจน เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เช่น การใช้ในอาการตาแดงที่เกิดจากเชื้อ herpes simplex virus อาจทำให้เกิดแผลที่กระจกตาไปจนถึงตาบอดได้ เป็นต้น				
3. ใช้สำหรับการอักเสบรุนแรงในลูกตาส่วนหน้าหรือหลังผ่าตัด และป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเสี่ยง				
1	Dexamethasone sodium phosphate + Neomycin sulfate	eye drop	ค	-
2	Dexamethasone sodium phosphate + Chloramphenicol + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	ค	-
3	Dexamethasone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate	eye oint	ค	ดูเพิ่ม
11.1.3. Antifungals				
1	Natamycin	eye susp	ง	ดูเพิ่ม
11.1.4. Antivirals				
1	Aciclovir	Acyclovir eye oint	ค	-
11.2. Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations				
1	Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	ก	-
2	Fluorometholone	eye susp (as base)	ค	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
3 Prednisolone acetate		eye susp	ค	ดูเพิ่ม
4 Sodium cromoglicate	Cromolyn sodium	eye drop	ค	-
5 Olopatadine hydrochloride		eye drop (เฉพาะ 0.1%)	ง	
11.3. Mydriatics and cycloplegics				
1 Atropine sulfate		eye drop	ค	-
2 Cyclopentolate hydrochloride		eye drop	ค	-
3 Phenylephrine hydrochloride		eye drop	ค	-
4 Tropicamide		eye drop	ค	-
11.4. Drugs for treatment of glaucoma				
1 Glycerol		oral sol (hosp)	ก	-
2 Acetazolamide		tab	ก	-
3 Pilocarpine		eye drop (as hydrochloride or nitrate)	ก	-
4 Timolol maleate		eye drop	ก	-
5 Brimonidine tartrate		eye drop (เฉพาะ 0.2% w/v)	ค	ดูเพิ่ม
6 Latanoprost		eye drop (เฉพาะ 0.005% w/v)	ค	ดูเพิ่ม
7 Dorzolamide hydrochloride		eye drop (เฉพาะ 2% w/v)	ค	ดูเพิ่ม
8 Dorzolamide hydrochloride+Timolol maleate		eye drop (เฉพาะ 2% w/v + 0.5% w/v)	ง	ดูเพิ่ม
11.5. Local anaesthetics				
1 Tetracaine hydrochloride		eye drop	ก	ดูเพิ่ม
11.6. Tear deficiency, ocular lubricants and astringents				
1 Hypromellose (with preservative)		eye drop	ก	-
2 Carbomer (with preservative, with/without sorbitol)		eye gel	ข	-
3 White petrolatum + Mineral oil + Liquid lanolin anhydrous (preservative free)		eye oint	ค	ดูเพิ่ม
4 Hypromellose + Dextran 70 (preservative free)		eye drop (เฉพาะ 0.3% + 0.1%)	ง	ดูเพิ่ม
5 Dried protein-free dialysate of calf blood		eye gel	ง	ดูเพิ่ม
11.7. Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment				
1 Balance salt		sol for ocular irrigation, sol for intraocular irrigation	ค	-
2 Carbachol		sterile sol for intraocular use	ค	ดูเพิ่ม
3 Diclofenac sodium with preservative		eye drop	ค	-
4 Fluorescein sodium		sterile sol for inj	ค	-
5 Indocyanine green ยากำพรั้ง		sterile powdr for inj	ง	ดูเพิ่ม
6 Trypan blue ยากำพรั้ง		sterial sol for intraocular use	ง	ดูเพิ่ม
7 Bevacizumab		sterile sol	จ(2)	ดูเพิ่ม
12. Ear, nose, oropharynx and oral cavity				
12.1. Drugs acting on the ear				
12.1.1. Otitis externa and otitis media				
1 Chloramphenicol		ear drop	ก	-
2 Dexamethasone + Framycetin sulfate + Gramicidin		ear drop/ear oint (เฉพาะ 0.5 mg + 5 mg + 0.05 mg in 1 ml or 1 g)	ค	-
3 Hydrocortisone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate		ear drop (เฉพาะ 10 mg + 3,400 U + 10,000 U in 1 ml)	ค	-
12.1.2. Drugs used in otomycosis				
1 Acetic acid		ear drop (hosp) (เฉพาะ 2% in aqueous และ 2% in 70% isopropyl alcohol)	ก	ดูเพิ่ม

ชื่อยา Generic name		ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
2	Boric acid		ear drop (hosp) (เฉพาะ 3% in isopropyl alcohol)	ก	ดูเพิ่ม
3	Gentian violet		sol (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
4	Clotrimazole		ear drop	ข	-
12.1.3. Other drugs acting on the ear					
1	Sodium bicarbonate		ear drop (hosp)	ก	-
2	Ofloxacin		ear drop	ค	ดูเพิ่ม
12.2. Drugs acting on the nose					
12.2.1. Drugs used in nasal allergy					
1	Budesonide		nasal spray	ข	ดูเพิ่ม
2	Fluticasone furoate		nasal spray	ง	ดูเพิ่ม
12.2.2. Topical nasal decongestants					
1	Ephedrine hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		nasal drop (hosp) (เฉพาะ 0.5-3%)	ก	-
2	Sodium chloride		sterile sol (for irrigation) (เฉพาะ 0.9%)	ก	-
3	Oxymetazoline hydrochloride		nasal drop, nasal spray	ข	-
12.3. Drugs acting on the oropharynx and oral cavity					
12.3.1. Drugs used in treatment of oral ulcer					
1	Borax (in glycerin)		sol, sol (hosp)	ก	-
2	Chlorhexidine gluconate		mouthwash sol (เฉพาะ 0.12-0.2% w/v)	ก	-
3	Iodine Paint, compound		sol (hosp)	ก	-
4	Talbot's solution		sol (hosp)	ก	-
5	Triamcinolone acetoneide		oral paste	ก	-
6	Fluocinolone acetoneide		oral paste, oral gel, sol	ข	ดูเพิ่ม
7	Iodoform (in ether)		sol (hosp)	ข	-
12.3.2. Oropharyngeal antifungal drugs					
1	Clotrimazole		lozenge	ก	-
2	Miconazole nitrate		oral gel	ก	-
3	Nystatin		oral susp	ก	-
12.3.3. Antiseptics for root canal treatment					
1	Camphorated parachlorophenol		sol (hosp)	ก	-
2	Camphorated phenol		sol (hosp)	ก	-
3	Chlorhexidine gluconate		sol (hosp) (เฉพาะ 2%)	ก	-
4	Clove oil		oil	ก	-
5	EDTA		sol (hosp) (เฉพาะ 14% หรือ 17%)	ก	-
6	Formocresol	Cresolated formaldehyde, Formaldehyde and Cresol solution	sol (hosp)	ก	-
7	Sodium hypochlorite		sol (hosp)	ก	-
12.3.4. Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries					
1	Chlorhexidine gluconate		mouthwash sol / mouthwash sol (hosp) (เฉพาะ 0.1-0.2% w/v)	ก	-
2	Sodium fluoride		tab, oral sol	ก	ดูเพิ่ม
12.3.5. Other dental preparations					
1	Epinephrine	Adrenaline	sterile sol	ก	-
2	Artificial saliva	Saliva substitutes	sol (hosp)	ก	-

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
3 Hydrogen peroxide		mouthwash sol (1.5% w/v)	ก	-
4 Sodium chloride		sterile sol	ก	-
5 Special mouthwash ที่มีตัวยาลำดับคือ chloroxylenol		mouthwash sol (hosp)	ก	-
6 Zinc oxide		pwdr (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
7 Zinc oxide with zinc acetate		pwdr (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
8 Carnoy's solution		sol (hosp)	ค	-
9 White head varnish		varnish (hosp)	ค	-
13. Skin				
13.1. Anti-infective skin preparations				
13.1.1. Antibacterial preparations				
1 Sulfadiazine silver	Silver sulfadiazine	cream	ก	-
2 Fusidic acid		cream	ข	-
3 Sodium fusidate		oint	ข	-
4 Mupirocin		oint	ข	ดูเพิ่ม
13.1.2. Antifungal preparations				
1 Benzoic acid + Salicylic acid	Whitfield's ointment	oint, oint (hosp)	ก	-
2 Sodium thiosulfate		sol, sol (hosp)	ก	-
3 Clotrimazole		cream	ก	-
4 Ketoconazole		cream	ก	-
13.1.3. Parasitocidal preparations				
1 Benzyl benzoate		emulsion/lotion (เฉพาะ 25%)	ก	-
2 Permethrin ยากำพรั้ง		cream, lotion (เฉพาะ 1%)	ก	ดูเพิ่ม
3 Permethrin ยากำพรั้ง		cream, lotion (เฉพาะ 5%)	ก	ดูเพิ่ม
4 Sulfur	Sulphur	oint (hosp) (เฉพาะ 5-10%)	ก	-
5 Ivermectin ยากำพรั้ง		tab	ข	ดูเพิ่ม
13.2. Emollient and barrier preparations				
1 Aluminium acetate	Aluminium subacetate	sol (hosp)	ก	-
2 Mineral oil		oil (hosp)	ก	-
3 Olive oil		oil (hosp)	ก	-
4 Urea		cream (hosp), oint (hosp), cream	ก	ดูเพิ่ม
5 White petrolatum		oint (hosp)	ก	-
6 Zinc oxide		cream, cream (hosp)	ก	-
7 Zinc sulfate		lotion (hosp)	ก	-
13.3. Topical antipruritics				
1 Calamine		lotion, lotion (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
2 Menthol + Phenol + Camphor		ทุก topical dosage form (hosp)	ก	-
13.4. Topical corticosteroids				
ควรระมัดระวังการใช้ยาทาสดียรอยด่างที่มีความรุนแรงและสูงมากในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณรอบดวงตา ข้อพับต่างๆ เยื่อปาก ทวาร และอวัยวะเพศ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีผิวหนังบาง จึงอาจมีผลข้างเคียงต่อผิวหนังบริเวณที่ทายา และยาอาจถูกดูดซึมทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็น systemic side-effect ได้				
1 Hydrocortisone acetate		cream (hosp)	ก	-
2 Prednisolone		cream (hosp)	ก	-
3 Betamethasone dipropionate		cream (hosp)	ก	-
4 Betamethasone valerate		cream (hosp)	ก	-
5 Triamcinolone acetonide		cream (hosp), lotion (hosp)	ก	-
6 Clobetasol propionate		cream	ก	-

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
7 Betamethasone valerate		lotion, sol	ข	-
8 Desoximetasone	Desoxymethasone	cream	ข	-
9 Betamethasone dipropionate + Salicylic acid		oint (เฉพาะ 0.05% + 3%)	ค	ดูเพิ่ม
10 Clobetasol propionate		oint	ค	ดูเพิ่ม
11 Clobetasol propionate		lotion	ง	ดูเพิ่ม
12 Mometasone furoate		cream	ง	ดูเพิ่ม
13 Betamethasone dipropionate + Calcipotriol		gel, oint	ง	ดูเพิ่ม
13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)				
1 Coal tar (Liquor carbonis detergens; LCD)		ทุก topical dosage form (hosp)	ก	-
2 Coal tar + Triamcinolone acetonide		cream (hosp) (เฉพาะ 3% + 0.02% หรือ 5% + 0.02%)	ก	-
3 Salicylic acid		lotion (hosp), oint (hosp), paste (hosp)	ก	-
4 Dithranol	Anthralin	paste (hosp)	ก	-
5 Methotrexate		tab (as base or sodium)	ข	ดูเพิ่ม
6 Methoxsalen ยากำพรั้า		cream (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 0.1% w/w), topical sol (paint) (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 0.1% w/w)	ค	-
7 Calcipotriol		oint	ง	ดูเพิ่ม
8 Acitretin		cap	ง	ดูเพิ่ม
9 Cyclosporin	Cyclosporin	cap, oral sol	ง	ดูเพิ่ม
13.6. Preparations for warts and calluses				
1 Lactic acid		cream (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 10% w/w)	ก	-
2 Podophyllin	Podophyllum resin	paint, paint (hosp)	ก	-
3 Salicylic acid		oint (hosp), paste (hosp)	ก	-
4 Silver nitrate		sol (hosp), crystal (hosp), stick (hosp)	ก	-
5 Trichloroacetic acid		sol (hosp)	ก	-
6 Salicylic acid + Lactic acid		colloidal sol	ข	-
13.7 Preparations for hyperhidrosis				
1 Aluminium Chloride		sol (hosp) (เฉพาะ 10-30%)	ก	-
14. Immunological products and vaccines				
1 Anti-D immunoglobulin, human ยากำพรั้า		inj	ก	ดูเพิ่ม
2 BCG vaccine	Bacillus Calmette-Guérin	inj	ก	-
3 Diphtheria antitoxin ยากำพรั้า	DAT	inj	ก	ดูเพิ่ม
4 Diphtheria-Tetanus vaccine ทั้งชนิด DT(children type) และ dT (adult type)		inj	ก	-
5 Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell)	DTPw	inj	ก	-
6 Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B vaccine	DTP-HB	inj	ก	-
7 Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B- Haemophilus influenzae type b vaccine	DTP-HB-Hib	inj	ก	ดูเพิ่ม
8 Hepatitis B vaccine	HB	inj	ก	-
9 Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		inj	ก	ดูเพิ่ม
10 Influenza vaccine ชนิด pandemic Influenza สายพันธุ์ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		inj	ก	-
11 Measles-Mumps-Rubella vaccine	MMR	inj	ก	-
12 Poliomyelitis vaccine, live attenuated ชนิด bivalent และ trivalent	OPV	oral sol, oral susp	ก	-

• ดูการจัดเรียงหมวดของลุ่มยาทั้งหมด 17 กลุ่ม ได้ที่หน้า A19

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
13 Rabies immunoglobulin, horse	ERIG	inj	ก	-
14 Rabies vaccines ยกเว้นชนิด human diploid cell vaccine	HDCV	inj	ก	ดูเพิ่ม
15 Rubella vaccine		inj	ก	-
16 Tetanus antitoxin, horse		inj	ก	-
17 Tetanus vaccine	Tetanus toxoid	inj	ก	-
18 Japanese encephalitis vaccine, inactivated	inactivated JE vaccine	inj	ก	-
19 Japanese encephalitis vaccine, live attenuated	Live Attenuated JE vaccine	inj	ก	-
20 Rabies immunoglobulin, human	HRIG	inj	ข	ดูเพิ่ม
21 Tetanus antitoxin, human	Anti-tetanus immunoglobulin, human	inj	ข	ดูเพิ่ม
22 Hepatitis B immunoglobulin, human (เฉพาะชนิดที่เป็นวัคซีนเดี่ยว)	HBIG	inj	ค	ดูเพิ่ม
23 Human papillomavirus vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์		inj	ก	ดูเพิ่ม
24 Human papillomavirus vaccine ชนิดที่มีสายพันธุ์ ก่อโรคร้อยอย่างน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18		inj	ก	ดูเพิ่ม
25 Inactivated polio vaccine	IPV	inj	จ(1)	ดูเพิ่ม
26 Rotavirus vaccine		oral form (for pediatric use)	ก	ดูเพิ่ม
15. Anesthesia				
15.1. General anesthesia				
15.1.1. Intravenous anesthetics				
1 Etomidate		sterile emulsion	ค	ดูเพิ่ม
2 Propofol		sterile emulsion	ค	-
3 Thiopental sodium	Thiopentone sodium	sterile pwdr	ค	-
4 Ketamine hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
15.1.2. Inhalational anesthetics				
1 Isoflurane		inhalation vapour liquid	ค	-
2 Sevoflurane		inhalation vapour liquid	ค	-
3 Desflurane		inhalation vapour liquid	ง	ดูเพิ่ม
15.1.3. Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)				
1 Atracurium besilate		sterile sol	ค	-
2 Cisatracurium besilate		sterile sol	ค	-
3 Pancuronium bromide		sterile sol	ค	-
4 Rocuronium bromide		sterile sol	ค	-
5 Suxamethonium chloride	Succinylcholine chloride	sterile pwdr, sterile sol	ค	-
6 Vecuronium bromide		sterile pwdr	ค	-
15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs				
1 Diazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		cap, tab, sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
2 Fentanyl citrate วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
3 Morphine sulfate วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
4 Pethidine hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
5 Midazolam hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม

	ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
6	Midazolam maleate วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		tab	ง	ดูเพิ่ม
15.1.5. Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia					
1	Atropine sulfate		sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
2	Neostigmine methylsulfate		sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
3	Edrophonium chloride ยาแก้พรั้า		sterile sol (เฉพาะ 10mg/ml)	ง	
4	Glycopyrronium bromide		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
15.1.6. Drugs for malignant hyperthermia					
1	Dantrolene sodium ยาแก้พรั้า		sterile powdr	ง	ดูเพิ่ม
15.2. Local anesthesia					
1	Benzocaine		gel, oint	ก	-
2	Lidocaine hydrochloride		gel, oint, spray, sterile sol, sterile sol (dental cartridge), viscous sol	ก	-
3	Lidocaine + Prilocaine		cream	ก	-
4	Lidocaine hydrochloride + Epinephrine		sterile sol, sterile sol (dental cartridge)	ก	-
5	Mepivacaine hydrochloride		sterile sol (dental cartridge)	ก	-
6	Mepivacaine hydrochloride + Epinephrine		sterile sol (dental cartridge)	ก	-
7	Bupivacaine hydrochloride		sterile sol	ข	ดูเพิ่ม
8	Bupivacaine hydrochloride with/without glucose		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
9	Lidocaine hydrochloride + Epinephrine		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
16. Antidotes					
ยาในกลุ่มนี้หลายชนิดไม่ปรากฏเป็นยาในบัญชีนี้ เนื่องจากเป็นยาแก้พรั้า (orphan drugs) ที่มีปัญหาการจัดหาและไม่มีทะเบียนตำรับยา แต่ควรส่งเสริมให้มีการจัดหามาใช้และควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์พิษวิทยา เช่น ศูนย์พิษวิทยา ร.พ.รามธิบดี โทร. 0 2201 1083 ศูนย์พิษวิทยา ร.พ.ศิริราช โทร. 0 2419 7007					
1	Acetylcysteine	N-acetylcysteine	sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
2	Antivenom sera - งูเห่า - งูจงอาง - งูสามเหลี่ยม - งูเขียวหางไหม้ - งูแมวเซา - งูกะปะ - งูทับสมิงคลา		inj	ก	-
3	Polyvalent antivenom for hematotoxin		inj	ก	ดูเพิ่ม
4	Polyvalent antivenom for neurotoxin		inj	ก	ดูเพิ่ม
5	Atropine sulfate		sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
6	Benzatropine mesilate	Benztropine mesylate	sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
7	Calcium gluconate		sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
8	Charcoal, activated		powdr	ก	ดูเพิ่ม
9	Diazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
10	Diphenhydramine hydrochloride ยาแก้พรั้า		cap, sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
11	Ethanol ยาแก้พรั้าเฉพาะรูปแบบ sterile sol		sterile sol, sterile sol (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
12	Macrogols with electrolytes	Polyethylene glycol, PEG	oral powdr, oral powdr (hosp)	ก	ดูเพิ่ม
13	Naloxone hydrochloride		sterile sol	ก	ดูเพิ่ม
14	Pralidoxime chloride	2-PAM	sterile powdr	ก	ดูเพิ่ม
15	Sodium bicarbonate		sterile sol (เฉพาะ 44.6 mEq)	ก	ดูเพิ่ม
16	Vitamin K1	Phytomenadione	sterile sol	ก	ดูเพิ่ม

• ดูการจัดเรียงหมวดของลุ่มยาทั้งหมด 17 กลุ่ม ได้ที่หน้า A19

ชื่อยา Generic name	ชื่อพ้องของยา Synonym	รูปแบบ Form, Strength	บัญชี	เงื่อนไข อื่นๆ
17 Cyclophosphamide		sterile powdr	ค	ดูเพิ่ม
18 Deferoxamine mesilate	Desferrioxamine mesilate	sterile powdr	ค	ดูเพิ่ม
19 Dimercaprol ยากำพรั้	British Anti-Lewisite, BAL	sterile oil solution for IM use	ค	ดูเพิ่ม
20 Penicillamine ยากำพรั้	D-Penicillamine	cap, tab	ค	ดูเพิ่ม
21 Protamine sulfate		sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
22 Sodium calcium edetate ยากำพรั้	Edetate calcium disodium, Calcium EDTA	sterile sol	ค	ดูเพิ่ม
23 Sodium nitrite ยากำพรั้		sterile sol, sterile sol (hosp)	ค	ดูเพิ่ม
24 Sodium thiosulfate ยากำพรั้		sterile sol, sterile sol (hosp)	ค	ดูเพิ่ม
25 Vitamin B6	Pyridoxine hydrochloride	sterile sol (เฉพาะ 50 mg)	ค	ดูเพิ่ม
26 Botulinum antitoxin ยากำพรั้		inj	ง	ดูเพิ่ม
27 Calcium folinate	Leucovorin calcium	cap, tab, sterile powdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
28 Flumazenil		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
29 Mesna		sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
30 Methylene blue ยากำพรั้	Methylthionium chloride	sterile sol, sterile sol (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
31 Norepinephrine	Noradrenaline	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ง	ดูเพิ่ม
32 Phenobarbital sodium วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	Phenobarbitone sodium	sterile powdr, sterile sol	ง	ดูเพิ่ม
33 Succimer ยากำพรั้		cap	ง	ดูเพิ่ม
17. Contrast media and Radiopharmaceuticals				
17.1. Water soluble iodinated contrast				
1	Iopamidol	sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)	ง	ดูเพิ่ม
2	Iopromide	sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)	ง	ดูเพิ่ม
3	Iopamidol	sterile sol (เฉพาะ 370 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)	ง	ดูเพิ่ม
4	Iopromide	sterile sol (เฉพาะ 370 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)	ง	ดูเพิ่ม
17.2. Non-iodinated gastrointestinal X-ray contrast media				
1	Barium sulfate	powdr for oral susp	ก	ดูเพิ่ม
17.3. Magnetic resonance contrast media				
1	Meglumine gadoterate	sterile sol (เฉพาะ 377 mg/mL) (10 mL, 15 mL) for intravascular or intraarticular	ง	ดูเพิ่ม
17.4. Radiopharmaceuticals				
1	Tc-99m dextran	sterile sol for inj (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
2	Tc-99m diethylene triamine penta acetic acid	DTPA sterile sol for inj (hosp), aerosol for inhalation (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
3	Tc-99m dimercaptosuccinic acid	DMSA sterile sol for inj (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
4	Tc-99m dimercaptosuccinic acid V	DMSA [V] sterile sol for inj (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
5	Tc-99m iminodiacetic acid	IDA sterile sol for inj (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
6	Tc-99m methylene diphosphonate	MDP sterile sol for inj (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
7	Tc-99m phytate	sterile sol for inj (hosp)	ง	ดูเพิ่ม
8	Tc-99m sulfur colloid	sterile sol for inj (hosp)	ง	ดูเพิ่ม

NLEM 63
by
2 Generic

รายการยาในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

Drug Details Listed by Alphabetical Order
of Generic name and Synonym

รายละเอียดของยา จัดเรียงตามชื่อสามัญและชื่อพ้องของยา จาก A ถึง Z

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
1 alpha-hydroxyvitamin D3				ดู Alfacalcidol
1,25-Dihydroxyvitamin D3				ดู Calcitriol
2-PAM				ดู Pralidoxime chloride
3TC				ดู Lamivudine
3TC+d4T+NVP				ดู Lamivudine + Stavudine + Nevirapine
5-FU				ดู Fluorouracil
6-MP				ดู Mercaptopurine
6-TG				ดู Tioguanine
Abacavir	tab	ง	5.3.2. Antiretrovirals	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้ (ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ ผลต่อไตและผลต่อ bone density) ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาด้านไวรัสคือยาในกรณีที่มีการรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาด้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่จะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ใช้ 1.2 ผื่น 1.3 คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง 1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia) 1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ ให้หยุดยา abacavir ทันทีและห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้ควรมีค่า baseline viral load น้อยกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline viral load มากกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 2560
Abacavir + Lamivudine	tab (600 + 300 mg)	ง	5.3.2. Antiretrovirals	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้ (ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ ผลต่อไตและผลต่อ bone density)

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				<p>2. ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสคือยาในกรณีที่มีการรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาด้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด</p> <p>3. ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>1. ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อ ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 ไข้</p> <p>1.2 ผื่น</p> <p>1.3 คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง</p> <p>1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia)</p> <p>1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ ให้หยุดยา abacavir ทันที และห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้</p> <p>2. การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์</p> <p>3. ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้ควรมีค่า baseline viral load น้อยกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml (เนื่องจากยา มีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline viral load มากกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 2560</p>
ABC				ดู Abacavir
ABC+3TC				ดู Abacavir + Lamivudine
Acarbose	tab	ค	6.1.2. Oral antidiabetic drugs	<p>เงื่อนไข : ใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานบางรายที่มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารสูง</p> <p>หมายเหตุ : การใช้อาจได้ผลควรรับประทานพร้อมอาหารครั้งแรก</p>
Acetaminophen	syr		4.6 Analgesics and Antipyretics	ดู Paracetamol
Acetazolamide	tab	ก	11.4. Drugs for treatment of glaucoma	-
Acetic acid	ear drop (hosp) (เฉพาะ 2% in aqueous และ 2% in 70% isopropyl alcohol)	ก	12.1.2. Drugs used in otomycosis	ค่าเดือนและข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แก้วหูทะลุ
Acetylcysteine	sterile sol	ก	16. Antidotes	<p>เงื่อนไข :</p> <p>1. ใช้แก้พิษจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด</p> <p>2. ใช้รักษาภาวะพิษต่อตับจากเห็ดพิษกลุ่มที่มีอะมาทอกซิน (amatoxin containing mushrooms)</p>
Acetylsalicylic acid				ดู Aspirin
Aciclovir	eye oint tab, oral susp, oral susp (hosp)	ค ก	11.1.4. Antivirals 5.3.1. Non-antiretrovirals	- หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กที่เป็นโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) ชนิดไม่รุนแรง
Aciclovir sodium	sterile pwdr, sterile sol	ค	5.3.1. Non-antiretrovirals	<p>เงื่อนไข :</p> <p>1. ใช้สำหรับการติดเชื้อไวรัส varicella - zoster และ herpes simplex ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและในทารกแรกเกิด</p> <p>2. ใช้สำหรับการติดเชื้อไวรัส varicella-zoster และ herpes simplex ที่มีการแพร่กระจายหรือเป็นการติดเชื้อของอวัยวะภายใน หรือในผู้ป่วยที่เข้ารับประทุกันไม่ได้</p>

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				3. ใช้กับทารกแรกเกิดที่มารดาป่วยเป็นโรคใช้เชื้อสูกออีไล ในช่วง 5 วันก่อนคลอดและในช่วง 2 วันหลังคลอด เพื่อป้องกันโรคใช้เชื้อสูกออีไลในเด็กแรกเกิด (neonatal varicella) 4. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
Acitretin	cap	ง	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่นหรือมีข้อห้ามในการใช้ methotrexate 2. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา สำหรับรักษาโรคผิวหนังเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไป คำเตือนและข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และหลังจกหยุดยานี้แล้วให้คุมกำเนิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
Acyclovir				ดู Aciclovir
Acyclovir sodium				ดู Aciclovir sodium
Adenosine	sterile sol	ก	2.3. Anti-arrhythmic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับรักษา supraventricular tachycardia 2. ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดหัวใจเพื่อรักษาภาวะ no reflow ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ Percutaneous Coronary Intervention (PCI) เมื่อมีข้อห้ามใช้ยา verapamil หรือไม่มียา verapamil ให้ใช้ 3. ใช้สำหรับการตรวจพิเศษทางหัวใจ
Alendronate sodium	tab (เฉพาะ 70 mg)	ง	6.6 Drugs affecting bone metabolism	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ที่มีเงื่อนไขครบทุกข้อดังนี้ 1. ผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่เคยมีประวัติกระดูกสะโพกหัก 2. มีค่า bone mineral density T score น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.5 3. ใหยาในแต่ละรอบเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จากนั้นหยุดยาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
Adrenaline				ดู Epinephrine
Albendazole	tab, susp	ก	5.5. Anthelmintics	-
Alcohol, Absolute	inj	ง	4.9. Drugs used in movement disorders	ยากำพรั้า เงื่อนไข : ใช้สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) หรือภาวะ dystonia
Alfacalcidol	Cap, tabl	ค	9.3. Vitamins	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนพาราไทรอยด์อย่างรุนแรงและยับยั้ง ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีระดับ serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate เกิน 5.5 mg/dL
Alfuzosin hydrochloride	SR tab (เฉพาะ 10 mg)	ค	7.4.1. Drugs for benign prostatic hyperplasia	-
Allopurinol	tab	ก	10.1.3. Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia	คำเตือนและข้อควรระวัง : การลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงต่อการเกิด severe cutaneous adverse reactions (SCAR) จากการใช้ allopurinol ทำให้ได้โดย 1. ฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยทุกรายในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกของการให้ยา 2. ควรเริ่มใช้ยาในขนาดต่ำและค่อย ๆ ปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นช้า ๆ ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
all-trans-Retinoic acid				ดู Tretinoin
Alprostadil	sterile sol (เฉพาะ 0.5 mg/ml)	ง	7.1.1. Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ต้องพึ่ง ductus arteriosus

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Alteplase	sterile pwdr	ง	2.10. Fibrinolytic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันที่เกิดจากลิ่มเลือด ในกรณีที่มีผู้ป่วยแพ้ streptokinase หรือเคยได้รับ streptokinase ภายใ 6 เดือน 2. ใช้สำหรับ acute arterial ischemic stroke โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาหรือประสาทศัลยแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ทั่วไปสามารถสั่งได้ในโรงพยาบาลที่มี stroke unit ที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการฝึกอบรม หรืออยู่ภายใต้เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้น 3. ใช้สำหรับ massive pulmonary embolism ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด massive bleeding และมี hemodynamic instability 4. ใช้ในกรณีที่มี acute vascular access thrombosis (หมายถึง A-V fistula หรือ A-V graft สำหรับทำ hemodialysis)
Aluminium acetate	sol (hosp)	ก	13.2. Emollient and barrier preparations	หมายเหตุ : ก่อนใช้ให้เช็ดจางด้วยน้ำ 1:10 - 1:40
Aluminium Chloride	sol (hosp) (เฉพาะ 10-30%)	ก	13.7 Preparations for hyperhidrosis	หมายเหตุ : ปรับความหนืดด้วย Suspending Agent ตามความเหมาะสม
Aluminium hydroxide	chewable tab, tab, susp, susp (hosp)	ข	1.1. Antacids and other drugs for dyspepsia	-
	tab, susp, susp (hosp)	ข	9.5. Minerals	คำเตือนและข้อควรระวัง : กรณีที่ใช้รักษา hyperphosphatemia ในผู้ป่วยที่มีไตบกพร่อง ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากอาจเกิดพิษจาก Aluminium
Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide	chewable tab, tab, susp, susp (hosp)	ก	1.1. Antacids and other drugs for dyspepsia	หมายเหตุ : ให้มีส่วนประกอบ $Al_2O_3 = 3.1-4.0\%$ w/w , $Mg(OH)_2 = 1.4-2.2\%$ w/w
Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simeticone 25-50 mg	chewable tab, tab	ก	1.1. Antacids and other drugs for dyspepsia	-
Aluminium subacetate				ดู Aluminium acetate
Amantadine hydrochloride ยากำพ้อาการ	tab (เฉพาะ 100mg)	ง	4.9 Drugs used in movement disorders	เงื่อนไข : ใช้สำหรับลดอาการของโรคพาร์กินสันและอาการ levodopa-induced dyskinesia
Amikacin sulfate	sterile sol	ข	5.1.4. Aminoglycosides	เงื่อนไข : ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบชนิดที่ดื้อต่อ gentamicin และ/หรือ netilmicin หมายเหตุ : จัดเป็นบัญชี ค เมื่อใช้รักษา multidrug - resistant tuberculosis (MDR-TB)
		ค	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข : ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 5.1.4 Aminoglycosides
Amiloride hydrochloride + Hydrochlorothiazide (HCTZ)	tab (เฉพาะ 5 + 50 mg)	ข	2.2. Diuretics	-
Amino acid solution for infants	sterile sol	ค	9.4. Intravenous nutrition	-
Amino acid solution ชนิด high branchedchain amino acid	sterile sol	ค	9.4. Intravenous nutrition	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Amino acid solution ชนิด high essential amino acid	sterile sol	ค	9.4. Intravenous nutrition	-
Amino acids with/without minerals	sterile sol	ค	9.4. Intravenous nutrition	-
Aminophylline	tab, sterile sol	ก	3.1.3. Theophylline	-
Amiodarone hydrochloride	tab, sterile sol	ค	2.3. Anti-arrhythmic drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ supraventricular และ ventricular arrhythmias
Amitriptyline hydrochloride	tab	ก	4.7.2. Drugs for neuropathic pain	-
			4.3. Antidepressant drugs	-
			4.7.3.2. Drugs used in the prophylaxis of migraine	-
Amlodipine besilate	tab	ก	2.6.2. Calcium-channel blockers	-
Ammonium carbonate and senega mixture	mixt (hosp)	ก	3.6.2. Expectorant and demulcent cough preparations	หมายเหตุ : ก่อนจ่ายยาให้เจือจางด้วยน้ำเชื่อมในอัตราส่วน 1 : 1
Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate	sterile pwdr	ค	5.1.1. Penicillins	เงื่อนไข : 1. ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียจำเพาะที่ติดต่อ ampicillin โดยเฉพาะที่ผลิตเอนไซม์ beta-lactamase 2. ใช้รักษาโรคติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียชนิด aerobes และ anaerobes 3. ใช้ยาเม็ดเฉพาะความแรง 500/125 mg ในการรักษา melioidosis เพื่อใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ oral co-trimoxazole
Amoxicillin trihydrate	cap, dry syr	ก	5.1.1. Penicillins	-
Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	tab (เฉพาะ 500/125 mg)	ค	5.1.1. Penicillins	เงื่อนไข : ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ oral co-trimoxazole ในการรักษา melioidosis
	tab (เฉพาะ 500/125, 875/125 mg), dry syr (เฉพาะ 400/57 mg)	ค	5.1.1. Penicillins	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับโรคติดเชื้อที่สงสัยว่าจะเกิดจากเชื้อ H. influenzae และ/หรือ M. catarrhalis ที่ติดต่อ ampicillin 2. ใช้รักษาโรคติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียชนิด aerobes และ anaerobes
Amphotericin B	sterile pwdr (เฉพาะ conventional formulations)	ค	5.2. Antifungal drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับรักษา invasive fungal infections
Ampicillin sodium	sterile pwdr	ก	5.1.1. Penicillins	-
Ampicillin sodium + Sulbactam sodium	sterile pwdr	ค	5.1.1. Penicillins	เงื่อนไข : เช่นเดียวกับ Co-amoxiclav sterile pwdr
Analgesic Balm				ดู Methyl salicylate ointment compound
Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	ก	11.2. Corticosteroids and other antiinflammatory preparations	-
Anthrailin				ดู Dithranol
Anti-D immunoglobulin, human	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	ยากำพร้า
Anti-tetanus immunoglobulin, human				ดู Tetanus antitoxin, human

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Antithymocyte immunoglobulin, rabbit	sterile pwdr, sterile sol	ง	8.2. Drugs affecting the immune response	เงื่อนไข : 1. ใช้รักษาภาวะ induction ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (MR) ต่อการเกิด acute renal allograft rejection 2. ใช้รักษาภาวะ induction ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด acute allograft rejection ใน solid organ transplantation ที่ไม่ใช้การปลูกถ่ายไต 3. ใช้รักษาภาวะ acute renal allograft rejection เฉพาะ solid organ transplantation ที่ไม่ตอบสนองต่อ pulse methylprednisolone หรือที่มีพยาธิสภาพรุนแรง หมายเหตุ : จัดเป็นบัญชี ๑(2) เมื่อใช้สำหรับ severe aplastic anemia ดูข้อ 9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias 4. ใช้รักษาภาวะ induction ในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่ไม่สามารถใช้ basiliximab ได้ หรือ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต-หัวใจ (heart-kidney transplantation)
		๑(2)	9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ severe aplastic anemia โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 หมายเหตุ : จัดเป็นบัญชี ๑ เมื่อใช้กรณีปลูกถ่ายไต ดูข้อ 8.2 Drugs affecting the immune response
Antivenom sera	inj	ก	16. Antidotes	-
Aqueous iodine oral solution, Strong iodine solution				ดู Lugol's solution
Aromatic Ammonia Spirit	spirit, spirit (hosp)	ก	3.8. Other respiratory preparations	-
Arsenic trioxide	sterile sol, sterile sol (hosp)	ง	8.1.5. Other antineoplastic drugs	ยากำพร้า เงื่อนไข : ใช้สำหรับ relapsed หรือ resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
Artesunate	tab (ไม่รวม lactab และ rectocap), sterile pwdr	ค	5.4.1. Antimalarials	-
Artificial saliva	sol (hosp)	ก	12.3.5. Other dental preparations	-
Artificial Saliva Solution (Saliva Substitutes)	sol		12.3.3 Other Dental Preparations	หมายเหตุ : เก็บในภาชนะปิดสนิท ในตู้เย็น
Asparaginase	sterile pwdr	ค	8.1.5. Other antineoplastic drugs	-
Aspirin	compressed tab, film coated tab (เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)	ก	4.7.3.1. Drugs for acute migraine attack	คำเตือนและข้อควรระวัง : ดูรายละเอียดหัวข้อ 4.6 Analgesics and antipyretics หมายเหตุ : ดูรายละเอียดหัวข้อ 4.6 Analgesics and antipyretics
			4.6. Analgesics and antipyretics	คำเตือนและข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับลดไข้ แก้ปวด เพราะเสี่ยงต่อการเกิด Reye's syndrome หมายเหตุ : Aspirin ชนิด EC tab ดูดซึมได้ช้าจึงมีการเริ่มต้นออกฤทธิ์ช้า ไม่เหมาะจะนำมาใช้ในข้อบ่งชี้
	tab (เฉพาะ 75-325 mg), EC tab (เฉพาะ 75-325 mg)	ก	2.9. Antiplatelet drugs	-
	tab, EC tab	ก	10.1.1. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)	-
Atazanavir sulfate	cap	ค	5.3.2. Antiretrovirals	-
Atenolol	tab	ก	2.4. Beta-adrenoceptor blocking drugs	-

• ในช่องเงื่อนไข/ อื่น ๆ ที่ระบุว่า [ดูเพิ่ม] ให้ดูที่หมวดรายละเอียดของยา จัดเรียงตามชื่อยา A-Z หน้า A50-A120
• บัญชี ก ข ค ง(1) หรือ ง(2) ดูรายละเอียดของแต่ละบัญชีได้ที่หน้า A15

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
ATG				ดู Antithymocyte immunoglobulin, rabbit
ATV				ดู Atazanavir sulfate
Atorvastatin	tab (เฉพาะ 40 mg)	ง	2.12. Lipid-regulating drugs	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้กับผู้ป่วยที่ชื่อยา simvastatin ในขนาด 40 mg ติดต่อกัน 6 เดือน แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C ได้ถึงค่าเป้าหมาย (ดูเงื่อนไข simvastatin) หรือ ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ simvastatin ได้ กล่าวคือมีผลข้างเคียง ได้แก่ มีค่า alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มขึ้น 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ (upper limit of normal) หรือค่า Creatine phosphokinase (CPK) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ <p>ค่าเตือนและข้อควรระวัง :</p> <ol style="list-style-type: none"> หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับ cyclosporine, HIV protease inhibitor (tipranavir + ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir) หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ในขนาดเกินวันละ 40 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา nelfinavir 2.2 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา clarithromycin, itraconazole, HIV protease inhibitor (saquinavir + ritonavir, darunavir + ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir + ritonavir) ระมัดระวังการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับยา lopinavir + ritonavir โดยให้ชื่อยา atorvastatin ในขนาดต่ำสุดเท่าที่จำเป็น
Atracurium besilate	sterile sol	ค	15.1.3. Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)	-
Atropine sulfate	eye drop	ค	11.3. Mydriatics and cycloplegics	-
	sterile sol	ก	2.3. Anti-arrhythmic drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหัวใจ
			15.1.5. Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia	เงื่อนไข : ใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ
			16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates, carbamates) และภาวะ cholinergic crisis
Azathioprine	tab	ค	8.2. Drugs affecting the immune response	-
			10.1.2. Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)	ค่าเตือนและข้อควรระวัง : ควรระมัดระวัง หากต้องใช้ร่วมกับ allopurinol เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
Azithromycin	cap (ไม่รวมชนิดออกฤทธิ์นาน), dry syrup (ไม่รวมชนิดของและชนิดออกฤทธิ์นาน)	ง	5.1.5. Macrolides	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้สำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง กรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล ใช้รักษาการติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM) ยา azithromycin ขนาด 2 กรัม กินครั้งเดียว สำหรับรักษาผู้ป่วย early syphilis ที่ไม่สามารถใช้ ยา penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได้

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
	sterile pwdr	ง	5.1.5. Macrolides	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับบำบัดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่าง ที่รุนแรงและอาจเกิดจาก atypical pathogen เช่น legionellosis เป็นต้น 2. ใช้สำหรับ severe rickettsiosis
AZT				ดู Zidovudine
AZT+3TC				ดู Zidovudine + Lamivudine
AZT+3TC+NVP				ดู Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine
Bacillus Calmette-Guérin				ดู BCG ดู BCG vaccine
Baclofen	tab	ข	4.9. Drugs used in movement disorders 10.2.2. Skeletal muscle relaxants	- -
Balance salt	sol for ocular irrigation, sol for intraocular irrigation	ค	11.7. Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment	-
Barium sulfate	pwdr for oral susp	ก	17.2 Non-iodinated gastrointestinal X-ray contrast media	หมายเหตุ : ต้องเป็น Barium sulfate ที่ใช้ในทางการแพทย์สำหรับกรตรวจวินิจฉัยโรคเท่านั้น
Basiliximab	sterile pwdr	ง	8.2. Drugs affecting the immune response	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ induction therapy ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ที่มีความเสี่ยงต่ำ (LR) ขึ้นไป 2. ใช้รักษาระยะ induction ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่มีปัญหาไตร่วมด้วย หรือมีความเสี่ยงของการเกิดปัญหาไต ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 2.1 ผู้ป่วยที่มีภาวะ hepatorenal syndrome 2.2 ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันก่อนผ่าตัด 2.3 ผู้ป่วย CKD stage III ขึ้นไป หรือ CKD stage II with acute kidney injury 2.4 ภาวะอื่น ๆ ได้แก่ massive blood loss (มากกว่า 1 blood volume), prolonged hypotension (หรือ shock มากกว่า 3 ชั่วโมง), fulminant /subfulminant hepatic failure , impending primary graft non-function (AST/ALT> 2,000 IU/L ภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการผ่าตัด) 3. ใช้รักษาระยะ induction ในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ ยกเว้นในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตหัวใจ (Heart-Kidney Transplantation)
BCG	freeze-dried pwdr for bladder instillation	ง	8.2. Drugs affecting the immune response	เงื่อนไข : ใช้สำหรับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิด superficial bladder cancer
Bedaquiline fumarate	tab	จ(1)	5.1.9 antituberculosis drugs	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคดื้อยา โดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
Benzathine benzylpenicillin	sterile pwdr	ก	5.1.1. Penicillins	-
Benzatropine mesilate	sterile sol	ก	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา
Benzbromarone	tab	ค	10.1.3. Drugs for treatment of gout and hypericaemia	คำเตือนและข้อควรระวัง : ใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีรายงานการเกิด cytolytic liver damage ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต หรือต้องเปลี่ยนตับ
Benzocaine	gel, oint	ก	15.2. Local anesthesia	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Benzoic acid + Salicylic acid	oint, oint (hosp)	ก	13.1.2. Antifungal preparations	-
Benztropine mesylate				ดู Benztropine mesilate
Benzyl benzoate	emulsion/lotion (เฉพาะ 25%)	ก	13.1.3. Parasiticial preparations	-
Benzylpenicillin	sterile pwdr (as sodium or potassium)	ก	5.1.1. Penicillins	-
Betahistine mesilate	tab (เฉพาะ 6, 12 mg)	ข	4.5.2. Drugs used in vestibular disorders	-
Betahistine mesilate				ดู Betahistine mesilate
Betamethasone dipropionate	cream, cream (hosp), oint	ก	13.4. Topical corticosteroids	-
Betamethasone dipropionate + Salicylic acid	oint (เฉพาะ 0.05% + 3%)	ค	13.4. Topical corticosteroids	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ chronic eczema 2. ใช้สำหรับโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis)
Betamethasone dipropionate + Calcipotriol	gel, oint	ง	13.4 Topical corticosteroids	เงื่อนไข : 1. ใช้รักษา chronic plaque psoriasis ในผู้ใหญ่ที่ใช้ topical steroid รักษาแล้วไม่แสดงผล 2. ใช้ gel กับรอยโรคที่หนังศีรษะไม่เกิน 4 สัปดาห์ และ ointment กับรอยโรคที่ลำตัวไม่เกิน 8 สัปดาห์ 3. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา
Betamethasone valerate	cream, cream (hosp)	ก	13.4. Topical corticosteroids	-
	lotion, sol	ข	13.4. Topical corticosteroids	-
Bevacizumab	sterile sol	จ(2)	11.7. Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ age-related macular degeneration (AMD) โดยมีแนวทางการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 2. ใช้สำหรับ diabetic macular edema (DME) โดยมีแนวทางการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 3. ใช้สำหรับ Retinal Vein Occlusion (RVO) โดยมีแนวทางการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Bimatoprost	eye drop (เฉพาะ 0.03% w/v)	ค	11.4. Drugs for treatment of glaucoma	เงื่อนไข : 1. ใช้รักษาต้อหินในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers หรือ 2. ใช้เฉพาะกรณีที่ใช้ยารักษาต้อหินชนิดอื่นแล้วความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย
Biphasic isophane insulin	sterile susp	ก	6.1.1. Insulins	-
Bisacodyl	EC tab, rectal supp	ก	1.6. Laxatives	-
Bismuth subsalicylate	tab	ง	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding	เงื่อนไข : 1. ใช้เป็น second-line drug ในการกำจัด H.pylori 2. ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี
Bleomycin	sterile pwdr (as sulfate or as hydrochloride)	ค	8.1.2. Cytotoxic antibiotics	-
Borax (in glycerin)	sol, sol (hosp)	ก	12.3.1. Drugs used in treatment of oral ulcer	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Boric acid	ear drop (hosp) (เฉพาะ 3% in isopropyl alcohol)	ก	12.1.2. Drugs used in otomycosis	คำเตือนและข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แก้วหูทะลุ
	eye wash sol	ก	11.1.1. Antibacterials and eye wash solution	-
Botulinum A toxin	sterile pwdr (เฉพาะ 100 และ 500 IU)	จ(2)	4.9. Drugs used in movement disorders	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับโรคคอบิด (cervical dystonia) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 2. ใช้สำหรับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 3. ใช้สำหรับโรค spasmodic dysphonia โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Botulinum antitoxin	inj	ง	16. Antidotes	ยากำพร้า เงื่อนไข : ใช้นำบำบัดพิษ Botulism
Brimonidine tartrate	eye drop (เฉพาะ 0.2% w/v)	ค	11.4. Drugs for treatment of glaucoma	เงื่อนไข : 1. ใช้รักษาต้อหินในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers บรีอิด 2. ใช้เฉพาะกรณีที่ใช้ยาอื่นรักษาต้อหินแล้ว ความดันในลูกต่ายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย
Brinzolamide	eye susp	ค	11.4. Drugs for treatment of glaucoma	เงื่อนไข : 1. ใช้รักษาต้อหินในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers บรีอิด 2. ใช้เฉพาะกรณีที่ใช้ยาอื่นรักษาต้อหินแล้ว ความดันในลูกต่ายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย
British Anti-Lewisite, BAL				ดู Dimercaprol
Bromocriptine mesilate	tab	ค	4.9. Drugs used in movement disorders 6.7.1. Bromocriptine and other dopaminergic drugs	- เงื่อนไข : ใช้สำหรับ prolactinoma , acromegaly, amenorrhea ทั้งที่มีและไม่มี galactorrhea
Brompheniramine maleate	tab, syr	ก	3.4. Antihistamines	-
Brown Mixture ; Mist. Tussis				ดู Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound
Budesonide	DPI, MDI, susp for nebulizer	ก	3.2. Corticosteroids	-
	nasal spray	ข	12.2.1. Drugs used in nasal allergy	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไป
Budesonide + Formoterol	DPI	ค	3.2. Corticosteroids	หมายเหตุ : 1. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น 2. การใช้ long acting beta2-agonist (LABA) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคหืด
Bupivacaine hydrochloride	sterile sol	ข	15.2. Local anesthesia	คำเตือนและข้อควรระวัง : อาจทำให้เกิดพิษต่อหัวใจ หมายเหตุ : ใช้ในกรณี local infiltration
Bupivacaine hydrochloride with/without glucose	sterile sol	ค	15.2. Local anesthesia	คำเตือนและข้อควรระวัง : อาจทำให้เกิดพิษต่อหัวใจ
Buprenorphine hydrochloride	sublingual tab, sterile sol	ค	4.7.1. Opioid analgesics	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Busulfan	tab	ค	8.1.1. Alkylating drugs	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Calamine	lotion, lotion (hosp)	ก	13.3. Topical antipruritics	หมายเหตุ : หากในสูตรตำรับยา มี phenol เป็นส่วนประกอบ ต้องมีความเข้มข้นของ phenol ไม่เกิน 0.5 - 1%
Calcipotriol	oint	ง	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	เงื่อนไข : ใช้ในกรณีที่ไม่ตอบสนองหรือเกิดผลข้างเคียงต่อ coal tar หรือ topical steroid
Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D3)	cap	ค	9.3 Vitamins	เงื่อนไข : 1. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะขาดฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (primary hypoparathyroidism) 2. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ (ชนิดเฉียบพลันรุนแรง) 3. ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (chronic kidney disease stage 5 หรือ end-stage renal disease) ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่มีระดับ serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate เกิน 5.5 mg/dL
Calcitonin-salmon	sterile sol	ง	6.6. Drugs affecting bone metabolism	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วย severe hypercalcemia ค่าเตือนและข้อควรระวัง : ใช้ยานี้ในระยะเวลาสั้นที่สุด ในขนาดต่ำสุดที่มีประสิทธิผลการรักษา หมายเหตุ : 1. มีหลักฐานที่เป็น Randomize controlled trial หลายฉบับที่แสดงว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยา calcitonin ชนิดรับประทานและชนิดพ่นจมูก มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก 2. ยา calcitonin ชนิดพ่นจมูกมีข้อมูลชัดเจนว่า รูปแบบดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และข้อมูลด้านประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ จึงไม่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
Calcium carbonate	cap, tab	ก	9.5. Minerals	-
Calcium folinate (Leucovorin calcium)	cap, tab, sterile pwdr, sterile sol	ง	8.1.5 Other antineoplastic drugs 16. Antidotes	เงื่อนไข : ให้อารมณ์ร่วมกับ fluorouracil (5-FU) ในการบำบัด gastrointestinal malignancy เงื่อนไข : 1. ใช้บำบัดพิษจากสาร folic acid antagonists, methotrexate, trimethoprim และ pyrimethamine 2. ใช้ป้องกันพิษจาก methotrexate เฉพาะกรณีใช้ยานี้ในขนาดสูง 3. ใช้ร่วมกับ ethanol ในการบำบัดพิษจาก methanol
Calcium gluconate	sterile sol	ก	9.5. Minerals 16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก hydrofluoric acid, calcium channel blockers และ beta blockers หมายเหตุ : ให้ฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้า ๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
Calcium polystyrene sulfonate	oral pwdr	ข	9.2. Fluids and electrolytes	-
Camphorated parachlorophenol	sol (hosp)	ก	12.3.3. Antiseptics for root canal treatment	-
Camphorated phenol	sol (hosp)	ก	12.3.3. Antiseptics for root canal treatment	-
Capecitabine	tab	ง	8.1.3. Antimetabolites	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ advanced breast cancer โดยใช้เป็น second หรือ third-line drug หลังการใช้ anthracycline และ/หรือ taxane มาแล้ว

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Captopril	tab	ก	2.5.4. Angiotensin-converting enzyme inhibitors	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ hypertensive urgency ^a หมายเหตุ : กรณีที่สถานพยาบาลไม่มียาฉีดหรือไม่สามารถให้ยาฉีดในการรักษา hypertensive emergencies อาจพิจารณาใช้ Captopril เป็นทางเลือกในการรักษา
Carbachol	sterile sol for intraocular use	ค	11.7. Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment	เงื่อนไข : ใช้ทดแทนตากระหว่างการผ่าตัด
Carbamazepine	SR tab	ข	4.7.2. Drugs for neuropathic pain	-
			4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	-
			4.2.2. Antimanic drugs	-
	tab	ก	4.7.2. Drugs for neuropathic pain	-
			4.2.2. Antimanic drugs	-
	tab, syr, susp	ก	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	-
Carbomer (with preservative, with/without sorbitol)	eye gel	ข	11.6. Tear deficiency, ocular lubricants and astringents	-
Carboplatin	sterile pwdr, sterile sol	ค	8.1.5. Other antineoplastic drugs	-
Carmustine	sterile pwdr	ง	8.1.1. Alkylating drugs	ยากำพรั้ง เงื่อนไข : ใช้เป็น conditioning regimen ในการรักษา Hodgkin's และ non-Hodgkin's lymphoma ด้วยวิธี hematopoietic stem cell transplantation
Carnoy's solution	sol (hosp)	ค	12.3.5. Other dental preparations	-
Carvedilol	tab	ค	2.4. Beta-adrenoceptor blocking drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ heart failure with reduced ejection fraction
Castor oil	oil	ก	1.6. Laxatives	-
Cefalexin	cap, dry syr	ก	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง S. aureus ในผู้ป่วยที่แพ้ penicillin แบบไม่รุนแรง และการติดเชื้อในชุมชนจากแบคทีเรียแกรมลบบางชนิด เช่น E. coli เป็นต้น
Cefazolin sodium	sterile pwdr	ก	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	หมายเหตุ : ใช้ป้องกันการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัด
Cefixime	cap, dry syr	ง	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	เงื่อนไข : 1. ใช้เป็น switch therapy ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 2. ใช้รักษาหนองในแต่เฉพาะที่อวัยวะเพศและทวารหนัก เมื่อไม่สามารถให้ยา Ceftriaxone ได้ 3. ใช้รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในกรณีที่ใช้ยากลุ่ม fluoroquinolone แล้วคือยาหรือไม่ได้ผล
Cefoperazone sodium + Sulbactam sodium	sterile pwdr	ง	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ nosocomial infection จากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ โดยเฉพาะการติดเชื้อ Acinetobacter sp.

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Cefotaxime sodium	sterile pwdr	ค	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	หมายเหตุ : 1. ใช้สำหรับการติดเชื้อในทารกแรกเกิด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด kernicterus จากการใช้ยา ceftriaxone 2. ใช้สำหรับโรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดจากแบคทีเรียกรัมลบ ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี 3. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ ceftriaxone แต่ต้องให้ยาบ่อยกว่า ceftriaxone
Cefoxitin sodium	sterile pwdr	ง	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	เงื่อนไข : 1. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของยามาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดในช่องท้องซึ่งขึ้นอยู่กับตามแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด 2. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Non-tuberculosis Mycobacterium sp. (atypical mycobacterium) สำหรับกลุ่ม rapid growers เท่านั้น หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้รักษาโรคติดเชื้ออื่นๆ เพราะเป็น beta-lactamase inducer
Ceftazidime	sterile pwdr	ค	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	เงื่อนไข : ใช้เป็น empiric/specific therapy สำหรับการติดเชื้อ P. aeruginosa และ melioidosis
Ceftriaxone sodium	sterile pwdr	ค	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ serious community acquired bacterial infection ยกเว้นการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa 2. ใช้สำหรับ gram-negative meningitis ยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี 3. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Penicillin Resistant S. pneumoniae (PRSP) 4. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบบางกรณีในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง ซึ่งไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม aminoglycosides ได้ 5. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae 6. ใช้กับผู้ป่วยซีฟาลิสที่ไม่ได้ตั้งครมร์ ซึ่งใช้ benzathine penicillin หรือ doxycycline ไม่ได้
Cefuroxime axetil	tab, dry syr	ข	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	หมายเหตุ : 1. ใช้สำหรับการติดเชื้อ H. influenzae ที่ติดต่อ ampicillin และ M. catarrhalis 2. ใช้กับผู้ป่วยที่แพ้หรือไม่สามารถใช้ยา co-amoxiclav ได้ หรือแพ้ยากลุ่ม penicillins ชนิดไม่รุนแรง
Cephalexin				ดู Cefalexin
Cetirizine hydrochloride	tab, syr	ก	3.4. Antihistamines	-
Charcoal, activated	pwdr	ก	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไป
Chloral hydrate	oral sol (hosp)	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Chlorambucil	tab	ค	8.1.1. Alkylating drugs	เงื่อนไข : สำหรับโรคไตที่ใช้กรรมวิธี idiopathic membranous glomerulonephritis
Chloramphenicol	ear drop	ก	12.1.1. Otitis externa and otitis media	-
	eye drop, eye oint	ก	11.1.1. Antibacterials and eye wash solution	-
Chloramphenicol sodium succinate	sterile pwdr	ค	5.1.7. Some other antibacterials	เงื่อนไข : ใช้รักษา rickettsiosis (scrub typhus, murine typhus) ที่ไม่สามารถใช้ยาชนิดอื่นได้
Chlordiazepoxide	cap, tab	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Chlorhexidine gluconate	mouthwash sol / mouthwash sol (hosp) (เฉพาะ 0.1-0.2% w/v)	ก	12.3.1. Drugs used in treatment of oral ulcer	-
			12.3.4. Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries	-
	sol (aqueous) (เฉพาะ 2%, 4% และ 5%), sol/sol (hosp) (เฉพาะ 2%, 4% in 70% alcohol)	ก	5.6. Antiseptics	หมายเหตุ : Chlorhexidine gluconate 5% เป็นชนิดเข้มข้นที่ใช้เตรียม Chlorhexidine แบบ freshly prepared
	sol (hosp) (เฉพาะ 2%)	ก	12.3.3. Antiseptics for root canal treatment	
Chloroquine phosphate	compressed tab, film coated tab	ข	10.1.2. Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)	คำเตือนและข้อควรระวัง : การใช้ยาอาจเป็นพิษต่อจอประสาทตา ควรตรวจจอประสาทตาเป็นระยะ ๆ หลังการให้ยา
	tab	ก	5.4.1. Antimalarials	-
Chlorphenamine maleate				ดู Chlorpheniramine maleate
Chlorpheniramine maleate	cap, tab, syr, sterile sol	ก	3.4. Antihistamines	-
Chlorpromazine hydrochloride	tab, sterile sol	ก	4.2.1. Antipsychotic drugs	-
Chlorpropamide	tab	ง	6.5.2. Posterior pituitary hormones and antagonists	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ partial central diabetes insipidus กรณีที่ไม่สามารถจัดหายา desmopressin ได้
Cholestyramine				ดู Colestyramine
Chorionic gonadotrophin	sterile pwdr	ง	6.5.1. Hypothalamic and anterior pituitary hormones	เงื่อนไข : ใช้สำหรับกระตุ้นการเคลื่อนตัวของอณฑะ ในผู้ป่วยเด็กที่มี undescended testis และใช้ทดสอบการทำงานของอณฑะ (HCG test)
Ciclosporin	cap, oral sol	ง	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับสะเก็ดชนิดปานกลางถึงรุนแรง ที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่นหรือมีข้อห้ามในการใช้ methotrexate 2. ใช้สำหรับ atopic dermatitis ชนิดรุนแรง 3. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา สำหรับรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังอื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไป
	cap, oral sol, oral susp, sterile sol	ค	8.2. Drugs affecting the immune response	-
	cap, oral sol, sterile sol	ง	10.1.2. Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)	เงื่อนไข : 1. ใช้เป็นยาเสริม (add on) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีโรคกำเริบ (disease activity score 28 เท่ากับหรือมากกว่า 2.6 ขึ้นไป) หลังได้รับการรักษาด้วย methotrexate ร่วมกับ sulfasalazine หรือ ยาด้านมาลาเรีย (chloroquine, hydroxychloroquine) ในขนาดเต็มทีอย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกันแล้วไม่ตอบสนอง 2. สั่งใช้ยานี้โดยอายุรแพทย์โรคข้อเท่านั้น 3. ผู้ป่วยมีการทำงานของไตเป็นปกติ และไม่มีภาวะความดันโลหิตสูง
Cidofovir ยาแก้พรั้า	sterile sol	ง	5.3.1 Non-antiretrovirals	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ adenovirus ในเลือดหรืออวัยวะอื่นที่มีอาการรุนแรงที่ไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill) โดยมีอาการทางคลินิกที่เข้าได้ร่วมกับการตรวจวินิจฉัยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				1. การตรวจพบ adenovirus ในเลือดด้วยวิธีทางอนุพันธุศาสตร์ (molecular detection) 2. การตรวจพบ adenovirus จากสิ่งส่งตรวจของอวัยวะที่มีอาการสงสัยด้วยวิธีทางอนุพันธุศาสตร์ (molecular detection) เช่น ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจส่วนล่าง น้ำล้างจากถุงลมปอด (broncho alveola lavage fluid) 3. การตรวจพบลักษณะทางพยาธิวิทยาที่เข้าได้กับการติดเชื้อ adenovirus (cytopathological change) หรือการตรวจพบไวรัสจากการตรวจด้วยกล้อง electron microscope
Ciprofloxacin hydrochloride	tab	ง	5.1.6. Quinolones	เงื่อนไข : ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เช่น ใช้ต่อเนื่องจากยาชนิด (sequential therapy หรือ switch therapy)
Ciprofloxacin lactate	sterile sol	ง	5.1.6. Quinolones	เงื่อนไข : ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เช่น 1. ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ไม่สามารถเข้ายากลุ่ม beta-lactam และ/หรือยากลุ่ม aminoglycoside ได้ 2. ใช้เป็น empiric therapy ใน 3 วันแรกของการรักษา ร่วมกับยากลุ่ม beta-lactam และ/หรือ aminoglycoside ในการรักษา severe hospital-acquired pneumonia ในกรณีที่ไม่สามารถรับประทานยาได้
Cisatracurium besilate	sterile sol	ค	15.1.3. Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)	-
Cisplatin	sterile pwdr, sterile sol	ค	8.1.5. Other antineoplastic drugs	-
Clarithromycin	tab, dry syr	ง	5.1.5. Macrolides	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อของทางเดินหายใจ ในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล 2. ใช้ในข้อบ่งใช้พิเศษสำหรับโรคติดเชื้อ non-tuberculous Mycobacterium sp. (atypical mycobacterium) 3. ใช้ใน triple therapy หรือ quadruple therapy สำหรับกำจัดเชื้อ H. pylori หลังจากได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อแล้ว
Clindamycin	cap (as hydrochloride), sterile sol (as phosphate)	ข	5.1.7. Some other antibacterials	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อของแบคทีเรียชนิด anaerobes, แบคทีเรียแกรมบวกชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม beta-lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียแกรมบวก และ anaerobe 2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกันหรือรักษา Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) ในผู้ป่วยเอดส์ 3. ไม่ควรใช้รักษาโรคติดเชื้อนอกเหนือไปจากข้อ 1 และข้อ 2 เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิด Antibiotics Associated Colitis (AAC) หมายเหตุ : AAC เกิดได้กับยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างทุกชนิดแม้แต่ amoxicillin
Clobetasol propionate	cream	ก	13.4. Topical corticosteroids	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
	lotion	ง	13.4. Topical corticosteroids	เงื่อนไข : ใช้สำหรับโรคผิวหนังเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น
	oint	ค	13.4. Topical corticosteroids	เงื่อนไข : ใช้สำหรับโรคผิวหนังเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น เช่น โรคสะเก็ดเงินที่เล็บซึ่งเป็นบริเวณที่หนาและต้องโรยยาที่เพิ่มการดูดซึมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษา
Clofazimine	cap	ก	5.1.10. Antileprotic drugs	-
		จ(1)	5.1.0 antituberculosis drug	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคติดต่อฯ โดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
Clomipramine hydrochloride	cap, tab	ค	4.3. Antidepressant drugs	-
Clonazepam	tab	ข	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	วัตถุประสงค์ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
			4.1. Hypnotics and anxiolytics	วัตถุประสงค์ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
			4.9. Drugs used in movement disorders	วัตถุประสงค์ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Clonidine hydrochloride	tab	ข	4.10.3. Drugs used in opioid dependence	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ heroin withdrawal
Clopidogrel bisulfate	tab	ค	2.9. Antiplatelet drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ เจาะกระดูกสันหลังป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ (secondary prevention) 2. ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือ recurrent thrombotic events 4. ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevated acute coronary syndrome ให้ใช้ clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หมายเหตุ : รมิควรระวังการใช้ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกได้มากกว่าการใช้ aspirin หรือ clopidogrel เพียงชนิดเดียว
Clotrimazole	cream	ก	13.1.2. Antifungal preparations	-
	ear drop	ข	12.1.2. Drugs used in otomycosis	-
	lozenge	ก	12.3.2. Oropharyngeal antifungal drugs	-
	vaginal tab	ก	7.2. Treatment of vaginal and vulval	-
Clove oil	oil	ก	12.3.3. Antiseptics for root canal treatment	-
Cloxacillin sodium	sterile pwdr	ก	5.1.1. Penicillins	-
Clozapine	tab	ค	4.2.1. Antipsychotic drugs	เงื่อนไข : 1. ไม่ควรใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา 2. ควรได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Coal tar (liquor carbonis detergens; LCD)	ทุก topical dosage form (hosp)	ก	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	-
Coal tar + Triamcinolone acetonide	cream (hosp) (เฉพาะ 3% + 0.02% หรือ 5% + 0.02%)	ก	13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	-
Co-amoxiclav				ดู Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate ดู Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate
Co-beneldopa				ดู Levodopa + Benserazide as hydrochloride
Co-careldopa				ดู Levodopa + Carbidopa as monohydrate
Codeine phosphate	tab	ค	4.7.1. Opioid analgesics	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
Codeine phosphate + Glyceril guaiaacolate	tab/cap (เฉพาะ 10 + 100 mg)	ค	3.6.1. Cough suppressants	-
Colchicine	tab	ก	10.1.3. Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia	คำเตือนและข้อควรระวัง : ยานี้มีผลข้างเคียง ทำให้ อุจจาระร่วงและอาจทำให้กล้ามเนื้อสลาย (rhabdomyolysis) จึงควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยา ที่ทำให้กล้ามเนื้อสลาย เช่น ยาในกลุ่ม statins เป็นต้น
Colestyramine	oral pwdr	ข	1.8. Drugs affecting intestinal secretions 2.12. Lipid-regulating drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ bile-acid diarrhea และ short bowel syndrome -
Colistimethate sodium	sterile pwdr	ง	5.1.7. Some other antibacterials	เงื่อนไข : ใช้สำหรับการติดเชื้อกรัมลบที่ดื้อต่อยากลุ่ม carbapenems
Complete fat-soluble vitamin preparation	preparation for intravenous use (sterile pwdr, sterile sol, sterile emulsion)	ค	9.4. Intravenous nutrition	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) และต้องการเฉพาะ fat-soluble vitamins หรือมีข้อห้ามใช้สำหรับ water-soluble vitamins
Complete water-soluble and fat soluble vitamins preparation	preparation for intravenous use (sterile pwdr, sterile sol, sterile emulsion)	ค	9.4. Intravenous nutrition	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) และต้องการทั้ง water-soluble และ fat-soluble vitamins
Complete water-soluble vitamin preparation	preparation for intravenous use (sterile pwdr)	ค	9.4. Intravenous nutrition	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) และต้องการเฉพาะ water soluble vitamins หรือมีข้อห้ามใช้สำหรับ fat-soluble vitamins
Compound Cardamom Mixture เฉพาะสูตรที่ไม่มี sodium bicarbonate	mixt, mixt (hosp)	ก	1.1. Antacids and other drugs for dyspepsia	-
Conjugated estrogens	sterile pwdr	ค	6.4.1. Female sex hormones	-
	tab	ก	6.4.1. Female sex hormones	-
	vaginal cream	ข	7.2. Treatment of vaginal and vulval conditions	-
Continuous ambulatory peritoneal dialysis	basic bag sol, double bag sol	ค	9.2. Fluids and electrolytes	-
Copper sulfate solution	sterile sol (hosp), oral sol (hosp)	ค	9.5. Minerals	-
Cosyntropin				ดู Tetracosactide
Co-trimoxazole				ดู Sulfamethoxazole - Trimethoprim

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Cresolated formaldehyde, Formaldehyde and Cresol solution				ดู Formocresol
Cromolyn sodium				ดู Sodium cromoglicate
Cyanocobalamin หรือ Hydroxocobalamin				ดู Vitamin B12
Cyclopentolate hydrochloride	eye drop	ค	11.3. Mydriatics and cycloplegics	-
Cyclophosphamide	sterile pwdr	ค	16. Antidotes	เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษจากสาร paraquat ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์พิษวิทยา
	tab, sterile pwdr	ค	8.1.1. Alkylating drugs	-
Cycloserine	cap	ค	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข: ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug
Cyclosporin				ดู Ciclosporin
Cyclosporine	eye drop (hosp)	ง	11.1.1. Antibacterials and eye wash solution	เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วย Keratoconjunctivitis sicca ที่มีอาการตาแห้งร่วมกับการอักเสบของพื้นผิวกระจกตา
Cyproheptadine hydrochloride	tab	ข	4.7.3.2. Drugs used in the prophylaxis of migraine	-
Cyproterone acetate	tab	ง	6.4.2. Male sex hormones and antagonists	เงื่อนไข: ใช้ในผู้ป่วย moderate to severe hirsutism ที่มีข้อห้ามใช้หรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา combined oral contraceptive หรือ spironolactone คำเตือนและข้อควรระวัง: อาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของตับ (ดีซ่าน, ตับอักเสบ, ตับวาย) มักเกิดขึ้นหลังการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน ควรติดตามการทำงานของตับและพิจารณาหยุดยา หากพบหลักฐานการเกิดพิษตับ
Cytarabine	sterile pwdr, sterile sol	ค	8.1.3. Antimetabolites	-
d4T				ดู Stavudine
Dacarbazine	sterile pwdr	ง	8.1.5. Other antineoplastic drugs	ยากำพร้า เงื่อนไข: ใช้สำหรับ Hodgkin's lymphoma ในสูตรยาเคมีบำบัด ABVD
Dactinomycin	sterile pwdr	ค	8.1.2. Cytotoxic antibiotics	-
Dantrolene sodium	sterile pwdr	ง	15.1.6. Drugs for malignant hyperthermia	ยากำพร้า เงื่อนไข: ใช้สำหรับ malignant hyperthermia
Dapsone	tab	ก	5.1.10. Antileprotic drugs	-
Darunavir (DRV)	tab (เฉพาะ 300 และ 600mg)	จ(2)	5.3.2. Antiretrovirals	เงื่อนไข: ใช้ในรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Dasatinib	tab (เฉพาะ 50 mg และ 70 mg)	จ(2)	8.1.5. Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข: ใช้สำหรับ chronic myeloid leukemia (CML) ที่ไม่สามารถใช้ imatinib หรือ nilotinib ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
DAT				ดู Diphtheria antitoxin
DDAVP				ดู Desmopressin acetate
ddl				ดู Didanosine
Deferasirox	tab	จ(2)	9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias	เงื่อนไข: 1. Transfusion Dependent Thalassemia ใช้เป็นยารักษาลำดับแรกในผู้ป่วยอายุ 2-6 ปี โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปในรายละเอียดตามภาคผนวก 3

* ในช่องเงื่อนไข/ อื่น ๆ ที่ระบุไว้ [ดูเพิ่ม] ให้ดูที่หมวดรายละเอียดของยา จัดเรียงตามชื่อยา A-Z หน้า A50-A120
 • บัญชี ก ข ค ง จ(1) หรือ จ(2) ดูรายละเอียดของแต่ละบัญชีได้ที่หน้า A15

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				2. ใช้เป็นยารักษาลำดับที่ 2 ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการรักษาด้วยยา deferiprone โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดตามภาคผนวก 3
Deferiprone	tab (เฉพาะ 500 mg)	ง	9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias	-
Deferoxamine mesilate	sterile pwdr	ค	9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias	หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มยา 16
			16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้กำจัดพิษจากภาวะธาตุเหล็กสูงผิดปกติเฉียบพลัน และเรื้อรัง
Delamanid	tab	จ(1)	5.1.9 antituberculosis drugs	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคดื้อยาโดยมีวิธีการรักษาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
Desferrioxamine mesilate				ดู Deferoxamine mesilate
Desflurane	inhalation vapour liquid	ง	15.1.2. Inhalational anaesthetics	เงื่อนไข : ใช้เป็นทางเลือกในการให้ยาระงับความรู้สึกในกรณีต่อไปนี้ 1. โรคอ้วน (morbidly obese) ที่มีภาวะ obstructive sleep apnea (OSA) ร่วมด้วย 2. โรคอ้วน (morbidly obese) ที่มี Body Mass Index (BMI) ตั้งแต่ 35 kg/m ² ขึ้นไป 3. การผ่าตัดซึ่งต้องการให้ผู้ป่วยตื่นเร็ว ได้แก่ ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การผ่าตัดที่ไม่ต้องรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 4. การผ่าตัดตมอง
Desmopressin acetate	tab, nasal spray, nasal sol, sterile sol	ง	6.5.2. Posterior pituitary hormones and antagonists	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ diabetes insipidus 2. ชนิดเม็ดใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ยาทางจมูกได้เท่านั้น
Desoximetasone	cream	ข	13.4. Topical corticosteroids	-
Desoxymethasone				ดู Desoximetasone
Dexamethasone	cap (as base), tab (as base), sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก	8.2. Drugs affecting the immune response	-
	cap/tab (as base), sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก	6.3. Corticosteroids	-
Dexamethasone + Framycetin sulfate + Gramicidin	ear drop/ear oint (เฉพาะ 0.5 mg + 5 mg + 0.05 mg in 1 ml or 1 g)	ค	12.1.1. Otitis externa and otitis media	-
Dexamethasone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate	eye oint	ค	11.1.2. Antibacterials with corticosteroids	หมายเหตุ : ยาที่มีส่วนผสมของ polymyxin B อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อของเชื้อในทาง systemic จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น
Dexamethasone sodium phosphate + Chloramphenicol + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	ค	11.1.2. Antibacterials with corticosteroids	-
Dexamethasone sodium phosphate + Neomycin sulfate	eye drop	ค	11.1.2. Antibacterials with corticosteroids	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Dextromethorphan hydrobromide	tab, syr	ก	3.6.1. Cough suppressants	-
Dextrose solution with minerals with electrolytes	sterile sol	ค	9.4. Intravenous nutrition	เงื่อนไข : ยานี้มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงจึงห้ามให้ทาง peripheral vein ต้องให้ทาง central vein เท่านั้น
Diazepam	cap, tab	ก	4.9. Drugs used in movement disorders	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
	cap, tab, sterile sol	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
			10.2.2. Skeletal muscle relaxants	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
			15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
sterile sol	ก	4.8.2. Drugs used in status epilepticus	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	
Diazoxide	tab	ง	6.1.3. Treatment of hypoglycemia	ยากำพรั้า เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI หรือ nesidioblastosis) 2. ใช้สำหรับ insulinoma ที่ผ่าตัดไม่ได้
				Diclofenac sodium
Diclofenac sodium with preservative	eye drop	ค	11.7. Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment	-
Dicloxacillin sodium	cap, dry syr	ก	5.1.1. Penicillins	-
Dicyclomine hydrochloride				ดู Dicycloverine hydrochloride
Dicycloverine hydrochloride	tab	ก	1.2. Antispasmodics and other drugs altering gut motility	-
Didanosine	tab, oral pwdr	ง	5.3.2. Antiretrovirals	เงื่อนไข : ใช้เป็น Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสตี้อย่า ในกรณีที่มีการรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาด้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา ddl (ไม่มี K65R) และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด
Diethylcarbamazine citrate	tab	ก	5.5. Anthelmintics	-
Digoxin	tab, elixir, sterile sol	ก	2.1. Positive inotropic drugs	-
Dihydroergotamine mesilate (ยากำพรั้า)	sterile sol (เฉพาะ 1mg/ml)	ง	4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack	เงื่อนไข: 1. ใช้สำหรับรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนเฉียบพลันชนิดรุนแรง (status migrainosus) 2. ใช้สำหรับรักษาอาการปวดศีรษะจากการใช้ยา (medication overuse headache หรือ rebound headache) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน 3. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Diltiazem hydrochloride	immediate release tab	ข	2.6.2. Calcium-channel blockers	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ ischemic heart disease (IHD) ไม่แนะนำให้ใช้ในการรักษา essential hypertension
	slow release cap/tab (เฉพาะ 120 mg) ไม่รวมชนิด controlled release	ก	2.6.2. Calcium-channel blockers	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ ischemic heart disease (IHD)
Dimenhydrinate	compressed tab, film coated tab, syr, sterile sol	ก	4.5.2. Drugs used in vestibular disorders	-
Dimercaprol	sterile oil solution for IM use	ค	16. Antidotes	ยากำพร้า เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจากปรอท ทอง และ สารหนู และใช้ร่วมกับ sodium calcium edetate ในกรณีบำบัดพิษเฉียบพลันจากตะกั่ว คำเตือนและข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ถั่วลิสง (peanut) และอาจมีการแพ้ข้ามกลุ่มไปยังถั่วเหลือง (soy) ได้
Diphenhydramine hydrochloride	cap, sterile sol	ก	3.4. Antihistamines 16. Antidotes	- ยากำพร้า เงื่อนไข : ใช้บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา
Diphtheria antitoxin	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	ยากำพร้า
Diphtheria-Tetanus vaccine ทั้งชนิด DT(children type)และ dT (adult type)	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell)	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B vaccine	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b vaccine (DTP-HB-Hib)	inj	ก	14 Immunological products and vaccines	-
Dipotassium clorazepate	cap, tab	ข	4.1. Hypnotics and anxiolytics	วัตถุที่ออกฤทธิ์จิตและประสาทประเภท 4
Dipotassium hydrogen phosphate	sterile sol	ค	9.5. Minerals	-
Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b vaccine(DTP-HB-Hib)	inj	ก	14 Immunological products and vaccines	หมายเหตุ : ราคายาวัคซีนรวม Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B- Haemophilus influenzae type b vaccine ที่ต้องรอให้ได้ผลไม่เกิน 47 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เงื่อนไขและรายละเอียด อื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/
Dipyridamole	sterile sol	ง	2.9. Antiplatelet drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับกรตรวจวินิจฉัยเท่านั้น
Disodium pamidronate	sterile pwdr, sterile sol	ง	6.6. Drugs affecting bone metabolism	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ severe osteogenesis imperfecta ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหัก
Disulfiram	tab	ค	4.10.1. Drugs used in alcohol dependence	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ที่ยินยอมจะใช้นานี้ร่วมกับวิธีจิตสังคมบำบัด เพื่อเป็นการควบคุมตนเองไม่ให้กลับไปดื่มซ้ำ คำเตือนและข้อควรระวัง : การกินยา Disulfiram ร่วมกับแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดอาการไม่สบายเนื่องมาจากการสะสมของ acetaldehyde ในเลือด

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่นๆ (conditions/ others)
Dithranol	paste (hosp), oint	ก	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	-
DMSA				ดู Tc-99m dimercaptosuccinic acid
DMSA [V]				ดู Tc-99m dimercaptosuccinic acid V
Dobutamine hydrochloride	sterile sol	ข	2.7.1. Inotropic sympathomimetics	-
Docetaxel	sterile sol	จ(2)	8.1.5. Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้ร่วมกับ cyclophosphamide ในการรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีปัญหาโรคหัวใจหรือเคยได้รับยา doxorubicin แล้ว โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประกาศกำหนด 2. ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหลังจากได้รับ doxorubicin และ paclitaxel แล้ว หรือมีปัญหาลิ้นหัวใจ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประกาศกำหนด 3. ใช้เป็น second-line drug สำหรับโรคมะเร็งปอด ชนิด non-small cell ระยะลุกลาม โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 4. ใช้สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Dolutegravir	tab (เฉพาะ 50 mg)	จ(2)	5.3.2 antiretrovirals	เงื่อนไข : ใช้รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสูตรที่สอง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก	1.2. Antispasmodics and other drugs altering gut motility 4.5.1. Drugs used in nausea and vomiting	- -
Donepezil hydrochloride	tab (เฉพาะ 5 mg และ 10 mg ไม่รวมชนิดละลายในปาก)	จ(2)	4.11 Drugs used in	เงื่อนไข : ใช้สำหรับภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Dopamine hydrochloride	sterile sol	ก	2.7.1. Inotropic sympathomimetics	-
Dorzolamide hydrochloride	eye drop (เฉพาะ 2% w/v)	ค	11.4 Drugs for treatment of glaucoma	เงื่อนไข: 1. ใช้รักษาต้อหินในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers หรือ 2. ใช้เฉพาะกรณีที่ใช้ยาชนิดอื่นรักษาต้อหินแล้ว ความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย
Dorzolamide hydrochloride+Timolol maleate	eye drop (เฉพาะ 2% w/v + 0.5% w/v)	ง	11.4 Drugs for treatment of glaucoma	เงื่อนไข: ใช้เฉพาะกรณีที่ใช้ยารักษาต้อหินชนิดอื่นแล้ว ความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย
Doxazosin mesilate	immediate release tab	ค	2.5.3. Alpha-adrenoceptor blocking drugs	-
	immediate release tab (เฉพาะ 2 และ 4 mg)	ค	7.4.1. Drugs for benign prostatic hyperplasia	-
Doxorubicin hydrochloride	sterile pvdw, sterile susp, sterile sol	ค	8.1.2. Cytotoxic antibiotics	เงื่อนไข : ไม่ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มี cardiomyopathy ที่มี left ventricular ejection fraction น้อยกว่า 50%

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Doxycycline hyclate	cap, tab	ก	5.1.3. Tetracyclines	-
Doxycycline hydrochloride				ดู Doxycycline hyclate
D-Penicillamine				ดู Penicillamine
Dried protein-free dialysate of calf blood	eye gel	ง	11.6. Tear deficiency, ocular lubricants and astringents	เงื่อนไข : ใช้เพิ่มการสมานของแผลที่กระจกตา
DRV				ดู Darunavir ethanolate
DTPA				ดู Tc-99m diethylene triamine penta acetic acid
DTP-HB				ดู Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B vaccine
DTPw				ดู Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell)
Edetate calcium disodium, Calcium EDTA				ดู Sodium calcium edetate
Edrophonium chloride ยก้าพรั้า	sterile sol (เฉพาะ 10mg/ml)	ง	15.1.5 Anticholine sterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia	เงื่อนไข : ใช้วินิจฉัยโรค myasthenia gravis
EDTA	sol (hosp) (เฉพาะ 14% หรือ 17%)	ก	12.3.3. Antiseptics for root canal treatment	-
Efavirenz	cap, tab	ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
EFV				ดู Efavirenz
Enalapril maleate	tab	ก	2.5.4. Angiotensin-converting enzyme inhibitors	-
Enoxaparin sodium	sterile sol	ค	2.8. Anticoagulants	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ deep vein thrombosis และ pulmonary embolism 2. ใช้สำหรับ venous stroke และ cardioembolic stroke 3. ใช้กับผู้ป่วย acute coronary syndrome (ACS) ที่ต้องรับการรักษาด้วยวิธี Percutaneous Coronary Intervention หมายเหตุ : ในกรณี ACS ที่มีแผนการรักษาแบบ conservative ให้ใช้ fondaparinux แทน
Entacapone	tab	ง	4.9. Drugs used in movement disorders	เงื่อนไข : ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ใช้อื่นไม่ได้ผล
Entecavir	tab (เฉพาะ0.5mg)	ง	15.1.5 Anticholine sterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia	เงื่อนไข: 1. ผู้ป่วยติดเชื้อ hepatitis B virus (HBV) ที่ตรวจพบ advance hepatic fibrosis และมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.1.transient elastography เช่น Fibroscan® มากกว่าหรือเท่ากับ 12kPa หรือ 1.2.liver biopsy ที่มี fibrosis score เทียบเท่า metavir มากกว่าหรือเท่ากับ F3 2. มีปริมาณ HBV DNA ก่อนการรักษามากกว่าหรือเท่ากับ 8log10 copies/mL 3. ผู้ป่วยดับอีกเสบมีเรื้อรังที่ติดต่อยา Lamivudine แบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 ผู้ป่วยดับอีกเสบมีเรื้อรังที่ติดต่อยา Lamivudine และกำลังได้รับการรักษาด้วยยา tenofovir อยู่แล้วเกิดมีค่าการทำงานของไตบกพร่องตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				<p>3.1.1 มี serum creatinine มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 mg/dL หรือ</p> <p>3.1.2 มี eGFR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50mL/min หรือ</p> <p>3.1.3 ผู้ป่วยมีภาวะ proximal tubular dysfunction ร่วมกับมีความผิดปกติ ดังนี้ hypokalemia หรือ hypophosphatemia หรือ glucosuria(ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะ hyperglycemia) หรือ proteinuria มากกว่าหรือเท่ากับ 1g/day กรณีที่ 2 ผู้ป่วยดับชีพเมื่อมีเครื่องที่ติดต่อยา Lamivudine และมีค่าการทำงานของไตบกพร่องตามเกณฑ์ข้างต้นอยู่ก่อนแล้ว</p> <p>หมายเหตุ: 1.การติดต่อยา lamivudine หมายถึงหลังการให้ยา lamivudine ไปแล้ว 6 เดือนยังคงตรวจพบไวรัสมากกว่า 200IU/mL หรือยังคงตรวจพบไวรัสหลังการรักษา 12 เดือน</p>
Ephedrine hydrochloride	nasal drop (hosp) (เฉพาะ 0.5-3%)	ก	12.2.2. Topical nasal decongestants	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
	sterile sol	ค	2.7.2. Vasoconstrictor sympathomimetics	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Epinephrine	sterile sol	ก	2.7.3. Drugs used in cardiopulmonary resuscitation	-
			12.3.5. Other dental preparations	-
Epoetin alfa	sterile powder/sterile sol (เฉพาะ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 IU)	จ(2)	9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias	เงื่อนไข : ใช้สำหรับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้ โดยมีแนวทางการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Epoetin alpha				ดู Epoetin alfa
Epoetin beta	sterile sol (เฉพาะ 2000, 3000, 5000 IU)	จ(2)	9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias	เงื่อนไข : ใช้สำหรับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้ โดยมีแนวทางการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Eptifibatide	sterile sol	ง	2.9. Antiplatelet drugs	เงื่อนไข : ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยสายสวนขยายหลอดเลือดหัวใจเท่านั้น
Ergocalciferol				ดู Vitamin D2
Ergotamine tartrate + Caffeine	compressed tab, film coated tab (เฉพาะ 1 + 100 mg)	ค	4.7.3.1. Drugs for acute migraine attack	-
ERIG				ดู Rabies immunoglobulin, horse
Erlotinib	tab (เฉพาะ 150 mg)	จ(2)	8.1.5 Other antineoplastic drugs	<p>เงื่อนไข : ใช้เป็น first-line drug สำหรับโรคมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung carcinoma (NSCLC) ระยะลุกลามถึงแพร่กระจายที่มีผลตรวจการกลายพันธุ์ของยีน Epidermal growth factor receptor (EGFR) เป็นบวก โดยมีแนวทางการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3</p> <p>หมายเหตุ : ราคา ยา erlotinib รูปแบบ tab ขนาด 150 mg ที่ต้องรองได้ราคาเน็ตละไม่เกิน 176.57 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/</p>
Ertapenem sodium	sterile powder	ง	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	เงื่อนไข : ใช้เป็น documented therapy สำหรับเชื้อที่สร้าง extended spectrum beta-lactamases (ESBL) หรือเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ติดต่อยา cephalosporins รุ่นที่ 3 (ceftriazone, cefotaxime, ceftazidime) และไวด์ออกกลุ่ม carbapenems

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Erythromycin estolate	susp/dry syr	ก	5.1.5. Macrolides	เงื่อนไข : ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หมายเหตุ : ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคตับ
Erythromycin stearate or succinate	dry syr	ก	5.1.5. Macrolides	-
Esmolol hydrochloride	sterile sol	ง	2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับรักษาภาวะที่หัวใจมีการเต้นเร็วผิดปกติ (supraventricular tachycardia, non-compensatory sinus tachycardia) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในระหว่างและหลังการผ่าตัด 2. ใช้สำหรับควบคุมการเต้นของหัวใจให้ช้ากว่าปกติหรือไม่ให้เต้นเร็ว ทั้งในระหว่างและหลังการผ่าตัด หรือในระหว่างการรับความรู้อีก หรือ ทำหัตถการ เช่น การตรวจวินิจฉัยด้วย computed tomography (CT) heart เป็นต้น 3. ใช้โดยวิสัญญีแพทย์ หมายเหตุ : ใช้ยานี้ในระยะสั้นไม่เกิน 24 ชั่วโมง
Estradiol valerate	tab	ข	6.4.1. Female sex hormones	-
Ethambutol hydrochloride	film coated tab	ก	5.1.9. Antituberculous drugs	-
Ethanol	sterile sol, sterile sol (hosp)	ก	16. Antidotes	ยากำพร้าเฉพาะรูปแบบ serial sol เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษจาก methanol และ ethylene glycol
Ethinylestradiol + Desogestrel	tab (เฉพาะ 20 + 150 mcg)	ข	7.3. Contraceptives	-
Ethinylestradiol + Levonorgestrel	tab (เฉพาะ 30 + 150 mcg)	ก	7.3. Contraceptives	-
Ethionamide	tab	ค	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข : ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug
Ethyl alcohol	sol, sol (hosp), gel (hosp)	ก	5.6. Antiseptics	-
Etomidate	sterile emulsion	ค	15.1.1. Intravenous anesthetics	เงื่อนไข : ใช้สำหรับนำสลบ (Induction of general anesthesia) ในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหัวใจและหลอดเลือด
Etonogestrel	implant 1 rod (68 mg/rod)	ก	7.3. Contraceptives	-
Etoposide	cap (as base), sterile sol (as base)	ค	8.1.4. Vinca alkaloids and etoposide	-
Everolimus	tab (เฉพาะ 0.25 mg และ 0.5 mg)	ง	8.2 Drugs affecting the immune response	เงื่อนไข : 1. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ maintenance therapy ร่วมกับยา tacrolimus เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา tacrolimus ในขนาดสูงและเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา mycophenolate mofetil ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสียเรื้อรัง (มากกว่า 2 สัปดาห์) ภาวะกดไขกระดูก 2. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ ที่มีภาวะดังต่อไปนี้ 2.1 ภาวะ cardiac allograft vasculopathy ที่ยืนยันโดย coronary angiogram หรือ intravascular ultrasound (IVUS) และ/หรือ 2.2 ภาวะไตวายที่มีค่า eGFR (CKD-EPI formula) น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m ²
Factor IX complex (coagulation factors II, VII, IX, X) concentrate, dried	sterile preparation for intravenous use	จ(2)	2.11. Hemostatics	เงื่อนไข : เช่นเดียวกับ Factor VIII concentrate, dried

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Factor IX concentrate, dried	sterile preparation for intravenous use	จ(2)	2.11. Hemostatics	เงื่อนไข : เช่นเดียวกับ Factor VIII concentrate, dried
Factor VIII concentrate, dried	sterile preparation for intravenous use	จ(2)	2.11. Hemostatics	เงื่อนไข : ใช้สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย ยี้มพิเลีย โดยมีแนวทางกำกับกาใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Fat emulsion	sterile emulsion (เฉพาะ 20%)	ค	9.4. Intravenous nutrition	-
Febuxostat	tab (เฉพาะ 80 mg)	ง	10.1.3 Drugs for treatment of gout and hypericaemia	เงื่อนไข : ใช้สำหรับภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่มีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1. ผู้ป่วยैया allopurinol รุนแรง และมีข้อห้ามในการใช้ยากลุ่ม uricosuric 2. หลังใช้ยา uricosuric ร่วมกับ allopurinol แล้ว ผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริกมากกว่า 6 mg/dl 3. เป็นยาทางเลือกในกรณีที่ใช้ allopurinol แล้วมีเอนไซม์ตับสูงเกิน 3 เท่าของค่าปกติ หรือเพิ่มขึ้นเกิน 2 เท่าของระดับก่อนให้ยา และมีข้อห้ามใช้ยา กลุ่ม uricosuric
Fenofibrate	cap (เฉพาะ 100, 200 mg)	ค	2.12. Lipid-regulating drugs	-
Fentanyl	sterile sol (as citrate), transdermal therapeutic system (as base)	ค	4.7.1. Opioid analgesics	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความเจ็บปวดรุนแรง
Fentanyl citrate	sterile sol	ค	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความเจ็บปวดรุนแรง
Ferrous fumarate	cap, tab, oral sol, susp	ข	9.5. Minerals	-
	tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron)	ก	9.6. Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers	คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน 2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย
Ferrous salt + Folic acid	tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg)	ก	9.6. Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับเสริมธาตุเหล็กและโฟเลตลดการตั้งครรภ์ 2. ใช้สำหรับเสริมธาตุเหล็กและโฟเลตในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร คำเตือนและข้อควรระวัง : ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
Ferrous salt + Folic acid + Potassium iodide	tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine)	ก	9.6. Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers	เงื่อนไข : 1. ใช้เสริมธาตุเหล็ก โฟเลต และไอโอดีนลดการตั้งครรภ์ 2. ใช้สำหรับเสริมธาตุเหล็ก โฟเลต และไอโอดีนในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร 3. ห้ามใช้ในผู้ที่มีการไทรอยด์เป็นพิษ คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็นพิษ 2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
Ferrous sulfate	cap, tab, oral sol, drop	ก	9.5. Minerals	-
	tab (เฉพาะ 60 และ 65 mg as iron)	ก	9.6. Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers	คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน 2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย
Filgrastim	sterile sol	ง	9.1.3. Drugs used in bone marrow transplantation	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด เพื่อเคลื่อนย้าย progenitor cell จากไขกระดูกออกมาในเลือดของผู้ให้หรือผู้ป่วย เพื่อนำไปใช้ทั้งใน allogeneic และ autologous transplantation

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				<p>2. ใช้รักษา febrile neutropenia ที่เกิดจากยาเคมีบำบัด ให้พิจารณาในผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ร่วมกับการให้ยาด้านเชื้อจุลชีพในผู้ป่วยความเสี่ยงสูง กล่าวคือมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>2.1 Profound neutropenia ซึ่งมี absolute neutrophil count น้อยกว่า 100 /mm³</p> <p>2.2 มีปอดอักเสบชนิด bacterial pneumonia หรือ lobar pneumonia หรือ มีภาวะ septicemia</p> <p>3. ใช้ป้องกัน febrile neutropenia แบบปฐมภูมิ (primary prophylaxis) ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>3.1 ผู้ป่วยที่จะได้รับยาเคมีบำบัดด้วยสูตรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด febrile neutropenia มากกว่าร้อยละ 20</p> <p>3.2 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด febrile neutropenia ร้อยละ 10 - 20 ร่วมกับการประเมินปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย กล่าวคือ มีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • อายุมากกว่า 65 ปี • มี performance status ที่ไม่ดี (Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status มากกว่าหรือเท่ากับ 2) • มีภาวะ neutropenia (absolute neutrophil count < 1,500/mm³) หรือมีโรคแทรกซ้อนในไขกระดูกที่เกิดจากโรคมะเร็งดังกล่าว <p>4. ใช้ป้องกัน febrile neutropenia แบบทุติยภูมิ (Secondary prophylaxis) ในผู้ป่วยที่เคยเกิด febrile neutropenia จากการรับยาเคมีบำบัดในครั้งก่อน และเป็นผู้ป่วยที่มีเป้าหมายการรักษาเพื่อหายขาด (curative aim) หมายเหตุ :</p> <p>1. ไม่แนะนำให้ใช้ยากกลุ่ม Granulocyte-Colony Stimulating Factors (G-CSF) ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับเคมีบำบัดโดยไม่ได้หวังผลการรักษาเพื่อหายขาด สำหรับ palliative chemotherapy แนะนำให้ลดขนาดยาเคมีบำบัดลงตามมาตรฐาน</p> <p>2. Febrile neutropenia หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยมีใช้ร่วมกับนิวโทรฟิลในเลือดต่ำ โดยใช้ คือ</p> <p>1) ภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายซึ่งวัดทางปาก ณ เวลาใด ๆ มากกว่าหรือเท่ากับ 38.3°C หรือ</p> <p>2) ภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายซึ่งวัดทางปากมากกว่าหรือเท่ากับ 38.0°C นานติดต่อกันเกิน 1 ชั่วโมง</p> <p>นิวโทรฟิลในเลือดต่ำ คือ</p> <p>1) จำนวนนิวโทรฟิลในเลือด (absolute neutrophil count) น้อยกว่า 0.5 x 10⁹/L หรือ</p> <p>2) จำนวนนิวโทรฟิลในเลือดน้อยกว่า 1.0 x 10⁹/L ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 x 10⁹/L ภายใน 48 ชั่วโมง</p>
Finasteride	tab (เฉพาะ 5 mg)	ง	7.4.1. Drugs for benign prostatic hyperplasia	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่มีอาการผิดปกติในการปัสสาวะระดับปานกลางถึงรุนแรง และมีขนาดของต่อมลูกหมากมากกว่า 40 ml หมายเหตุ : Finasteride ขนาด 1 mg ที่ใช้รักษาศีรษะล้านไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
Flecainide acetate	tab	ง	2.3. Anti-arrhythmic drugs	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นควบคุมจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจไม่ได้หรือไม่ได้ผล
Fluconazole	cap	ก	5.2. Antifungal drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ invasive fungal infection บางชนิด 2. ใช้สำหรับ dermatomycoses
	sterile sol	ค	5.2. Antifungal drugs	เงื่อนไข : ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ amphotericin B ในการรักษา cryptococcosis หรือ candidiasis เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้ amphotericin B ได้

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Flucytosine ยากำพร้าว	oral	ง	5.2 Antifungal drugs	เงื่อนไข : ใช้เสริมฤทธิ์ต้านเชื้อราอื่น ๆ ในผู้ป่วย cryptococcosis
Fludarabine phosphate	sterile powdr (เฉพาะ 50mg)	ง	8.1.3 Antimetabolites	ใช้เป็น first line หรือ second line treatment ใน B-cell chronic lymphocytic leukemia
Fludrocortisone acetate	tab (เฉพาะ 500mg)	ข	6.3. Corticosteroids	ยากำพร้าว เงื่อนไข : ใช้สำหรับ replacement therapy ใน adrenocortical insufficiency
Flumazenil	sterile sol	ง	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้แก้ฤทธิ์จากการใช้ยาในกลุ่ม benzodiazepines กรณีการทำหัตถการทางวิสัญญี
Fluocinolone acetonide	oral paste, oral gel, sol	ข	12.3.1. Drugs used in treatment of oral ulcer	เงื่อนไข : ใช้ในกรณีที่ใช้ยา triamcinolone acetonide ไม่ได้ผลหรือรอยโรครุนแรง หมายเหตุ : รูปแบบยา oral paste ดังกล่าวหมายถึงรวมถึง orabase ด้วย
Fluorescein sodium	sterile sol for inj	ค	11.7. Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment	-
Fluorometholone	eye susp (as base)	ค	11.2. Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations	เงื่อนไข : ใช้รักษาเยื่อตาอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น ภูมิแพ้ การระคายเคือง เป็นต้น หมายเหตุ : การใช้ยานี้ต้องระวังการติดเชื้อราที่กระจกตา การเกิด steroid glaucoma และการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิด steroid cataract
Fluorouracil	sterile sol	ค	8.1.3. Antimetabolites	-
Fluoxetine hydrochloride	cap, tab	ก	4.3. Antidepressant drugs	-
Flupenthixol				ดู Flupentixol
Flupentixol	tab (as hydrochloride), sterile sol (as decanoate)	ค	4.2.1. Antipsychotic drugs	เงื่อนไข : ใช้ในกรณีใช้ยาอื่นไม่ได้ผล
Fluphenazine	tab (as hydrochloride), sterile sol (as decanoate)	ก	4.2.1. Antipsychotic drugs	-
Flutamide	tab	ง	8.3.2. Prostate cancer	เงื่อนไข : ใช้เป็น monotherapy สำหรับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแพร่กระจายโดยเป็น second-line drug ของ bilateral orchiectomy
Fluticasone propionate	MDI	ค	3.2. Corticosteroids	เงื่อนไข : ใช้ในยาทางเลือกกรณีต้องการใช้ยาที่มี potency สูงในการรักษา
	susp for nebulizer	ก	3.2. Corticosteroids	-
Fluticasone propionate + Salmeterol	DPI, MDI	ค	3.2. Corticosteroids	หมายเหตุ : เช่นเดียวกับ Budesonide + Formoterol
Fluticasone furoate	nasal spray	ง	12.2.1. Drugs used in nasal allergy	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยอายุ 2 ปีขึ้นไปในข้อบ่งใช้ 1. โพรเจกติกส์จากภูมิแพ้ที่เกิดตามฤดูกาลและตลอดปี 2. เยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้
Folic acid	tab (เฉพาะ 400 mcg และ 5 mg)	ก	9.3. Vitamins 9.6. Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers	- เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับเสริมโฟเลทตลอดการตั้งครรภ์ 2. ใช้สำหรับเสริมโฟเลทในช่วง 6 เดือนแรกของกาให้นมบุตร 3. กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรที่มีภาวะ neural tube defect หรือปากแหว่ง เพดานโหว่ ควรใช้ความแรง 5 mg

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
	tab (เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 mg)	ก	9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias	-
Fondaparinux sodium	sterile sol (2.5 mg/0.5 ml)	ง	2.8. Anticoagulants	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ acute coronary syndrome ที่ไม่ต้องทำ Percutaneous Coronary Intervention (conservative management)
Formocresol	sol (hosp)	ก	12.3.3. Antiseptics for root canal treatment	-
Fosfomicin sodium	sterile pwdr	ง	5.1.7. Some other antibacterials	เงื่อนไข : ใช้สำหรับกรณีติดเชื้อ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ที่มีอาการรุนแรงน้อยถึงปานกลาง โดยใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยา
Fresh dried plasma		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Fresh frozen plasma		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Frozen cryoprecipitate		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Furosemide	tab, sterile sol	ก	2.2. Diuretics	-
Fusidic acid	cream	ข	13.1.1. Antibacterial preparations	-
	eye drop (in gel base)	ง	11.1.1. Antibacterials and eye wash solution	เงื่อนไข : ใช้สำหรับหนังตาอักเสบ (blepharitis) ในกรณีที่ใช้ chloramphenicol หรือ gentamicin แล้วแพ้หรือไม่ได้ผล หมายเหตุ : ยาเปลี่ยนเป็นของเหลวเมื่อยาสัมผัสลูกศุดตา
Gabapentin	cap (เฉพาะ 100, 300, 400 mg), tab (เฉพาะ 600 mg)	ง	4.7.2. Drugs for neuropathic pain	เงื่อนไข : ใช้บรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทเท่านั้น หมายเหตุ : ไม่มีหลักฐานว่ามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อเยื่อเยื่อพังผืด กระดูกและข้อ
	sterile pwdr	ง	5.3.1. Non-antiretrovirals	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับโรค cytomegalovirus infection 2. ใช้กรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
Gemcitabine hydrochloride	sterile pwdr	ง	8.1.3. Antimetabolites	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ advanced pancreatic cancer 2. ใช้สำหรับ advanced non-small cell lung cancer 3. ใช้สำหรับ advanced bladder cancer 4. ใช้สำหรับ second-line หรือ subsequent line ใน advanced ovarian cancer ที่คือตัวยานในกลุ่ม taxane
Gemfibrozil	cap (เฉพาะ 300, 600 mg), tab (เฉพาะ 600 mg)	ก	2.12. Lipid-regulating drugs	-
Gentamicin sulfate	eye drop, eye oint	ข	11.1.1. Antibacterials and eye wash solution	หมายเหตุ : ประสิทธิภาพของ gentamicin ไม่แตกต่างจาก tobramycin
	sterile sol	ก	5.1.4. Aminoglycosides	-
Gentian violet	sol (hosp)	ก	12.1.2. Drugs used in otomycosis	คำเตือนและข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แก้วหูทะลุ
	sol (paint)	ก	5.6. Antiseptics	-
Glibenclamide	tab (เฉพาะ 2.5, 5 mg)	ก	6.1.2. Oral antidiabetic drugs	คำเตือนและข้อควรระวัง : ระวังมีดรรชนีในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
Glipizide	tab	ก	6.1.2. Oral antidiabetic drugs	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Glucagon, Human ยากำพรัว	sterile pwdr	ง	6.1.3 Treatment of hypoglycemia	เงื่อนไข : ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีภาวะ hypoglycemia บ่อยครั้ง (มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์) หรือ เกิดภาวะ severe hypoglycemia หมายถึง hypoglycemia รุนแรงมากจนต้องมาห้องฉุกเฉิน หรือ รับไว้ในโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง
Glucose with/without sodium chloride	sterile sol	ก	9.2. Fluids and electrolytes	-
Glycerol	oral sol (hosp)	ก	11.4. Drugs for treatment of glaucoma	-
	rectal supp	ก	1.6. Laxatives	-
Glyceryl guaiacolate	tab, syr	ก	3.6.2. Expectorant and demulcent cough preparations	-
Glyceryl trinitrate	sterile sol	ก	2.6.1. Nitrates	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในกรณีที่มี coronary ischemia
Glycopyrronium bromide	sterile sol	ง	15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia	เงื่อนไข : 1. ใช้เป็นยาทางเลือกแทนยา atropine โดยใช้ร่วมกับยา neostigmine ในการแก้ฤทธิ์ยาหยาบกล้ามเนื้อในผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาหัวใจเต้นเร็ว 2. ใช้ลดเสมหะหรือน้ำลายในการดมยาสลบกรณีที่จะทำหัตถการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 3. ใช้ลดเสมหะในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (end-of-life)
Griseofulvin	tab	ก	5.2. Antifungal drugs	-
Haloperidol	tab (as base), oral sol (as base), sterile sol (as base or decanoate)	ก	4.2.1. Antipsychotic drugs	-
Halothane	volatile liquid	ค	15.1.2. Inhalational anesthetics	-
HB				ดู Hepatitis B vaccine
HBIG				ดู Hepatitis B immunoglobulin, human
HCTZ				ดู Hydrochlorothiazide
HDCV				ดู Rabies vaccines ยกเว้นชนิด human diploid cell vaccine
Heparin sodium	sterile sol	ค	2.8. Anticoagulants	-
Hepatitis B immunoglobulin, human	inj	ค	14. Immunological products and vaccines	เงื่อนไข : ใช้ร่วมกับวัคซีน hepatitis B vaccine เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ทารกแรกเกิดที่มารดามี HBsAg เป็นบวก 2. เมื่อผิวหนังหรือเยื่อเมือกสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มีผล HBsAg เป็นบวก เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุสัมผัสโรคจากการทำงานตามแนวปฏิบัติของสถานพยาบาลนั้น ๆ หรือผู้ที่ถูกข่วน 3. ป้องกันผู้ป่วยจากการกลับเป็นโรคตีบอักเสบมีซ้า หลังจากได้รับการเปลี่ยนตับแล้ว หมายเหตุ : ในทารกแรกเกิดซึ่งมารดามีอายุครรภ์ปกติ การให้วัคซีนภายใน 24 ชั่วโมง สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากอยู่แล้ว การให้ HBIG ไม่ทำให้การป้องกันสูงขึ้น
Hepatitis B vaccine	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
HRIG				ดู Rabies immunoglobulin, human
Human Chorionic Gonadotrophin : HCG				ดู Chorionic gonadotrophin

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Human normal immunoglobulin, intravenous	sterile pwdr, sterile sol	จ(2)	8.2. Drugs affecting the immune response	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับโรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน (acute phase of Kawasaki disease) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 2. ใช้สำหรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (primary immunodeficiency diseases) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 3. ใช้สำหรับโรค immune thrombocytopenia ชนิดรุนแรง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 4. ใช้สำหรับ autoimmune hemolytic anemia (AIHA) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามขั้นตอนของมาตรฐานการรักษา และมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 5. ใช้สำหรับโรค Guillain-Barré syndrome ที่มีอาการรุนแรง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 6. ใช้สำหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายแรง (myasthenia gravis, acute exacerbation หรือ myasthenic crisis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 7. ใช้สำหรับโรค pemphigus vulgaris ที่มีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 8. ใช้สำหรับ hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 9. ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ dermatomyositis โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 10. ใช้สำหรับโรค Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Human papillomavirus vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent)	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. เลือก 1 รายการ ระหว่างรายการที่ 24 หรือ 25 ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า
Human papillomavirus vaccine ชนิดที่มีสายพันธุ์ก่อโรคอย่างน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. เลือก 1 รายการ ระหว่างรายการที่ 24 หรือ 25 ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า
Human thrombin + Calcium chloride + Fibrinogen +Tranexamic acid	sterile sol	จ	2.11. Hemostatics	ยากำทำพำเฉพาะรูปแบบ sterile pwdr เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับภาวะเลือดออกจากอุบัติเหตุ การถอนพิษ การผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกแล้วหยุดยาก เช่น hemophilia, thrombocytopenia, platelet dysfunction, von Willebrand's disease 2. ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งไม่สามารถห้ามเลือดด้วยวิธีปกติได้ เช่น การผ่าตัดตับ การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดปอด เป็นต้น

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่นๆ (conditions/ others)
Hydralazine hydrochloride	tab, sterile powdr	ก	2.5.1. Vasodilator antihypertensive drugs	ยากำพร้าเฉพาะรูปแบบ sterile powdr เงื่อนไข : ชนิดจัดใช้สำหรับ hypertensive emergencies ¹ ในหญิงตั้งครรภ์
Hydrochlorothiazide	tab	ก	2.2. Diuretics	-
Hydrocortisone	tab (as base), sterile powdr (as sodium succinate), sterile susp (as acetate)	ก	6.3. Corticosteroids	ชนิดเม็ดเป็นยากำพร้า
Hydrocortisone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate	ear drop (เฉพาะ 10 mg + 3400 U + 10000 U in 1 ml)	ค	12.1.1. Otitis externa and otitis media	-
Hydrocortisone acetate	cream, cream (hosp)	ก	13.4. Topical corticosteroids	-
Hydrogen peroxide	mouthwash sol (1.5% w/v)	ก	12.3.5. Other dental preparations	-
	sol	ก	5.6. Antiseptics	-
Hydroxycarbamide	cap	ค	8.1.5. Other antineoplastic drugs	-
Hydroxychloroquine sulfate	tab	ข	10.1.2. Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)	คำเตือนและข้อควรระวัง : การใช้ยาอาจเป็นพิษต่อจอประสาทตา ควรตรวจจอประสาทตาเป็นระยะ ๆ หลังการให้ยา
Hydroxyprogesterone caproate	sterile oily sol for inj	ข	6.4.1. Female sex hormones	-
Hydroxyurea				ดู Hydroxycarbamide
Hydroxyzine hydrochloride	tab, syr	ก	3.4. Antihistamines	-
		ข	4.1. Hypnotics and anxiolytics	-
Hyoscine butylbromide	tab, syr, sterile sol	ก	1.2. Antispasmodics and other drugs altering gut motility	-
Hyoscine-n-butylbromide				ดู Hyoscine butylbromide
Hypromellose (with preservative)	eye drop	ก	11.6. Tear deficiency, ocular lubricants and astringents	-
Hypromellose + Dextran 70 (preservative free)	eye drop (เฉพาะ 0.3% + 0.1%)	ง	11.6. Tear deficiency, ocular lubricants and astringents	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยตาแห้งมาก ที่ใช้น้ำตาเทียมที่ไม่มี preservative ไม่ได้
Ibuprofen	ilm coated tab	ก	4.7.3.1. Drugs for acute migraine attack	-
	film coated tab, susp	ก	4.6. Analgesics and antipyretics	คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อด้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน 2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ใช้เลือดออก
			10.1.1. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)	คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อด้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน 2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ใช้เลือดออก

* ในช่องเงื่อนไข/อื่น ๆ ที่ระบุไว้ [ดูเพิ่ม] ให้อ่านที่หมวดรายละเอียดของยา จัดเรียงตามชื่อยา A-Z หน้า A50-A120
 * บัญชี ก ข ค ง จ(1) หรือ จ(2) ดูรายละเอียดของแต่ละบัญชีได้ที่หน้า A15

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
IDA				ดู Tc-99m iminodiacetic acid
Idarubicin hydrochloride	sterile pwdr, sterile sol	ง	8.1.2. Cytotoxic antibiotics	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วย acute myeloid leukemia
Indocyanine green	sterile pwdr for inj	ง	11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment	ยากำพรั้ง เงื่อนไข : ใช้เพื่อวินิจฉัย polypoidal choroidal vasculopathy (PCV)
Ifosfamide	sterile pwdr	ง	8.1.1. Alkylating drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ lymphoma ชนิด relapse หรือ refractory 2. ใช้กับผู้ป่วยที่เป็น sarcoma 3. ใช้เป็น Wilms' tumor และ neuroblastoma 4. ใช้สำหรับ germ cell tumor
Imatinib mesilate	tab (เฉพาะ 100 และ 400 mg)	จ(2)	8.1.5. Other antineoplastic drugs	1. ใช้สำหรับ chronic myelogenous leukemia (CML) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 2. ใช้สำหรับ gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลุกลามหรือมีการกระจายของโรค โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Imiglucerase	sterile pwdr	จ(2)	9.7. Metabolic disorders	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ Gaucher's disease โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Imipenem + Cilastatin sodium	sterile pwdr	ง	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดจากแบคทีเรีย รูปแท่งกลมที่ดื้อยาหลายชนิด (Multiple-Drug-Resistant, MDR) ซึ่งควรมีผลการทดสอบความไวทางห้องปฏิบัติการมายืนยัน 2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
Imipramine hydrochloride	tab	ก	4.3. Antidepressant drugs	-
Inactivated JE vaccine				ดู Japanese encephalitis vaccine, inactivated
Inactivated polio vaccine	inj	จ(1)	14. Immunological products and vaccine	เงื่อนไข : ใช้สำหรับโครงการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย ตามนโยบายจากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอในระดับโลก พ.ศ. 2559-2563 ของกรมควบคุมโรค โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
Indinavir sulfate	cap	จ(1)	5.3.2. Antiretrovirals	-
Indomethacin	cap	ก	10.1.1. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)	-
Indomethacin sodium	sterile pwdr	ง	7.1.1. Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics	ยากำพรั้ง เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยเด็กเพื่อปิด patent ductus arteriosus
Influenza vaccine ชนิด pandemic Influenza สายพันธุ์ตามท้องศักราชอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		ก	14. Immunological products and vaccines	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่นๆ (conditions/ others)
Influenza vaccine ชนิด วัดชิ้นรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) ตามที่องค์การ อนามัยโลกกำหนดใน แต่ละปี		ก	14. Immunological products and vaccines	เงื่อนไข : 1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี บำบัดและเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 5. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 6. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 7. โรคออสติซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่มีอาการ) 8. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
Insulin aspart	sterile sol	ง	6.1.1. Insulins	เงื่อนไข : 1. ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เกิด hypoglycemia บ่อยเมื่อใช้ conventional insulin 2. ใช้สำหรับควบคุมภาวะ postprandial hyperglycemia
Insulin aspart + insulin aspart protamine	sterile susp (เฉพาะ 30% + 70%)	ง	6.1.1. Insulins	เงื่อนไข : เช่นเดียวกับ Insulin aspart
Insulin glargine	sterile sol	ง	6.1.1. Insulins	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ใช้ multiple daily insulin injections สูตรที่ฉีด NPH insulin ก่อนนอน แล้วมีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดอย่างรุนแรง หรือ น้ำตาลต่ำในเลือดช่วงกลางคืน (nocturnal hypoglycemia) บ่อยครั้ง จนรบกวนการดำเนินชีวิตตามปกติ คำแนะนำ : ผู้ป่วยควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วย ตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การใช้ยา insulin glargine เกิดประโยชน์สูงสุด หมายเหตุ : multiple daily insulin injections หมายถึง การฉีดอินซูลินวันละหลายครั้งตามมื้ออาหารและ ก่อนนอน
Insulin lispro	sterile sol	ง	6.1.1 Insulins	เงื่อนไข : 1. ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เกิด hypoglycemia บ่อยเมื่อใช้ conventional insulin 2. ใช้สำหรับควบคุมภาวะ postprandial hyperglycemia
Insulin lispro+insulin lispro protamine	sterile susp (เฉพาะ 25%+75%)	ง	6.1.1 Insulins	เงื่อนไข: เช่นเดียวกับ Insulin lispro
Intermittent peritoneal dialysis	sterile sol	ก	9.2. Fluids and electrolytes	-
Iodine in alcohol				ดู Tincture of iodine
Iodine Paint, compound	sol (hosp)	ก	12.3.1. Drugs used in treatment of oral ulcer	-
Iodoform (in ether)	sol (hosp)	ข	12.3.1. Drugs used in treatment of oral ulcer	-
Iopamidol	sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)	ง	17.1 Water soluble iodinated contrast	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ intravascular เช่น intravenous pyelography หรือ excretory urography, การตรวจทาง ด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT), การตรวจ angiography, การตรวจและรักษาทาง interventional radiology เป็นต้น 2. ใช้สำหรับ intracavitary เช่น hysterosalpingography (HSG), urethrography, voiding cystourethrography เป็นต้น 3. ใช้สำหรับ myelography

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				หมายเหตุ :ยาฉีด Iopamidol ความแรง 300 mg/ml as iodine ขนาด 50 ml มีราคาต่ำสุดที่ต่อรังไดโวแอล 363.80บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 100 ml มีราคาต่ำสุดที่ต่อรังไดโวแอลละ 727.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/
	sterile sol (เฉพาะ 370 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)		17.1 Water soluble iodinated contrast	เงื่อนไข :ใช้สำหรับ intravascular เพื่อตรวจ cardiovascular system และกรณีสงสัย hypervascular tumor
				หมายเหตุ :ยาฉีด Iopamidol ความแรง 370 mg/ml as iodine ขนาด 50 ml มีราคาต่ำสุดที่ต่อรังไดโวแอลละ 428.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 100 ml มีราคาต่ำสุดที่ต่อรังไดโวแอลละ 802.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/
Iopromide	sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)		17.1 Water soluble iodinated contrast	เงื่อนไข :เช่นเดียวกับ Iopamidol รูปแบบ sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL) ยกเว้นใช้สำหรับ myelography
				หมายเหตุ :ราคายาฉีด Iopromide ความแรง 300 mg/ml as iodine ขนาด 50 ml ที่ต่อรังไดโวแอลละไม่เกิน 347.75บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 100 ml ที่ต่อรังไดโวแอลละไม่เกิน 695.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/
	sterile sol (เฉพาะ 370 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)		17.1 Water soluble iodinated contrast	เงื่อนไข :เช่นเดียวกับ Iopamidol รูปแบบ sterile sol (เฉพาะ 370 mg/ml as iodine) (50 mL, 100 mL)
				หมายเหตุ :ราคายาฉีด Iopromide ความแรง 370 mg/ml as iodine ขนาด 50 ml ที่ต่อรังไดโวแอลละไม่เกิน 369.15บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 100 ml ที่ต่อรังไดโวแอลละไม่เกิน 738.30 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/
Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide	MDI, sol for nebulizer	ก	3.1.2. Compound antimuscarinic bronchodilators	-
IPV				ดู Inactivated polio vaccine
Iron (III) hydroxide polymaltose complex	syr	ข	9.5 Minerals	เงื่อนไข : ใช้ในกรณีที่ใช้ ferrous sulfate oral solution หรือ drop แล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์
Iron polymaltose complex				ดู Iron (III) hydroxide polymaltose complex
Iron sucrose	sterile sol	ค	9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias	เงื่อนไข : ใช้สำหรับรักษา iron deficiency anemia ในผู้ป่วย chronic kidney disease ที่ไม่ตอบสนองต่อ iron supplement ชนิดรับประทาน
Isoflurane	inhalation vapour liquid	ค	15.1.2. Inhalational anesthetics	-
Isoniazid	tab	ก	5.1.9. Antituberculous drugs	-
Isoniazid + Rifampicin	cap/tab (เฉพาะ 100 + 150 mg และ 150 + 300 mg)	ข	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข : ใช้เป็นยาควบคุมในการรักษาวัณโรคในระยะ maintenance

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Isoniazid + Rifampicin	oral form (for pediatric use)	ข	5.1.9. Antituberculous drugs	ยากำพรั
Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide	tab (เฉพาะ 75 + 150 + 400 mg)	ข	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข : ใช้เป็นยารวมในการรักษากวัณโรคในระยะ initial และ maintenance
Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide + Ethambutol hydrochloride	tab (เฉพาะ 75 + 150 + 400 + 275 mg)	ข	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข : ใช้เป็นยารวมในการรักษากวัณโรคในระยะ initial
Isophane insulin	sterile susp	ก	6.1.1. Insulins	-
Isoprenaline hydrochloride	sterile sol	ก	2.7.1. Inotropic sympathomimetics	-
Isoproterenol hydrochloride				ดู Isoprenaline hydrochloride
Isosorbide dinitrate	tab, sublingual tab	ก	2.6.1. Nitrates	-
Isosorbide mononitrate	tab	ก	2.6.1. Nitrates	-
Ispaghula Husk	powder for oral suspension, granules for oral suspension	ก	1.6. Laxatives	-
Itraconazole	cap	ค	5.2. Antifungal drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับโรคติดเชื้อ Penicilosis mamefeei, cryptococcosis, vaginal candidiasis และ dermatomycoses
	oral sol	ง	5.2. Antifungal drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้กับผู้ป่วยที่รับประทานยาแคปซูลไม่ได้ 2. เป็นยาแทน (alternative drug) สำหรับ invasive fungal infection
Ivermectin	tab	ข	5.5. Anthelmintics	ยากำพรั เงื่อนไข : รักษาการติดเชื้อพยาธิตรองจิลอยด์ (strongyloidiasis) ชนิดแพร่กระจาย
			13.1.3. Parasitocidal preparations	เงื่อนไข : ใช้สำหรับรักษาหิดที่เข้ายาไม่ได้หรือไม่ได้ผล
	sterile sol	ง	5.5 Anthelmintics	ยากำพรั เงื่อนไข : ใช้รักษาการติดเชื้อพยาธิตรองจิลอยด์ (strongyloidiasis) ชนิดแพร่กระจายในผู้ที่กินยาไม่ได้
IVIG				ดู Human normal immunoglobulin, intravenous
Japanese encephalitis vaccine, inactivated	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	หมายเหตุ : ใช้สำหรับผู้ที่มีข้อห้ามใช้ live attenuated Japanese encephalitis vaccine
Japanese encephalitis vaccine, live attenuated	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Joullie's solution				ดู Oral acidic phosphate solution
Kanamycin sulfate	sterile pwdr	ค	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข : ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug
Ketamine hydrochloride	sterile sol	ง	15.1.1. Intravenous anesthetics	วัตถุประสงค์เพื่อฉีดและประสาทประเภท 2
				เงื่อนไข : 1. ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับผู้ป่วยที่หาลิ้นเลือดสำหรับให้น้ำเกลือไม่ได้ 2. ใช้ในกรณีผู้ป่วยมีความดันเลือดต่ำ 3. ใช้ในการระงับความรู้สึกสำหรับกรทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ 4. ใช้เป็นยาเสริม (adjunct therapy) เพื่อระงับอาการปวดรุนแรง (intractable pain)
Ketoconazole	cream	ก	13.1.2. Antifungal preparations	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่นๆ (conditions/ others)
	tab	ง	6.7.3 Drugs used in endogenous glucocorticoid and androgen overproduction 8.3.2 Prostate cancer	เงื่อนไข :1. ใช้สำหรับ Cushing's syndrome ที่รอกการผ่าตัด หรือไม่ตอบสนองต่อการผ่าตัด และ/หรือ การฉายแสง 2. ใช้สำหรับรักษาภาวะ androgen overproduction ในกรณี testotoxicosis หมายเหตุ : สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากชนิด castration resistance ดูข้อ 8.3.2 Prostate cancer ใช้สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากชนิด castration resistanceหมายเหตุ : สำหรับ Cushing's syndrome ที่รอกการผ่าตัด หรือไม่ตอบสนองต่อการผ่าตัด และ/หรือ การฉายแสง และสำหรับรักษาภาวะ overproduction ของ androgen ในกรณี testotoxicosis ดูข้อ 6.7.3 Drugs used in endogenous glucocorticoid and androgen overproduction
Labetalol hydrochloride	sterile sol	ค	2.4. Beta-adrenoceptor blocking drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ hypertensive emergencies
Lactic acid	cream (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 10% w/w)	ก	13.6 Preparations for warts and calluses	-
Lactulose	syr	ข	1.6. Laxatives	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ hepatic encephalopathy 2. ใช้สำหรับ chronic constipation ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี 3. ใช้เป็นทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าระยะบายน้อยไม่ได้ 4. ใช้เป็นทางเลือกในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ magnesium
Lamivudine	tab (เฉพาะ 100, 150 mg)	ง	5.3.3. Viral hepatitis	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (chronic hepatitis B) ที่มี HBeAg positive หรือ negative โดยต้องมีระดับ Alanine aminotransferase (ALT) สูงกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่าของค่าปกติ และมี HBV DNA มากกว่า 10,000 copies/ml (หรือ 2,000 IU/ml) 2. ในกรณีมีระดับ Alanine aminotransferase (ALT) น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าปกติ ต้องมีผล liver histology ที่แสดงว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มี HAI score มากกว่าหรือเท่ากับ 4 หรือ fibrosis มากกว่าหรือเท่ากับ 2 3. ใช้สำหรับ compensated หรือ decompensated cirrhosis ที่ตรวจพบ HBV DNA 4. ใช้กับผู้ป่วย HBeAg positive ที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกัน คำแนะนำ : 1. ให้ตรวจ HIV serology negative 2 ครั้ง ห่างกัน 1เดือนก่อนเริ่มการรักษา ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (ผู้ป่วยที่มีภาวะตับ วาย: hepatic decompensation) ให้มีผล HIV serology negative ในครั้งแรก 2. ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจ anti-HIV อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะนำให้รักษา ร่วมโดยแพทย์สาขาโรคติดเชื้อและแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร หมายเหตุ : ระดับ ALT ที่ผิดปกติต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่น ๆ ที่ทำให้ ALT สูงกว่าปกติ เช่น fatty liver, drug-induced hepatitis, autoimmune hepatitis
	tab	ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
Lamivudine + Stavudine + Nevirapine	tab (เฉพาะ 150 + 30 + 200 mg)	ข	5.3.2. Antiretrovirals	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่นๆ (conditions/ others)	
Lamotrigine	tab (เฉพาะ 25, 50, 100 mg)	ค	4.2.2. Antimanic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ rapid cycling mood disorder หรือ recurrent mood disorder ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น 2. ใช้ในกรณีป้องกัน depression ใน Bipolar disorder ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น	
			ง	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	เงื่อนไข : ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทกับผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล
Latanoprost	eye drop (เฉพาะ 0.005% w/v)	ค	11.4 Drugs for treatment of glaucoma	เงื่อนไข: 1. ใช้รักษาต้อหินในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers หรือ 2. ใช้เฉพาะกรณีที่ใช้ยารักษาต้อหินชนิดอื่น แล้วความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย	
Lauromacrogol 400	sterile sol	ง	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding	เงื่อนไข : 1. ใช้ช่วยห้าม variceal bleeding ผ่านทาง endoscopy และใช้สำหรับ sclerotherapy 2. ใช้สำหรับ varicose vein และ hemorrhoid	
LD-PPC				ดู Leukocyte depleted pooled platelets concentrate, random donor	
Lenograstim	sterile pwdr	ง	9.1.3. Drugs used in bone marrow transplantation	เงื่อนไข : เช่นเดียวกับ filgrastim	
Leflunomide	tab (เฉพาะ 20mg)	ง	10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)	เงื่อนไข: 1. ใช้เป็นยาเสริม(add on) สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีโรคกำเริบ(Disease activity score 28 เท่ากับหรือมากกว่า 2.6 ขึ้นไป) หลังได้รับการรักษาด้วย methotrexate ร่วมกับ sulfasalazine หรือ ยาด้านมาลาเรีย (chloroquine / hydrochloroquine) ในขนาดเต็มทีอย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกันแล้วไม่ตอบสนอง 2. ใช้โดยอายุรแพทย์โรคข้อเข่า	
Lercanidipine hydrochloride	tab (เฉพาะ 20 mg)	ข	2.6.2. Calcium-channel blockers	เงื่อนไข : ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา Amlodipine ไม่ได้ หมายเหตุ : ราคา ยา Lercanidipine hydrochloride รูปแบบ tablet ขนาด 20 mg ที่ต่อซองได้ราคาเม็ดละ 2.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 13 เมษายน 2559) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ www.nlem.in.th	
Letrozole	tab (เฉพาะ 2.5 mg)	จ(2)	8.3.1. Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors	เงื่อนไข : ใช้สำหรับมะเร็งเต้านมที่มี hormone receptor เป็นบวก โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3	
Leucovorin calcium				ดู Calcium folinate	
Leukocyte depleted platelets concentrate		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-	
Leukocyte depleted platelets concentrate, single donor		ข	9.1.1. Whole blood and blood products	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่มีกลุ่มเลือดหายาก Rh- หรือ มีความจำเป็นต้องใช้เลือดเร่งด่วนแต่ขาดเลือดเท่านั้น	
Leukocyte depleted pooled platelets concentrate, random donor		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-	
Leuprorelin acetate	sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 mg)	จ(2)	6.7.2. Drugs affecting gonadotrophins	เงื่อนไข : ใช้สำหรับภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยา เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3	

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
	sterile powder (เฉพาะ 11.25, 22.5 mg)	ง	8.3.2 Prostate cancer	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (2 cycles) ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (8 cycles) <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Intermediate risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT2b ถึง cT2c ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 7 หรือมีค่า serum PSA เท่ากับ 10-20 ng/mL อย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (High risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3a ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 8-10 หรือมีค่า serum SPA มากกว่า 20 ng/mL อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงมาก (Very High risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3b ถึง cT4
Levetiracetam	tab (เฉพาะ 250 และ 500 mg), oral sol	ง	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	<ol style="list-style-type: none"> ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท* ชนิดน้ำใช้ในผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้
	concentrate for solution for infusion	ง	4.8.2. Drugs used in status epilepticus	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ไม่ใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษาต่อเนื่อง ยกเว้นมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม first generation คือ diazepam, lorazepam, phenytoin sodium, phenobarbital sodium และ sodium valproate สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา สาขากุมารเวชศาสตร์ และประสาทศัลยศาสตร์เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) อนุญาตให้อาานแพทย์ และกุมารแพทย์รักษาได้
Levodopa + Benserazide as hydrochloride	cap/tab (200 + 50 mg)	ก	4.9. Drugs used in movement disorders	-
	CR cap/dispersible tab (100 + 25 mg)	ข	4.9. Drugs used in movement disorders	-
Levodopa + Carbidopa as monohydrate	tab (100 + 25 mg, 250 + 25 mg)	ก	4.9. Drugs used in movement disorders	-
Levofloxacin hemihydrate	sterile sol	ง	5.1.6. Quinolones	<p>เงื่อนไข : ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น ใช้รักษาแบบผู้ป่วยใน ในกรณี moderate to severe community-acquired pneumonia และ lower respiratory tract infection ที่สงสัย Drug-Resistant S. pneumoniae (DRSP) หรือ pathogen ที่ทำให้เกิด atypical pneumonia</p> <p>หมายเหตุ : จัดเป็นบัญชี ง เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy ดูข้อ 5.1.9 Antituberculous drugs</p>
	tab (เฉพาะ 500 mg)	ง		<p>เงื่อนไข : ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น ใช้รักษาแบบผู้ป่วยนอก ในกรณี moderate to severe community-acquired</p>

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่นๆ (conditions/ others)
				pneumonia และ lower respiratory tract infection ที่สงสัย Drug-Resistant S. pneumoniae (DRSP) หรือ pathogen ที่ทำให้เกิด atypical pneumonia ที่ใช้ macrolide ไม่ได้หรือไม่ได้ผล หรือใช้ต่อเนื่องจากยาชนิด (sequential therapy) หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วย community-acquired pneumonia (CAP) ที่มี comorbidities หรือเคยใช้ยาปฏิชีวนะในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา แนะนำให้ใช้ levofloxacin ในขนาด 750 mg วันละครั้ง อย่างน้อย 5 วัน หรือในขนาด 500 mg วันละครั้ง อย่างน้อย 7 วัน 2. จัดเป็นบัญชี ง เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy ดูข้อ 5.1.9 Antituberculous drugs
	tab (เฉพาะ 500 mg), sterile sol	ง	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข : ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy หรือใช้รักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถใช้อีกกลุ่ม first-line ได้ หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 5.1.6 Quinolones
Levonorgestrel	tab (เฉพาะ 750 mcg), implant 2 rods (75 mg/rod)	ก	7.3. Contraceptives	เงื่อนไข : Levonorgestrel รูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับคุมกำเนิดกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
Levothyroxine sodium	tab	ก	6.2.1. Thyroid hormones	-
Lidocaine + Prilocaine	cream	ก	15.2. Local anesthesia	-
Lidocaine hydrochloride	gel, oint, spray, sterile sol (dental cartridge), sterile sol (local infiltration), viscous sol	ก	15.2. Local anesthesia	-
Lidocaine hydrochloride (preservative free)	sterile sol (เฉพาะ 1%,2%)/ sterile sol (hosp)	ก	2.3. Anti-arrhythmic drugs	ยากำพรัว เงื่อนไข : ใช้สำหรับ ventricular arrhythmias
Lidocaine hydrochloride + Epiheprine	sterile sol sterile sol (local infiltration), sterile sol (dental cartridge)	ค ก	15.2. Local anesthesia 15.2. Local anesthesia	หมายเหตุ : ใช้ในกรณี regional anesthesia -
Linezolid	tab	จ(2) จ(1)	5.1.7. Some other antibacterials 5.1.9 antituberculosis drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับโรคติดเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 เงื่อนไข : ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคคือยา โดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
Liothyronine sodium	tab	ง	6.2.1. Thyroid hormones	ยากำพรัว เงื่อนไข : ใช้แทน levothyroxine sodium ชั่วคราวระหว่างรอทำ total body scan ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์
Liposomal amphotericin B	sterile pwdr	จ(2)	5.2. Antifungal drugs	เงื่อนไข : ใช้รักษา invasive fungal infections (ยกเว้น aspergillosis) ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยา conventional amphotericin B โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Lisinopril	tab	ค	2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ post myocardial infarction
Lithium carbonate	cap, tab	ก	4.2.2. Antimanic drugs	-
Live Attenuated JE vaccine				ดู Japanese encephalitis vaccine, live attenuated
Local anesthetic + Corticosteroid with/ without astringent	cream, oint, rectal supp	ข	1.7. Local preparations for anal and rectal disorders	เงื่อนไข : 1. หนึ่งในรูปแบบให้เลือก 1 สูตร 2. ใช้ไม่เกิน 7 วัน

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Iodine in alcohol				ดู Tincture of iodine
Loperamide hydrochloride	cap, tab	ข	1.4. Drugs used in acute diarrhea	เงื่อนไข : ห้ามใช้กับเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี
Lopinavir + Ritonavir	tab, oral sol	ค	5.3.2. Antiretrovirals	-
Loratadine	tab, syr	ก	3.4. Antihistamines	-
Lorazepam	tab	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
	Inj	ก	4.8.2. Drugs used in status epilepticus	ยากำพรั้ว วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Losartan potassium	tab (เฉพาะ 50, 100 mg)	ข	2.5.5. Angiotensin-II receptor antagonists	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors ไม่ได้ เนื่องจากเกิดการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว
LPV+RTV				ดู Lopinavir + Ritonavir
L-thyroxine sodium				ดู Levothyroxine sodium
Lugol 's solution	oral sol (hosp)	ก	6.2.2. Antithyroid drugs	-
Lynestrenol	tab (เฉพาะ 0.5 mg)	ข	7.3. Contraceptives	-
Lyophilized cryoprecipitate		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Macrogols with electrolytes	oral powdr (hosp)	ค	1.6. Laxatives	เงื่อนไข : ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ใหญ่ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้ หมายเหตุ : ไม่ใช่เป็นยาระบายหรือยาคาย
	oral powdr, oral powdr (hosp)	ก	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้ทำหัตถการล้างกระเพาะและลำไส้ (whole bowel irrigation) กรณีได้รับสารพิษ หรือล้างผิวหนังกรณีสัมผัส phenol
Magnesium hydroxide	tab, susp, susp (hosp)	ก	1.6. Laxatives	-
	tab, susp, susp (hosp)	ก	9.5. Minerals	-
Magnesium sulfate	mixt, mixt (hosp), sol, sol (hosp)	ก	1.6. Laxatives	-
	sterile sol	ก	2.3. Anti-arrhythmic drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ refractory ventricular tachycardia
			4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	-
	sterile sol, oral sol, oral sol(hosp)	ก	9.5. Minerals	-
Manidipine hydrochloride	tab (เฉพาะ 20 mg)	ข	2.6.2. Calcium-channel blockers	เงื่อนไข : ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา Amlodipine ไม่ได้ หมายเหตุ : ราคายา Manidipine hydrochloride รูปแบบ tablet ขนาด 20 mg ที่ต่อรองได้ราคาเม็ดละ 2.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 13 เมษายน 2559) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนออยู่ในเว็บไซต์ www.nlem.in.th
Mannitol	sterile sol	ก	2.2. Diuretics	-
MDP				ดู Tc-99m methylene diphosphonate
Measles-Mumps-Rubella vaccine	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Mebendazole	tab, susp, susp (hosp)	ก	5.5. Anthelmintics	-
Mebeverine hydrochloride	tab	ข	1.2. Antispasmodics and other drugs altering gut motility	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Medroxyprogesterone acetate	sterile susp	ก	7.3. Contraceptives	-
	tab (เฉพาะ 2.5 , 5 และ 10 mg)	ก	6.4.1. Female sex hormones	-
Mefloquine hydrochloride	tab	ค	5.4.1. Antimalarials	-
Megestrol acetate	tab	ง	8.3.1. Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ advanced breast cancer ที่มีผลการตรวจ hormone receptor เป็นบวก 2. ใช้สำหรับ advanced endometrial cancer (endometrioid) โดยให้ยานี้รวมทั้งมีการกำเริบของโรค 3. ใช้สำหรับ early stage endometrial cancer ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี ที่เป็น well-differentiated endometrioid ซึ่งผลการตรวจ MRI ไม่พบ myometrial invasion และให้ยาไม่เกิน 1 ปี 4. ใช้สำหรับ low grade endometrial stromal sarcoma (ESS) และให้ยาไม่เกิน 1 ปี
Meglumine gadoterate	sterile sol (เฉพาะ 377 mg/mL)(10 mL, 15 mL) for intravascular intraarticular	ง	17.3 Magnetic resonance contrast media	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ Magnetic resonance imaging (MRI) คำเตือน: ควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มี Estimated glomerular filtration rate (eGFR) ต่ำกว่า 30 mL/min/1.73 m ² หมายเหตุ : ราคาขายจัด Meglumine gadoterate ความแรง 377 mg/ml ขนาด 10 ml ที่ต่อรังไข่ได้แอลละไม่เกิน 684.80 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 15 ml ที่ต่อรังไข่ได้แอลละไม่เกิน 984.40 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/
Melphalan	tab	ค	8.1.1. Alkylating drugs	-
Menthol + Phenol + Camphor	ทุก topical dosage form (hosp)	ก	13.3. Topical antipruritics	-
Mepivacaine hydrochloride	sterile sol (dental cartridge)	ก	15.2. Local anesthesia	-
Mepivacaine hydrochloride + Epinephrine	sterile sol (dental cartridge)	ก	15.2. Local anesthesia	-
Mercaptopurine	tab	ค	8.1.3. Antimetabolites	-
Meropenem	sterile pwdr	ง	5.1.2. Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams	เงื่อนไข : เช่นเดียวกับ Imipenem+Cilastatin sodium
Mesalamine				ดู Mesalazine
Mesalazine	EC tab, SR tab, enema, rectal supp	ค	1.5. Drugs used in chronic bowel disorders	เงื่อนไข : 1. ชนิดเม็ด ใช้เป็นทางเลือกของ sulfasalazine ในกรณีผู้ป่วยแพ้ยากลุ่มซัลฟา หรือต้องการลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 2. ชนิดเหน็บทวารหนัก (suppository) ใช้สำหรับ mild to moderate ulcerative proctitis และ radiation proctitis 3. ชนิดสวนทวารหนัก (enema) ใช้สำหรับ mild to moderate ulcerative colitis บริเวณ left-sided colon
Mesna	sterile sol	ง	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยที่ได้รับยา ifosfamide หรือ cyclophosphamide ขนาดสูง (มากกว่า 1.5 g/m ²) เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ
Metformin hydrochloride	tab	ก	6.1.2. Oral antidiabetic drugs	-
Methadone hydrochloride	oral sol	ง	4.10.3. Drugs used in opioid dependence	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เงื่อนไข : ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเฮโรอีน
	tab, oral sol	ค	4.7.1. Opioid analgesics	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Methimazole				ดู Thiamazole
Methotrexate	tab (as base or sodium)	ข	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	เงื่อนไข : ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรง ที่ติดต่อยาอื่น
	tab (as base or sodium), sterile pwdr/sterile sol (as sodium)	ค	8.1.3. Antimetabolites 10.1.2. Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)	- คำเตือนและข้อควรระวัง : การใช้ยาอาจเกิดการกดไขกระดูกและเป็นพิษต่อตับ ควรตรวจค่า complete blood count (CBC) และ SGPT ทุก 3-6 เดือน ระหว่างการใช้ยา
Methoxsalen	tab, cream (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 0.1% w/w), topical sol (paint), topical sol (paint) (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 0.1% w/w)	ค	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	ยากำพร้า
Methyl salicylate cream compound	cream, cream (hosp)	ก	10.3.1. Rubifacients	-
Methyl salicylate ointment compound	oint, oint (hosp)	ก	10.3.1. Rubifacients	-
Methyldopa	tab	ก	2.5.2. Centrally acting antihypertensive drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับรักษาความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์
Methylene blue	sterile sol, sterile sol (hosp)	ง	16. Antidotes	ยากำพร้า เงื่อนไข : ใช้บำบัด methemoglobinaemia คำเตือนและข้อควรระวัง : ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยภาวะการทำงานของไตบกพร่องขั้นรุนแรง และในผู้ป่วยขาดเอนไซม์ G6PD
Methylergometrine maleate	sterile sol	ก	7.1.1. Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics	-
Methylphenidate	tab (เฉพาะ 10 mg)	ค	4.4. Central nervous system stimulants	ยากำพร้า เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 2. ใช้สำหรับ narcolepsy
Methylprednisolone	sterile pwdr/sterile susp (as hemisuccinate or sodium succinate or acetate)	ค	6.3. Corticosteroids	-
Methylthionium chloride				ดู Methylene blue
Metoclopramide	tab, syr, sterile sol	ก	1.2. Antispasmodics and other drugs altering gut motility	-
			4.5.1. Drugs used in nausea and vomiting	-
Metoprolol tartrate	immediate release tab	ก	2.4. Beta-adrenergic blocking drugs	-
Metronidazole	cap/tab (as base), susp (as benzoate), sterile sol (as base)	ก	5.1.7. Some other antibacterials	-
			5.4.2. Other antiprotozoal drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis
Mianserin hydrochloride	tab	ข	4.3. Antidepressant drugs	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่นๆ (conditions/ others)
Micafungin sodium	sterile pwdr (เฉพาะ 50mg)	จ(2)	5.2 Antifungal drugs	เงื่อนไข : ใช้รักษา Invasive candidiasis ที่ต้องต่อยา fluconazole หรือไม่สามารถใช้ conventional amphotericin B ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Miconazole nitrate	oral gel	ก	12.3.2. Oropharyngeal antifungal drugs	-
Midazolam hydrochloride	sterile sol	ง	4.8.2. Drugs used in status epilepticus	วัตถุประสงค์ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ refractory status epilepticus 2. สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา สาขากุมารประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ เท่านั้นในกรณีที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) อนุญาตให้อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์รักษาได้
			15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	วัตถุประสงค์ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เงื่อนไข : 1. ใช้เตรียมาระดับความรู้สึก 2. ใช้เพื่อให้อายุรแพทย์ คลายความวิตกกังวล ทั้งในระยะก่อน ระหว่างและหลังทำหัตถการ 3. ใช้ระงับชัก
Midazolam maleate	tab	ง	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	วัตถุประสงค์ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เงื่อนไข : 1. ใช้เตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (premedication) เท่านั้น
Midodrine Hydrochloride	tab	ค	2.7.2. Vasoconstrictor sympathomimetics	ยากำพรั้า เงื่อนไข : ใช้สำหรับ ลดอาการ orthostatic hypotension ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
Milrinone lactate	sterile sol	ง	2.1. Positive inotropic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้เพิ่มการบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจ 2. ใช้ทดแทนหรือเสริม dopamine หรือ dobutamine ใน advanced heart failure 3. ใช้เพื่อเพิ่มการบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วย advanced heart failure ที่เคยใช้ beta blocker มาก่อน
Mineral oil	oil (hosp)	ก	13.2. Emollient and barrier preparations	-
Misoprostol+Mifepristone ชนิด combination pack)	tab (200mcg+200mg)	จ(1)	7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics	เงื่อนไข : ใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุทางการแพทย์ ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ โดยใช้เป็นยาตามโครงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพของกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่ กรมอนามัยกำหนด
Mist Carminative				ดู Compound Cardamom Mixture เฉพาะสูตรที่ไม่มี sodium bicarbonate
Mitomycin	sterile pwdr, sterile sol	ง	8.1.2. Cytotoxic antibiotics	เงื่อนไข : 1. ใช้เป็น alternative drug ของ BCG สำหรับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิด superficial bladder cancer 2. ใช้รักษามะเร็งตับ โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดแดงเฉพาะที่ 3. ใช้รักษามะเร็งทวารหนัก (anal canal) โดยใช้ร่วมกับวิธีรักษาในการทำ transcatheter oily chemo embolization (TOCE)

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Mitotane ยากำพรั้า	tab (เฉพาะ 500mg)	ง	8.1.5 Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ adrenocortical carcinoma ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ 2. ใช้สำหรับ adrenocortical carcinoma ระยะแพร่กระจาย
Mitoxantrone hydrochloride	sterile powder, sterile sol	ง	8.1.2. Cytotoxic antibiotics	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ acute myeloid leukemia และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 2. ใช้สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาฮอร์โมน
MMR				ดู Measles-Mumps-Rubella vaccine
Mometasone furoate	cream	ง	13.4. Topical corticosteroids	เงื่อนไข : ใช้กรณีต้องให้ยาเป็นเวลานาน
Montelukast sodium	chewable tab (เฉพาะ 5 mg), film coated tab (เฉพาะ 10 mg), oral granules (เฉพาะ 4 mg)	ค	3.3. Leukotriene receptor antagonists	เงื่อนไข : ใช้ยานิด oral granules กับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี คำเตือนและข้อควรระวัง : ควรติดตามอาการไม่พึงประสงค์ทาง neuropsychiatric จากการให้ยาอย่างต่อเนื่อง
Morphine sulfate	cap, tab, SR cap, SR tab, oral sol, sterile sol	ค	4.7.1. Opioid analgesics	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	sterile sol	ค	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
Moxifloxacin hydrochloride	tab	จ(1)	5.1.9 antituberculosis drug	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคคือยาโดยมีวิธีการให้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
Multiple trace mineral solution	sterile sol	ค	9.4. Intravenous nutrition	-
Multivitamin injection	preparation for intravenous use (sterile sol)	ค	9.4. Intravenous nutrition	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) และได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
Multivitamins	cap, tab	ก	9.3. Vitamins	หมายเหตุ : มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่
	drop	ก	9.3. Vitamins	หมายเหตุ : มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในทารกอายุ 6 - 11 เดือน
	syr	ก	9.3. Vitamins	หมายเหตุ : มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 1 - 3 ขวบ
Mupirocin	oint	ข	13.1.1. Antibacterial preparations	เงื่อนไข : จำกัดการใช้เฉพาะ Methicillin-resistant S.aureus (MRSA)
	dry syr	ก	9.3. Vitamins	หมายเหตุ : มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 1 - 8 ปี
Mycophenolate mofetil	cap, tab	ง	8.2. Drugs affecting the immune response	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายตับในระยะ maintenance therapy 2. กรณีผู้ป่วยไม่มีเงื่อนไข คือ 2.1 ใช้เป็น alternative drug ในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในระยะ maintenance therapy 2.2 ใช้เป็น alternative drug ในกรณีผู้ป่วย severe lupus nephritis (class III-IV) ในกรณีดังนี้

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				<p>2.2.1 ระยะ induction therapy* ในกรณีดังนี้</p> <p>2.2.1.1 กรณีที่ใช้ intravenous cyclophosphamide (IVCY) อย่างน้อย 6 เดือนแล้วไม่ได้ผล และไม่สามารถทำให้เกิด remission** ได้ หรือ</p> <p>2.2.1.2 กรณีที่เคยได้รับ Intravenous cyclophosphamide (IVCY) ครบ 1 course แล้ว และมี active lupus nephritis ซ้ำอีก หรือ</p> <p>2.2.1.3 กรณีผู้ป่วยไม่สามารถรับ Intravenous cyclophosphamide (IVCY) ได้</p> <p>2.2.2 ในระยะ maintenance therapy ที่ใช้ Azathioprine ไม่ได้หรือใช้แล้วไม่ได้ผล</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>1.*ระยะ induction therapy ควรทำ kidney biopsy เพื่อยืนยันการวินิจฉัย</p> <p>2.**remission ของ severe lupus nephritis (class III-IV) หมายถึงการมีระดับ serum creatinine ลดลงและมีปริมาณโปรตีนในปัสสาวะน้อยกว่า 1 กรัมต่อวันร่วมกับไม่มีอาการกำเริบออกไต</p>
N-acetylcysteine				ดู Acetylcysteine
Nalbuphine hydrochloride	sterile sol	ค	4.7.1. Opioid analgesics	-
Naloxone hydrochloride	sterile sol	ก	16. Antidotes	<p>เงื่อนไข :</p> <p>1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids และ clonidine</p> <p>2. ใช้บำบัดภาวะกดการหายใจที่ไม่ทราบสาเหตุ</p>
Naproxen	compressed tab (as base)	ก	10.1.1. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)	-
Natamycin	eye susp	ง	11.1.3. Antifungals	เงื่อนไข : ใช้สำหรับการติดเชื้อราที่แผลกระจกตา
Neftinavir mesilate	tab, dry syr	จ(1)	5.3.2. Antiretrovirals	-
Neomycin sulfate	tab	ก	5.1.4. Aminoglycosides	หมายเหตุ : ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดลำไส้ใหญ่แบบไม่ฉุกเฉิน
Neostigmine methylsulfate	sterile sol	ก	15.1.5. Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia	เงื่อนไข : ใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ
		ข	10.2.1. Drugs which enhance neuromuscular transmission	-
Netilmicin sulfate	sterile sol	ง	5.1.4. Aminoglycosides	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อต่อยา gentamicin และ amikacin ซึ่งต้องมีผลการทดสอบความไวทางห้องปฏิบัติการมายืนยัน
Neutral insulin; insulin injection				ดู Soluble insulin
Nevirapine	tab, susp	ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
Nicardipine hydrochloride	sterile sol	ค	2.6.2. Calcium-channel blockers	<p>เงื่อนไข :</p> <p>1. ใช้กับผู้ป่วย hypertensive emergencies ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ</p> <p>2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา sodium nitroprusside หรือ glyceryl trinitrate (nitroglycerin) ได้</p>
Nicosamide	tab	ก	5.5. Anthelmintics	-
Nicotinic acid	immediate release tab	ก	2.12. Lipid-regulating drugs	-

* ในช่องเงื่อนไข/ อื่น ๆ ที่ระบุไว้ [ดูเพิ่ม] ให้ดูที่หมวดรายละเอียดของยา จัดเรียงตามชื่อยา A-Z หน้า A50-A120
 • บัญชี ก ข ค ง จ(1) หรือ จ(2) ดูรายละเอียดของแต่ละบัญชีได้ที่หน้า A15

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Nifedipine	SR cap/SR tab (เฉพาะ 20 mg)	ง	2.6.2. Calcium-channel blockers	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ methyldopa และ hydralazine แล้วไม่ได้ผล 2. ใช้สำหรับ intractable Raynaud's phenomenon
Nilotinib hydrochloride	cap (เฉพาะ 200 mg)	จ(2)	8.1.5. Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข : ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ chronic myeloid leukemia (CML) ที่ไม่สามารถใช้ imatinib ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยา เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Nimodipine	tab, sterile sol	ง	2.6.2. Calcium-channel blockers	เงื่อนไข : ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์สำหรับป้องกันพยาธิสภาพของระบบประสาทที่อาจดำเนินต่อไปจากการหดตัวของหลอดเลือด ภายหลังจากการเกิด subarachnoid hemorrhage
Nitrazepam	tab	ง	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	วัตถุประสงค์ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เงื่อนไข : เงื่อนไข : ใช้สำหรับ epileptic spasms โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
Nitrofurantoin	tab	ข	5.1.7. Some other antibacterials	หมายเหตุ : ใช้รักษาการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าในบัญชี ก (เช่น amoxicillin หรือ cephalixin) ไม่ได้หรือไม่ได้ผล
Noradrenaline				ดู Norepinephrine
Norepinephrine	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ก	2.7.2. Vasoconstrictor sympathomimetics	-
		ง	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้บำบัดภาวะความดันเลือดตกเนื่องจากยา เช่น ยากลุ่ม beta-blockers, calcium channel blockers และ theophylline เป็นต้น
Norethisterone	tab	ก	6.4.1. Female sex hormones	-
Norflaxacin	tab	ก	5.1.6. Quinolones	-
Nortriptyline hydrochloride	tab	ก	4.7.2. Drugs for neuropathic pain	-
			4.3. Antidepressant drugs	-
			4.10.2. Drugs used in smoking cessation	-
NPH: Isophane protamine insulin				ดู Isophane insulin
NVP				ดู Nevirapine
Nystatin	oral susp	ก	5.2. Antifungal drugs	-
			12.3.2. Oropharyngeal antifungal drugs	-
	vaginal tab	ก	7.2. Treatment of vaginal and vulval conditions	-
Octreotide acetate	sterile sol (เฉพาะ 0.1 mg/ 1 ml) ยกเว้นชนิดออกฤทธิ์นาน	ง	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ high output pancreatic fistula 2. ใช้สำหรับ variceal bleeding โดยใช้ร่วมกับ therapeutic endoscopic intervention 3. ใช้ในกรณี bleeding ที่มีหลักฐานว่าเป็นภาวะเลือดออกจาก portal hypertensive gastropathy 4. ใช้สำหรับ neuroendocrine tumors

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
	sterile pwdr (ชนิดออกฤทธิ์นาน เฉพาะ 20 และ 30 mg/vial)	จ(2)	6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones	เงื่อนไข : ใช้ในผู้ป่วย Acromegaly ที่ได้รับการรักษา โดยการผ่าตัดเนื้ออกหรือการฉายแสงแล้ว ระดับ Growth Hormone (GH) และ Insulin-like Growth Factor (IGF) ยังสูงอยู่ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยา เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Ofloxacin	ear drop	ค	12.1.3. Other drugs acting on the ear	เงื่อนไข : ใช้สำหรับน้ำหนักหรือรูปร่างที่แก้วหูทะลุ ที่ใช้ Chloramphenicol ไม่ได้ผล หมายเหตุ : ควรมี guideline ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ยา เพราะ การใช้ยาอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา กลุ่ม quinolones
	tab (เฉพาะ 100, 200 mg)	ข	5.1.6. Quinolones	เงื่อนไข : ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการรักษา โรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ หมายเหตุ : จัดเป็นบัญชี ค เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy ดูข้อ 5.1.9 Antituberculosis drugs
Olanzapine	tab (เฉพาะ 5mg และ 10mg ไม่รวมชนิดเม็ดละลายในปาก)	ง	4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับป้องกันหรือรักษาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัดที่กระตุ้นให้อาเจียนสูง (highly emetogenic) 2. ใช้สำหรับป้องกันหรือรักษาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด กรณี resistance หรือ intractable nausea / vomiting
Olive oil	oil (hosp)	ก	13.2. Emollient and barrier preparations	-
Olopatadine hydrochloride	eye drop (เฉพาะ 0.1%)	ง	11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations	เงื่อนไข : ใช้สำหรับผู้ป่วยเยื่อตาอักเสบเรื้อรัง ที่มีอาการอักเสบเฉียบพลัน ได้แก่ Vernal Keratoconjunctivitis, Giant Papillary Conjunctivitis โดยหลังจากโรคสงบแล้วให้พิจารณาใช้ Sodium cromoglicate เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
Omeprazole	EC cap (as base)	ก	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding	คำแนะนำและข้อควรระวัง : ห้ามให้ทางหลอดเลือดดำ นานเกินกว่า 30 นาที
Omeprazole sodium	sterile pwdr	ข	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding	-
Ondansetron	tab (as base or hydrochloride), sterile sol (hydrochloride)	ข	4.5.1. Drugs used in nausea and vomiting	-
Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound	mixt (hosp)	ก	3.6.1. Cough suppressants	-
OPV				ดู Poliomyelitis vaccine, live attenuated
Oral acidic phosphate solution	oral sol (hosp)	ค	9.5. Minerals	-
Oral neutral phosphate solution	oral sol (hosp)	ค	9.5. Minerals	-
Oral rehydration salts	oral pwdr, oral pwdr (hosp)	ก	1.4. Drugs used in acute diarrhea	คำแนะนำ : การชดเชยสารน้ำและเกลือแร่เป็นเป้าหมายสำคัญในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน การใช้ยาด้านแบคทีเรียในผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นสิ่งไม่จำเป็นและควรหลีกเลี่ยง
ORS				ดู Oral rehydration salts
Oseltamivir phosphate	cap, dry syr	จ(1)	5.3.1. Non-antiretrovirals	เงื่อนไข : ใช้สำหรับกาต้านเนื้องานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศ

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Oxaliplatin	sterile pwdr, sterile sol	ง	8.1.3. Antimetabolites	เงื่อนไข : ใช้เป็น adjuvant therapy ใน stage III colorectal cancer โดยใช้ร่วมกับ 5-FU + leucovorin based- regimen ในคนไข้ที่มี Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status ตั้งแต่ 0 - 1
Oxybutynin hydrochloride	immediate release tab	ค	7.4.2. Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence	เงื่อนไข : 1. ใช้ใน overactive urinary bladder และ urinary incontinence ยกเว้น stress incontinence 2. ไม่ใช้สำหรับ nocturnal enuresis (ปัสสาวะรดที่นอน ในเด็ก) หมายเหตุ : ยามีประสิทธิภาพต่ำ ประโยชน์ที่ได้ไม่ชัดเจน ผลข้างเคียงเกิดได้บ่อย และมีค่าใช้จ่ายสูง ควรพิจารณาใช้อย่างรอบคอบ
Oxymetazoline hydrochloride	nasal drop, nasal spray	ข	12.2.2. Topical nasal decongestants	-
Oxymetholone	tab	ข	9.1.2. Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias	-
Oxytocin	sterile sol	ก	7.1.1. Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics	-
Packed red cell		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Packed red cell, irradiated		ค	9.1.1. Whole blood and blood products	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
Packed red cell, leukocyte depleted		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Packed red cell, leukocyte depleted irradiated		ง	9.1.1. Whole blood and blood products	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่เคยแพ้ต่อ Packed red cell, leukocyte poor, irradiated
Packed red cell, leukocyte depleted single donor 2 units		ข	9.1.1. Whole blood and blood products	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่มีกลุ่มเลือดหายาก Rh- หรือมีความจำเป็นต้องใช้เลือดเร่งด่วนแต่ขาดเลือดเท่านั้น
Packed red cell, leukocyte poor		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Packed red cell, leukocyte poor, irradiated		ค	9.1.1. Whole blood and blood products	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
Paclitaxel	sterile sol	ง	8.1.5. Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ advanced breast cancer ที่ได้รับ anthracycline มาแล้ว หรือไม่สามารถให้ anthracycline ได้ 2. ใช้เป็น adjuvant treatment สำหรับ high risk, node positive breast cancer 3. ใช้สำหรับมะเร็งรังไข่ 4. ใช้สำหรับ advanced non-small cell lung cancer 5. ใช้สำหรับ AIDS-related Kaposi's sarcoma 6. ใช้เป็น second line treatment ใน nasopharyngeal cancer ระยะแพร่กระจายหรือกลับเป็นซ้ำ 7. ใช้สำหรับ esophageal cancer 8. ใช้เป็น first line treatment ในการรักษา advanced cervical cancer 9. ใช้สำหรับ malignant melanoma
Pancreatic enzymes	cap, tab, EC cap, EC tab	ง	1.8. Drugs affecting intestinal secretions	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น pancreatic insufficiency เท่านั้น

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Pancuronium bromide	sterile sol	ค	15.1.3. Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)	-
Pantoprazole sodium	sterile pwdr	ค	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding	-
Para-aminosalicylic acid	EC tab	ค	5.1.9. Antituberculous drugs	เงื่อนไข : ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug
Paracetamol	tab	ก	4.7.3.1. Drugs for acute migraine attack	-
	tab, syr	ก	4.6. Analgesics and antipyretics	หมายเหตุ : แนะนำให้ใช้เป็น first-line drug สำหรับ osteoarthritis
PAS				ดู Para-aminosalicylic acid
Penicillamine	cap, tab	ค	9.7. Metabolic disorders	ยากำพรั้า เงื่อนไข : ใช้รักษา Wilson's disease คำเตือนและข้อควรระวัง : ระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ เพราะเป็นสารก่อวิรูป (teratogen)
			16. Antidotes	ยากำพรั้า เงื่อนไข : ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว ปรอท และสารหนู คำเตือนและข้อควรระวัง : ระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ เพราะเป็นสารก่อวิรูป (teratogen)
Penicillin G				ดู Benzylpenicillin
Penicillin G benzathine				ดู Benzathine benzylpenicillin
Penicillin G procaine				ดู Procaine benzylpenicillin
Penicillin V				ดู Phenoxymethylpenicillin potassium
Pentamidine isethionate				ดู Pentamidine isetionate
Pentamidine isetonate	sterile pwdr	ง	5.4.2. Other antiprotozoal drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับป้องกันหรือรักษาปอดอักเสบที่เกิดจาก Pneumocystis jirovecii ที่ติดต่อจาก co-trimoxazole หรือ trimethoprim
Peramivir ยากำพรั้า	sterile sol	ง	5.3.1 Non-antiretrovirals	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรง และไม่สามารถใช้ยาชนิดกิน หรือชนิดสูดพ่นได้
Permethrin	cream, lotion (เฉพาะ 1%)	ก	13.1.3. Parasitocidal preparations	ยากำพรั้า เงื่อนไข : ใช้สำหรับรักษาเหา
	cream, lotion (เฉพาะ 5%)	ก	13.1.3. Parasitocidal preparations	ยากำพรั้า เงื่อนไข : ใช้สำหรับรักษาหิด และไลน
Perphenazine	tab	ก	4.2.1. Antipsychotic drugs	-
Pethidine hydrochloride	sterile sol	ค	4.7.1. Opioid analgesics	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
			15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
Phenobarbital	tab (as base), sterile pwdr, sterile sol	ก	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Phenobarbital sodium	sterile pwdr, sterile sol	ก	4.8.2. Drugs used in status epilepticus	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
			16. Antidotes	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 เงื่อนไข : ใช้บำบัดอาการชักจากยา
Phenobarbitone				ดู Phenobarbital
Phenobarbitone sodium				ดู Phenobarbital sodium

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Phenol	inj	ง	4.9. Drugs used in movement disorders	ยากำพรั้ง เงื่อนไข : ใช้สำหรับกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity)
Phenoxymethylpenicillin potassium	cap, tab, dry syr	ก	5.1.1. Penicillins	-
Phenyl Alcohol				ดู Phenol
Phenylephrine hydrochloride	eye drop	ค	11.3. Mydriatics and cycloplegics	-
Phenytoin base	chewable tab	ก	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	-
Phenytoin sodium	cap, SR cap, sterile sol	ก	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	-
	sterile sol	ก	4.8.2. Drugs used in status epilepticus	-
Phospholipids (ชนิด Poractant alfa หรือ Beractant)	sterile intratracheal susp	ง	3.5. Pulmonary surfactants	เงื่อนไข : 1. ให้เลือกหนึ่งรายการที่จัดซื้อได้ถูกกว่าระหว่าง Poractant alfa กับ Beractant 2. ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์
phytomenadione				ดู Vitamin K1
Pilocarpine	eye drop (as hydrochloride or nitrate)	ก	11.4. Drugs for treatment of glaucoma	-
Pimozide	tab	ค	4.2.1. Antipsychotic drugs	เงื่อนไข : 1. ไม่ควรใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา 2. ควรได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
Pioglitazone hydrochloride	tab (เฉพาะ 15, 30 mg)	ง	6.1.2. Oral antidiabetic drugs	เงื่อนไข : ใช้เป็นยาชนิดที่สามเพิ่มเติมหลังจากใช้ยา sulfonylureas และ metformin แล้วเกิด secondary failure หรือใช้เมื่อแพ้ยา metformin หรือ sulfonylureas ค่าเตือนและข้อควรระวัง : 1. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่หัวใจล้มเหลวในระดับที่รุนแรง (NYHA ในระดับ 3 และ 4) ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว 2. ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่กำลังเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
Piperacillin sodium + Tazobactam sodium	sterile pwdr	ง	5.1.1. Penicillins	เงื่อนไข : 1. ใช้ในกรณีที่ใช้ยาในกลุ่ม third generation cephalosporins ไม่ได้ โดยให้พิจารณาเลือกใช้ก่อนยา กลุ่ม carbapenems ทั้งใน empiric และ specific therapy สำหรับ nosocomial infection เช่น pneumonia, complicated skin and soft tissue infection, intra-abdominal infection และ febrile neutropenia 2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
Piribedil	SR tab (เฉพาะ 50 mg)	ง	4.9. Drugs used in movement disorders	เงื่อนไข : ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
Piroxicam	cap (as base), compressed tab (as base), film coated tab (as base)	ข	10.1.1. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)	-
Platelets concentrate, irradiated		ค	9.1.1. Whole blood and blood products	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
Platelets concentrate, random donor		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Platelets concentrate, single donor		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Podophyllin	paint, paint (hosp)	ก	13.6. Preparations for warts and calluses	-
Podophyllum resin				ดู Podophyllin
Polidocanol				ดู Lauromacrogol 400
Poliomyelitis vaccine, live attenuated	oral sol, oral susp	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Polyethylene glycol, PEG				ดู Macrogols with electrolytes
Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin	eye drop	ค	11.1.1. Antibacterials and eye wash solution	หมายเหตุ : ยาที่มีส่วนผสมของ polymyxin B อาจส่งผลให้เกิดการดื้อของเชื้อในทาง systemic จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น
Polyvalent antivenom for hematoxin	inj	ก	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้แก้พิษต่อระบบเลือดในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด
Polyvalent antivenom for neurotoxin	inj	ก	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้แก้พิษต่อระบบประสาทในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด
Potassium acetate	sterile sol (hosp)	ก	9.2. Fluids and electrolytes	-
Potassium chloride	syd, syr (hosp), elixir, elixir (hosp), compressed tab, EC tab, sterile sol	ก	9.2. Fluids and electrolytes	คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ควรรับประทานยา potassium chloride หลังอาหารทันที ในกรณียาเม็ดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 180 มิลลิลิตร และห้ามเขย่งขวดนอนลงอย่างน้อย 30 นาทีหลังรับประทานยาเม็ด 2. ห้ามใช้ยา potassium chloride ชนิด elixir กับผู้ป่วยเด็ก อายุต่ำกว่า 2 ขวบ เนื่องจากมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
Potassium citrate	oral sol (hosp), dry powdr for oral sol (hosp)	ก	7.4.3. Drugs used in alkalisation of urine 9.2. Fluids and electrolytes	- -
Potassium Iodide	tab (เฉพาะ 150mcg as iodine)	ก	9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับเสริมไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์ 2. ใช้เสริมไอโอดีนในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร 3. ห้ามใช้ในผู้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ คำเตือนและข้อควรระวัง: ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
Potassium permanganate	powdr (hosp)	ก	5.6. Antiseptics	-
Povidone-iodine	sol, sol (hosp)	ก	5.6. Antiseptics	-
Pralidoxime chloride	sterile powdr	ก	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphates
Praziquantel	tab	ก	5.5. Anthelmintics	-
Prazosin hydrochloride	tab	ข	2.5.3. Alpha-adrenoceptor blocking drugs	-
Prednisolone	cap, tab	ก	6.3. Corticosteroids 8.2. Drugs affecting the immune response	- -
	cream, cream (hosp)	ก	13.4. Topical corticosteroids	-
Prednisolone acetate	eye susp	ค	11.2. Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations	เงื่อนไข : 1. ใช้รักษาผื่นตาอักเสบ และ/หรือหลังผ่าตัดตา 2. ใช้รักษากระจกตาอักเสบหลังจากการติดเชื้อไวรัสที่ชั้น stroma หรือชั้นเยื่อโพรงตา (endothelium) หมายเหตุ : การใช้ยานี้ต้องระวังการติดเชื้อราที่กระจกตา การเกิด steroid glaucoma และการใช้ยาคิดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิด steroid cataract
Primaquine phosphate	tab	ก	5.4.1. Antimalarials	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Probenecid	film coated tab	ก	10.1.3. Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia	ค่าเตือนและข้อควรระวัง : ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัตินิ่วในไต หรือภาวะไตเสื่อม
Procabazine hydrochloride	cap, tab	ง	8.1.1. Alkylating drugs	ยากำพรั้า เงื่อนไข : 1. ใช้เป็น adjuvant หรือ neo-adjuvant therapy สำหรับ anaplastic oligodendroglioma 2. ใช้สำหรับ recurrent anaplastic oligodendroglioma 3. ใช้สำหรับ Hodgkin's lymphoma
Procaine benzylpenicillin	sterile sol, sterile susp	ก	5.1.1. Penicillins	-
Procaterol hydrochloride	syr	ก	3.1.1. Adrenoceptor agonists	-
	tab	ข	3.1.1. Adrenoceptor agonists	-
Propafenone hydrochloride	tab	ง	2.3. Anti-arrhythmic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อื่นควบคุมการเต้นของหัวใจไม่ได้ผล 2. ใช้สำหรับ refractory supraventricular tachyarrhythmias
Propofol	sterile emulsion	ค	15.1.1. Intravenous anesthetics	-
Propranolol hydrochloride	tab	ก	2.4. Beta-adrenoceptor blocking drugs	-
			4.9. Drugs used in movement disorders	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ essential tremor
			4.7.3.2. Drugs used in the prophylaxis of migraine	-
Propylthiouracil	tab	ก	6.2.2. Antithyroid drugs	-
Protamine sulfate	sterile sol	ค	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้ในกรณีที่มีเลือดออกมากผิดปกติจากการได้รับ heparin เกินขนาด
Protonamide	tab	จ(1)	5.1.9 antituberculosis drugs	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะโครงการการรักษาวัณโรคดื้อยาโดยมีวิธีการใช้ยาและการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
Pseudoephedrine hydrochloride	tab, syr	ก	3.7. Systemic nasal decongestants	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Pyrazinamide	tab	ก	5.1.9. Antituberculous drugs	-
Pyridostigmine bromide	tab	ก	10.2.1. Drugs which enhance neuromuscular transmission	-
Pyridoxine hydrochloride				ดู Vitamin B6
Pyrimethamine	tab	ก	5.4.2. Other antiprotozoal drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ toxoplasmosis โดยใช้ร่วมกับ sulfadiazine
Quinine	compressed/film coated tab (as sulfate), sterile sol (as dihydrochloride)	ก	5.4.1. Antimalarials	-
Quetiapine fumarate	Immediate release tab (เฉพาะ 200mg)	ง	4.2.1 Antipsychotic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ schizophrenia ที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถใช้ยา risperidone หรือ clozapine ได้ 2. ใช้สำหรับ bipolar disorder ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Rabies immunoglobulin, horse	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Rabies immunoglobulin, human	inj	ข	14. Immunological products and vaccines	เงื่อนไข : ใช้สำหรับผู้ที่แพ้ rabies immunoglobulin, horse (ERIG)
Rabies vaccines ยกเว้น ชนิด human diploid cell vaccine	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ post-exposure protection 2. ใช้สำหรับ pre-exposure protection ในประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
Raltegravir	tab (เฉพาะ 400mg)	จ(2)	5.3.2 Antiretrovirals	เงื่อนไข : 1. ใช้รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ติดต่อจากสุตรพื้นฐาน และสุตรที่สอง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 2. ใช้ในผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 2.1 กลุ่มที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อน และจะเริ่มยาต้านไวรัสหลังอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 2.2 กลุ่มที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ที่เคยได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อนแต่ระดับไวรัสในพลาสมา (plasma viral load) ที่อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ >1,000 copies/mL โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Ranitidine hydrochloride	film coated tab	ก	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding	-
	sterile sol	ข	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding	-
Rapamycin				ดู Sirolimus
Recombinant tissue - type plasminogen activator				ดู Alteplase
Repaglinide	tab (เฉพาะ 0.5, 1, 2 mg)	ง	6.1.2. Oral antidiabetic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับลด postprandial hyperglycemia 2. ใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ hypoglycemia สูง
Ribavirin	cap, tab (เฉพาะ 200 mg)	จ(2)	5.3.3. Viral hepatitis	เงื่อนไข: ใช้ Ribavirin ร่วมกับ Sofosbuvir + Velpatasvir ในการรักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ กรณีมีตับแข็ง Child-Pugh B หรือ C โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Rifampicin	cap, tab, dry syr, syr, susp	ก	5.1.9. Antituberculous drugs	-
	oral form (for pediatric use)	ก	5.1.9. Antituberculous drugs	ยากำพร้า
Rilpivirine	tab	ข	5.3.2. Antiretrovirals	เงื่อนไข 1. ใช้ในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อน และต้องมี CD4 > 350 cells/mm ³ 2. ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสสุตรอื่นมาก่อน มีระดับ viral load < 50 copies/mL และไม่มีการติดต่อต้านไวรัสทุกชนิดมาก่อน สามารถเปลี่ยน PI หรือ NNRTI ที่อยู่ในสุตรยาที่รับประทานอยู่มาเป็น rilpivirine ได้ หมายเหตุ : ใช้เป็นยาใน post exposure prophylaxis ร่วมกับ tenofovir/emtricitabine ได้

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Ringer-Lactate solution for injection ; Hartmann's solution for injection				ดู Sodium lactate intravenous infusion compound
Risperidone	tab (ไม่วางชนิดละลายในปาก), oral sol, oral sol/syr (hosp)	ข	4.2.1. Antipsychotic drugs	คำเตือนและข้อควรระวัง : ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ
Ritonavir	cap, oral sol, tab	ค	5.3.2. Antiretrovirals	-
Rituximab	sterile sol	จ(2)	8.1.5 Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข: ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด Diffused Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) ในเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Rocuronium bromide	sterile sol	ค	15.1.3. Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)	-
Ropinirole	SR tab (เฉพาะ 2mg,4mg)	ง	4.9 Drugs used in movement disorders	เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีเงื่อนไขครบทุกข้อดังนี้ 1. ได้รับยา levodopa ในขนาด 400mg ต่อวัน แต่ตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ โดยมี total disabling off time มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน 2. ได้รับยา bromocriptine ในขนาด 10mg ต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้วไม่ได้ผล โดยมี total disabling off time มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
Rotavirus vaccine	oral form (for pediatric use)	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Roxithromycin	cap/tab (เฉพาะ 100 และ 150 mg)	ก	5.1.5. Macrolides	-
RPV				ดู Rilpivirine
RTV				ดู Ritonavir
Rubella vaccine	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Salbutamol sulfate	tab	ก	7.1.2. Myometrial relaxants	-
	tab, aqueous sol, DPI, MDI, sol for nebulizer	ก	3.1.1. Adrenoceptor agonists	-
Salicylic acid	lotion (hosp), oint (hosp), paste (hosp)	ก	13.5. Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	-
	ointment (hosp), paste (hosp)	ก	13.6. Preparations for warts and calluses	-
Salicylic acid + Lactic acid	colloidal sol	ข	13.6. Preparations for warts and calluses	-
Saliva substitutes				ดู Artificial saliva
Saquinavir	cap (as base or mesilate)	จ(1)	5.3.2. Antiretrovirals	-
Saturated solution of potassium iodide	oral sol (hosp)	ก	6.2.2. Antithyroid drugs	-
	sol (hosp)	ก	5.2. Antifungal drugs	-
Senna	tab	ก	1.6. Laxatives	-
Sertraline	tab (เฉพาะ 50 mg)	ข	4.3. Antidepressant drugs	-
Sevoflurane	inhalation vapour liquid	ค	15.1.2. Inhalational anesthetics	-
Shohl's solution				ดู Sodium citrate + Citric acid

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Sildenafil (as citrate)	tab	ง	2.6.3. Other vasodilators	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้สำหรับผู้ป่วยภาวะ pulmonary arterial hypertension (PAH) ที่เกิดจากโรคหัวใจแต่กำเนิด (CHD) ชนิด systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH) หรือ PAH associated with connective tissue disease (CNTD) และ อยู่ใน WHO functional classification of PAH \geq II และ ได้รับการตรวจวินิจฉัยตามขั้นตอนวิธีที่ปรากฏในแนวทางเวชปฏิบัติ แนะนำให้หยุดยาเมื่อผลการประเมินทุก 3 เดือนมีอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 รอบการประเมินเกณฑ์อาการทรุดลง หมายถึงการตรวจพบอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้คือ <ol style="list-style-type: none"> ตรวจร่างกายมีอาการแสดงของ progressive right heart failure WHO functional classification เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 6MWT ลดลงกว่าเดิม 25% Echocardiography พบลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาการทรุดลงเช่น right atrium และ right ventricle โตขึ้นกว่าเดิม, right ventricular systolic pressure (RVSP) สูงขึ้นกว่าเดิม, RV dysfunction, TAPSE $<$ 1.5 cm, RAP $>$ 15 mmHg, CI \leq 2 L/min/m², pericardial effusion
Silver nitrate	sol (hosp), crystal (hosp), stick (hosp)	ก	13.6. Preparations for warts and calluses	-
Silver sulfadiazine				ดู Sulfadiazine silver
Simethicone				ดู Simeticone
Simeticone	chewable tab, susp	ก	1.1. Antacids and other drugs for dyspepsia	-
Simvastatin	tab (เฉพาะ 10, 20 และ 40 mg)	ก	2.12. Lipid-regulating drugs	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้เป็นยาเสริม (adjunct therapy) สำหรับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ร่วมกับการควบคุมอาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเกณฑ์ในการเริ่มใช้ยาและเป้าหมายในการรักษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> การป้องกันแบบทุติยภูมิ (secondary prevention) <ol style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยมีประวัติเกิด cardiovascular event เริ่มใช้ยาเมื่อ LDL-C \geq 100 mg/dL โดยมีเป้าหมายลดให้ต่ำกว่า 100 mg/dL กรณีมีโรคหัวใจขาดเลือดรุนแรงลดให้ต่ำกว่า 70 mg/dL ผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (coronary heart disease) เริ่มใช้ยาเมื่อ LDL-C \geq 130 mg/dL โดยมีเป้าหมายลดให้ต่ำกว่า 100 mg/dL การป้องกันแบบปฐมภูมิ (primary prevention) <ol style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (coronary heart disease risk equivalent) เริ่มใช้ยาเมื่อ LDL-C \geq 130 mg/dL โดยมีเป้าหมายลดให้ต่ำกว่า 100 mg/dL ผู้ป่วยเหล่านี้ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย, abdominal aortic aneurysm หรือ symptomatic carotid artery disease หรือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือ ผู้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปีจากการคำนวณด้วย Framingham score (general cardiovascular disease: 10-year risk) เกินกว่า 20%

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				<p>2.2.2. ผู้ป่วยอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปนี้ข้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สูบบุหรี่ 2) ความดันเลือดสูง (ความดันเลือด $\geq 140/90$ มิลลิเมตรปรอท หรือกำลังใช้ยาลดความดันเลือดอยู่) 3) HDL cholesterol น้อยกว่า 40 mg/dL (หาก HDL-C ≥ 60 mg/dL ให้หักลบจำนวนปัจจัยเสี่ยงออกหนึ่งข้อ) 4) มีประวัติครอบครัว (เฉพาะพ่อ แม่ พี่ น้อง) เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือมีการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ในญาติผู้ชายอายุ ≤ 55 ปี หรือ ญาติผู้หญิงอายุ ≤ 65 ปี 5) อายุ ผู้ชาย ≥ 45 ปี ผู้หญิง ≥ 55 <p>2.2.2.1 กรณีมีปัจจัยเสี่ยง 0-1 ข้อ เริ่มให้ยาเมื่อ LDL-C ≥ 190 mg/dL โดยมีเป้าหมายลดให้ต่ำกว่า 160 mg/dL</p> <p>2.2.2.2 กรณีมีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป ให้ประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปีจากการคำนวณด้วย Framingham score</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความเสี่ยงต่ำกว่า 10 % เริ่มให้ยาเมื่อ LDL-C ≥ 160 mg/dL โดยมีเป้าหมายลดให้ต่ำกว่า 130 mg/dL • ความเสี่ยงระหว่าง 10-20 % เริ่มให้ยาเมื่อ LDL-C ≥ 130 mg/dL โดยมีเป้าหมายลดให้ต่ำกว่า 130 mg/dL • ความเสี่ยงมากกว่า 20% ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 2.2.1 คำเตือนและข้อควรระวัง : <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ไม่ควรให้ยา simvastatin เกินวันละ 40 mg สำหรับผู้ป่วยที่เคยใช้มานานเกิน 1 ปี โดยไม่เกิดผลข้างเคียงให้ใช้ในขนาดเดิมต่อไปได้ 2. ห้ามใช้ยา simvastatin ร่วมกับ gemfibrozil, cyclosporine, danazol หรือยาในกลุ่ม strong CYP3A4 inhibitors เช่น itraconazole, ketoconazole, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, HIV protease inhibitors เป็นต้น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หยุดยา simvastatin ระหว่างใช้ยาดังกล่าว 3. หลีกเลี่ยงการใช้ยา simvastatin <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา amlodipine หรือ amiodarone 3.2 ในขนาดเกินวันละ 10 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา diltiazem หรือ verapamil
Sirolimus (Rapamycin)	oral sol (เฉพาะ 1 mg/ml), tab (เฉพาะ 1 mg)	ง	8.2. Drugs affecting the immune response	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในระยะ maintenance therapy ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ prednisolone รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงพิษต่อไตจาก ciclosporin หรือ tacrolimus 2. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มีภาวะไตวายที่มีค่า eGFR (CKD-EPI formula) ในช่วง 30-50 ml/min/1.73 m² 3. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายตับที่เคยได้รับยา sirolimus มาก่อนและไม่มีปัญหาการตอบสนองต่อยา
Sodium acetate	sterile sol (hosp)	ง	9.2. Fluids and electrolytes	-
Sodium aurothiomalate	sterile sol	ง	10.1.2. Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้ในผู้ป่วยข้ออักเสบ rheumatoid arthritis ในกรณีที่ไม่ตอบสนอง หรือมีข้อห้ามใช้ conventional synthetic DMARDs 2. ใช้โดยอายุรแพทย์โรคข้อ

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Sodium bicarbonate	ear drop (hosp)	ก	12.1.3. Other drugs acting on the ear	-
	sterile sol (เฉพาะ 44.6 mEq)	ก	16. Antidotes	เงื่อนไข : 1. ใช้บำบัดภาวะ hyperkalemia และพิษที่เกิดจากสาร tricyclic antidepressants, antiarrhythmics type I 2. ใช้ปรับปัสสาวะให้เป็นอย่างอื่น เพื่อเร่งการกำจัดสารพิษ เช่น salicylates เป็นต้น
	tab, sterile sol	ก	9.2. Fluids and electrolytes	-
Sodium calcium edetate	sterile sol	ค	16. Antidotes	ยากำพร้า เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษจากตะกั่ว สังกะสี และแมงกานีส
Sodium chloride	sterile sol	ก	12.3.5. Other dental preparations	-
	sterile sol (for irrigation) (เฉพาะ 0.9%)	ก	12.2.2. Topical nasal decongestants	-
	tab (เฉพาะ 300 mg), sterile sol	ก	9.2. Fluids and electrolytes	-
Sodium citrate + Potassium citrate	oral sol (hosp)	ก	7.4.3. Drugs used in alkalinisation of urine	-
Sodium citrate + Citric acid	oral sol (hosp)	ก	7.4.3. Drugs used in alkalinisation of urine	-
Sodium colistinmethanesulphonate				ดู Colistimethate sodium
Sodium cromoglicate	eye drop	ค	11.2. Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations	-
Sodium fluoride	tab, oral sol	ก	12.3.4. Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries	หมายเหตุ : ระงับการใช้ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์สูง เพราะอาจทำให้เกิด fluorosis
	tab, oral sol, oral sol (hosp)	ก	9.5. Minerals	คำเตือนและข้อควรระวัง : ระงับการใช้ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์สูง เพราะอาจทำให้เกิด fluorosis
Sodium fusidate	ointment	ข	13.1.1. Antibacterial preparations	-
	tab	ง	5.1.7. Some other antibacterials	เงื่อนไข : ใช้สำหรับการติดเชื้อ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ที่มีอาการไม่รุนแรงถึงรุนแรงปานกลาง หรือใช้ switch therapy ต่อจากยาฉีด โดยใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยา
Sodium glycerophosphate	sterile sol	ง	9.5 Minerals	เงื่อนไข : ใช้กับเด็กแรกเกิดที่ต้องการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ (total parenteral nutrition)
Sodium hypochlorite	sol (hosp)	ก	12.3.3. Antiseptics for root canal treatment	-
Sodium lactate intravenous infusion compound	sterile sol	ก	9.2. Fluids and electrolytes	-
Sodium nitrite	sterile sol, sterile sol (hosp)	ค	16. Antidotes	ยากำพร้า เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจากไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ คำเตือนและข้อควรระวัง : การใช้ยาปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะ cardiovascular collapse, methaemoglobinaemia และอาจถึงตายได้

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Sodium nitroprusside	sterile pwdr	ก	2.5.1. Vasodilator antihypertensive drugs	ยากำพรั้า เงื่อนไข : ใช้เป็นมาตรฐานการรักษาใน hypertensive emergencies (ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์)
Sodium phosphates	oral sol	ค	1.6. Laxatives	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ เตรียมลำไส้ใหญ่ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้ 2. ไม่ใช้ยานี้เพื่อทดแทนการขาดฟอสเฟต หรือใช้เป็นยาระบายหรือยาถ่าย คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ไม่ควรรับประทานเกินครั้งละ 45 มิลลิกรัม และไม่เกิน 90 มิลลิกรัม ภายใน 24 ชั่วโมง 2. ควรระวังในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคไตวาย และผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
Sodium thiosulfate	sol, sol (hosp)	ก	13.1.2. Antifungal preparations	-
	sterile sol, sterile sol (hosp)	ค	16. Antidotes	ยากำพรั้า เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษจากไซยาไนด์
Sodium valproate	EC tab, oral sol	ก	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	-
	EC tab, SR tab	ง	4.2.2. Antimanic drugs	-
	EC tab, SR tab	ง	4.7.3.2. Drugs used in the prophylaxis of migraine	เงื่อนไข : ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเท่านั้น
	SR tab	ก	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	-
Sofosbuvir + Velpatasvir	tab (เฉพาะ 400 mg+100 mg)	จ(2)	4.2.2. Antimanic drugs	-
			4.8.2. Drugs used in status epilepticus	-
Sofosbuvir + Velpatasvir	tab (เฉพาะ 400 mg+100 mg)	จ(2)	5.3.3 Viral hepatitis	เงื่อนไข : ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 หมายเหตุ : ยา Sofosbuvir + Velpatasvir ขนาด 400 mg + 100 mg มีราคาตัวสุดท้ายที่ต่อรองได้ไม่ลดละ 278.20 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/
Soluble insulin	sterile sol	ก	6.1.1. Insulins	-
Soluble insulin + Isophane insulin				ดู Biphasic isophane insulin
Special mouthwash	mouthwash sol (hosp)	ก	12.3.5. Other dental preparations	-
Spironolactone	tab	ก	2.2. Diuretics	-
Squill and Ammonia Mixture	mixt (hosp)	ก	3.6.1. Cough suppressants	-
SSKI			6.2.2 Antithyroid Drugs	ดู Saturated solution of potassium iodide
Stavudine	cap, dry syr	ข	5.3.2. Antiretrovirals	-
Streptokinase	sterile pwdr	ก	2.10. Fibrinolytic drugs	-
Streptomycin sulfate	sterile pwdr	ก	5.1.9. Antituberculous drugs	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Succimer	cap	ง	16. Antidotes	ยากำพรัว เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษจากตะกั่ว
Succinylcholine chloride				ดู Suxamethonium chloride
Sucralfate	tab, susp	ค	1.3. Ulcer-healing drugs and drugs used in	เงื่อนไข : ใช้เฉพาะกรณีหึ่งตั้งครรภัก
Sulfadiazine	tab	ก	5.4.2. Other antiprotozoal drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ toxoplasmosis โดยใช้ร่วมกับ pyrimethamine
Sulfadiazine silver	cream	ก	13.1.1. Antibacterial preparations	-
Sulfamethoxazole + Trimethoprim	cap, tab, susp, sterile sol	ก	5.1.8. Sulphonamides and trimethoprim	-
Sulfasalazine	EC tab	ค	10.1.2. Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)	-
	tab, EC tab	ค	1.5. Drugs used in chronic bowel disorders	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ chronic inflammatory bowel disease
Sulfur	oint, oint (hosp) (เฉพาะ 5-10%)	ก	13.1.3. Parasitocidal preparations	-
Sulphur				ดู Sulfur
Sulprostone	sterile powdr	ง	7.1.1. Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics	เงื่อนไข : ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วย severe post-partum hemorrhage
Suxamethonium chloride	sterile powdr, sterile sol	ค	15.1.3. Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)	-
Tacrolimus	cap, sterile sol (concentrate for infusion)	ง	8.2. Drugs affecting the immune response	เงื่อนไข : 1. ชนิดรับประทานใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในระยะ maintenance therapy ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง (MF) ขึ้นไป 2. ชนิดรับประทานใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายไต หลังเกิดภาวะ acute rejection โดยเลือกใช้เป็นตัวแรกเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (MF) ขึ้นไป 3. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ในระยะ maintenance therapy
Talbot's solution	sol (hosp)	ก	12.3.1. Drugs used in treatment of oral ulcer	-
Tamoxifen citrate	tab	ค	8.3.1. Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors	เงื่อนไข : ใช้สำหรับมะเร็งเต้านม
Tc-99m dextran	sterile sol for inj (hosp)	ง	17.4. Radiopharmaceuticals	เงื่อนไข : ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคการอุดตันของระบบทางเดินน้ำเหลือง (lymphatic obstruction)
Tc-99m diethylene triamine penta acetic acid	sterile sol for inj (hosp), aerosol for inhalation (hosp)	ง	17.4. Radiopharmaceuticals	เงื่อนไข : 1. ใช้เพื่อการคำนวณหาค่า glomerular filtration rate (GFR) 2. ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจ (ventilation lung scan)

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Tc-99m dimercaptosuccinic acid	sterile sol for inj (hosp)	ง	17.4. Radiopharmaceuticals	เงื่อนไข : 1. ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกอักเสบและแผลเป็นของเนื้อไต 2. ใช้ประเมินการทำงานของไต
Tc-99m dimercaptosuccinic acid V	sterile sol for inj (hosp)	ง	17.4. Radiopharmaceuticals	เงื่อนไข : ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค medullary thyroid cancer
Tc-99m iminodiacetic acid	sterile sol for inj (hosp)	ง	17.4. Radiopharmaceuticals	เงื่อนไข : ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดี
Tc-99m methylene diphosphonate	sterile sol for inj (hosp)	ง	17.4. Radiopharmaceuticals	เงื่อนไข : ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกและข้อ
Tc-99m phytate	sterile sol for inj (hosp)	ง	17.4. Radiopharmaceuticals	เงื่อนไข : 1. ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตับและม้าม 2. ใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร 3. ใช้เพื่อการวินิจฉัย 3.1 ภาวะหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน 3.2 ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (gastrointestinal bleeding)
Tc-99m sulfur colloid	sterile sol for inj (hosp)	ง	17.4. Radiopharmaceuticals	เงื่อนไข : 1. ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค reticuloendothelial system 2. ใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร 3. ใช้เพื่อการวินิจฉัยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (gastrointestinal bleeding)
TDF				ดู Tenofovir disoproxil fumarate
TDF+FTC				ดู Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine
TDF+FTC+EFV				ดู Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine + Efavirenz
Tegafur + uracil	cap (100/224 mg)	ง	8.1.3. Antimetabolites	เงื่อนไข : ใช้ใน adjuvant treatment ใน stage II colorectal cancer
Tenecteplase	sterile pwdr	ง	2.10 Fibrinolytic drugs	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ ST elevation myocardial infarction ในกรณีที่มีผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา streptokinase หรือเคยได้ streptokinase มากมายใน 6 เดือน
Tenofovir disoproxil fumarate	tab	ง	5.3.3. Viral hepatitis	เงื่อนไข : ใช้สำหรับโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 1. ใช้ในกรณี rescue ในผู้ป่วยที่ติดต่อยาในกลุ่ม nucleoside analog (NRTI) เช่น lamivudine โดยใช้ tenofovir เป็นการรักษาเสริม 2. ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยยังตรวจพบ HBV DNA หลังรักษาด้วยยาในกลุ่ม nucleoside analog (NRTI) ได้แก่ lamivudine, telbivudine, clevudine เป็นเวลา 24 สัปดาห์ โดยที่ผู้ป่วยกินยาอย่างสม่ำเสมอ คำแนะนำ : 1. ให้ตรวจ HIV serology negative 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือนก่อนเริ่มการรักษา ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย: hepatic decompensation) ให้มีผล HIV serology negative ในครั้งแรก 2. ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจ anti-HIV อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
				3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะนำให้รักษาพร้อมโดยแพทย์สาขาโรคติดเชื้อและแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร หมายเหตุ : แนะนำให้ติดตามระดับ serum creatinine, serum phosphate, uric acid ทุก 4-6 เดือน
		ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine	tab (300+200 mg)	ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine + Efavirenz	tab (300+200+600 mg)	ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
Terbutaline sulfate	sol for nebulizer	ก	3.1.1. Adrenoceptor agonists	-
	tab, sterile sol	ก	7.1.2. Myometrial relaxants	-
	tab, syr, sterile sol	ก	3.1.1. Adrenoceptor agonists	-
Testosterone enantate	sterile oily sol for inj	ค	6.4.2. Male sex hormones and antagonists	-
Testosterone enanthate				ดู Testosterone enantate
Tetanus antitoxin, horse	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Tetanus antitoxin, human	inj	ข	14. Immunological products and vaccines	เงื่อนไข : ใช้สำหรับผู้ที่แพ้ tetanus antitoxin, horse
Tetanus toxoid				ดู Tetanus vaccine
Tetanus vaccine	inj	ก	14. Immunological products and vaccines	-
Tetrabenazine ยาแก้พรี	tab (เฉพาะ 12.5mg, 25mg)	ง	4.9 Drugs used in movement disorders	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ chorea ที่สัมพันธ์กับ Huntington's disease
Tetracaine hydrochloride	eye drop	ก	11.5. Local anaesthetics	เงื่อนไข : ห้ามให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน
Tetracosactide	sterile pwdr	ง	6.5.1. Hypothalamic and anterior pituitary hormones	ยาแก้พรี เงื่อนไข : ใช้สำหรับวินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ
Tetracycline hydrochloride	cap, tab	ก	5.1.3. Tetracyclines	-
	eye oint	ก	11.1.1. Antibacterials and eye wash solution	ยาแก้พรี
Theophylline	SR cap, SR tab	ก	3.1.3. Theophylline	-
Theophylline + Glyceril guaiacolate	syr (50+30 mg in 5 ml)	ก	3.1.3. Theophylline	หมายเหตุ : จะนำออกจากบัญชี เมื่อจัดหา theophylline syr ได้ เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนเหตุผลในการใช้ยาสูตรผสม
Thiamazole	tab	ก	6.2.2. Antithyroid drugs	-
Thiamine as hydrochloride or mononitrate				ดู Vitamin B1
Thiopental sodium	sterile pwdr	ค	15.1.1. Intravenous anesthetics	-

• ในช่องเงื่อนไข/อื่น ๆ ที่ระบุไว้ [ดูเพิ่ม] ให้ดูที่หมวดรายละเอียดของยา จัดเรียงตามชื่อยา A-Z หน้า A50-A120
• บัญชี ก ข ค ง จ(1) หรือ จ(2) ดูรายละเอียดของแต่ละบัญชีได้ที่หน้า A15

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Thiopentone sodium				ดู Thiopental sodium
Thioridazine hydrochloride	tab	ค	4.2.1. Antipsychotic drugs	-
Three-in-one parenteral nutrition	sterile sol	ง	9.4. Intravenous nutrition	<p>เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปที่มีภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลางถึงรุนแรง และไม่สามารถรับประทานอาหารทาง enteral ได้เพียงพอ (น้อยกว่า 60% ของพลังงานที่ต้องการต่อวัน)</p> <p>คำเตือนและข้อควรระวัง :</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรระวังในผู้ป่วยโรคไตหรือโรคหัวใจล้มเหลว หรือมีภาวะอื่นซึ่งเสี่ยงต่อภาวะ fluid overload และ/หรือ มีปัญหาความสมดุลของ minerals และ/หรือ electrolytes ผลิตภัณฑ์ three-in-one parenteral nutrition ไม่มี multivitamins และ trace minerals และอาจมี electrolytes และ minerals เช่น โซเดียม โปแตสเซียม แคลเซียม ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรเติมสารอาหารเหล่านี้ให้เพียงพอ ตามคำแนะนำการใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด กรณีที่ใช้เป็น peripheral parenteral nutrition (PPN) ที่จำเป็นจะต้องให้เกินกว่า 14 วัน ควรพิจารณาให้ทาง central line การให้อาหารทางหลอดเลือดดำมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ (thrombophlebitis)
Thyrotropin alfa	sterile pwdr	จ(2)	6.5.1. Hypothalamic and anterior pituitary hormones	<p>เงื่อนไข : ใช้สำหรับ well-differentiated thyroid cancer (papillary and/or follicular thyroid carcinoma) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3</p>
Ticagrelor	tab (เฉพาะ 90 mg)	ง	2.9 Antiplatelet drugs	<p>เงื่อนไข : ใช้ ticagrelor ร่วมกับ aspirin ขนาด 75-100 มก. โดยให้ใช้ ticagrelor เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ในผู้ป่วย high-risk acute coronary syndrome (ACS) ที่รักษาด้วยวิธี Percutaneous Coronary Intervention (PCI) และเป็นไปตามเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ป่วย ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) ที่ได้รับการทำ Primary PCI ผู้ป่วย NSTEMI-ACS ที่มี Grace risk score มากกว่า 140 ผู้ป่วยที่แพ้หรือไม่ตอบสนองต่อ clopidogrel เช่น เกิด ACS หรือ stent thrombosis ในขณะที่ได้รับยา aspirin ร่วมกับ clopidogrel
Ticlopidine hydrochloride	tab	ง	2.9. Antiplatelet drugs	<p>เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ clopidogrel ได้ ยกเว้นกรณี atrial fibrillation</p> <p>คำเตือนและข้อควรระวัง : อาจทำให้เกิด neutropenia การสั่งใช้จึงต้องติดตามระดับเม็ดเลือดขาว ทุก 2 สัปดาห์ติดต่อกันใน 3 เดือนแรก จากนั้นควรติดตามเป็นระยะร่วมกับการตรวจการทำงานของตับ</p>
Timolol maleate	eye drop	ก	11.4. Drugs for treatment of glaucoma	-
Tioguanine	tab	ง	8.1.3. Antimetabolites	<p>เงื่อนไข : ใช้สำหรับ chronic myeloid leukemia, acute lymphoblastic leukemia และ acute myeloid leukemia</p>
Tiotropium bromide	DPI (เฉพาะ 18 mcg)	ค	3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilator	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Tizanidine hydrochloride	tab	๗	10.2.2. Skeletal muscle relaxants	-
Topiramate	cap, tab	๖	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	เงื่อนไข : ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทกับผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล
	tab	๖	4.7.3.2. Drugs used in the prophylaxis of migraine	เงื่อนไข : 1. ห้ามใช้เป็นยาตัวแรกในการป้องกันไมเกรน 2. ใช้ในกรณีที่ยาอื่นแล้วไม่ได้ผล
Topotecan	sterile pwdr	๖	8.1.5 Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้กับผู้ป่วย neuroblastoma ที่มีความเสี่ยงสูง 2. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
Trace element solution	oral sol (hosp)	๓	9.5. Minerals	-
Tramadol hydrochloride	cap, tab, SR cap, SR tab, sterile sol	๘	4.7.1. Opioid analgesics	-
Tranexamic acid	cap	๘	2.11. Hemostatics	เงื่อนไข : 1. ใช้ในทางทันตกรรมเฉพาะกรณีห้ามเลือดด้วยวิธีปกติแล้วไม่ได้ผล 2. ใช้ก่อนทำการหัตถการในช่องปากในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเลือดออกแล้วหยุดยาก 3. ใช้สำหรับภาวะระดูมากผิดปกติ (menorrhagia)
	sterile sol	๓	2.11. Hemostatics	คำเตือนและข้อควรระวัง : ใช้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีภาวะเลือดออกรุนแรง การให้ยาภายใน 3 ชั่วโมงมีประสิทธิผลในการลดอัตราการเสียชีวิต แต่การให้ยาหลังจาก 3 ชั่วโมงอาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออก หมายเหตุ : การใช้ tranexamic acid ไม่สามารถทดแทนการรักษาที่จำเป็นอื่น ๆ ได้ เช่น การให้เลือด เป็นต้น
Trastuzumab	sterile pwdr (เฉพาะ 150mg และ 440 mg)	๖(2)	8.1.5. Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น (early stage breast cancer) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Trazodone hydrochloride	tab	๘	4.3. Antidepressant drugs	-
Tretinoin	cap	๖	8.1.5. Other antineoplastic drugs	เงื่อนไข : ใช้รักษาโรค acute myelogenous leukemia ชนิด M3 (acute promyelocytic leukemia) ที่ได้รับการตรวจ chromosome หรือ PML/RARA โดยจะต้องหยุดใช้ยาเมื่อผลการตรวจ chromosome ไม่ยืนยันว่าพบ t (15:17) หรือ PML/RARA เป็นลบ
Triamcinolone acetonide	cream, cream (hosp), lotion, lotion (hosp)	๓	13.4. Topical corticosteroids	-
	oral paste	๓	12.3.1. Drugs used in treatment of oral ulcer	-
	sterile susp	๘	6.3. Corticosteroids	คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ห้ามฉีดในตำแหน่งหรือรอยโรคที่มีการติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ 2. กรณีฉีดเข้าข้อ โดย 2.1 ไม่ควรฉีดเข้าข้อใหญ่ในคราวเดียวกันเกิน 2 ข้อ ยกเว้นผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง 2.2 การฉีดยาเข้าข้อเดียวกันควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน 3. กรณีฉีดเข้ารอยโรค (intralesional injection) สำหรับโรคผิวหนัง ควรฉีดเข้าในชั้นหนังแท้ หลีกเลี่ยงการฉีดเข้าในชั้นหนังกำพร้าหรือไขมันใต้ผิวหนัง เพราะทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ผิวหนังบาง เป็นต้น

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Trichloroacetic acid	sol (hosp)	ก	13.6. Preparations for warts and calluses	-
Trifluoperazine hydrochloride	tab	ก	4.2.1. Antipsychotic drugs	-
Trihexyphenidyl hydrochloride	tab	ก	4.9. Drugs used in movement disorders	-
Trimethoprim	tab	ข	5.1.8. Sulphonamides and trimethoprim	เงื่อนไข : ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่อาจไวต่อ trimethoprim ในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม sulfonamides
Triptorelin pamoate	sterile powder (เฉพาะ 11.25 mg)	ง	8.3.2 Prostate cancer	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (2 cycles) ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (8 cycles) <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Intermediate risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT2b ถึง cT2c ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 7 หรือมีค่า serum PSA เท่ากับ 10-20 ng/mL อย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (High risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3a ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 8-10 หรือมีค่า serum PSA มากกว่า 20 ng/mL อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงมาก (Very High risk of recurrence) คือผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3b ถึง cT4
		จ(2)	6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins	<p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (2 cycles) ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (8 cycles) <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Intermediate risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT2b ถึง cT2cตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 7 หรือมีค่า serum PSA เท่ากับ 10-20 ng/mL อย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (High risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3a ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 8-10 หรือมีค่า serum PSA มากกว่า 20 ng/mL อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงมาก (Very High risk of recurrence) คือผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3b ถึง cT4
Tropicamide	eye drop	ค	11.3. Mydriatics and cycloplegics	-
Trypan blue	sterile sol for intraocular use	ง	11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment	ยากำพรั้ง เงื่อนไข : ใช้สำหรับข้อมาสีลงมุมเลนส์ระหว่างผ่าตัดต้อกระจกชนิดสุก
Tuberculin PPD				ดู Tuberculin Purified Protein Derivative

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Tuberculin Purified Protein Derivative	inj	ก	5.1.9. Antituberculous drugs	-
Two-in-one parenteral nutrition ประกอบด้วย glucose และ amino acids	sterile sol	ง	9.4 Intravenous nutrition	ประกอบด้วย glucose และ amino acids เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ parenteral nutrition ที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับ intravenous lipid emulsion คำเตือนและข้อควรระวัง : 1. ควรระวังในผู้ป่วยโรคไตหรือโรคหัวใจล้มเหลว หรือมีภาวะอื่นซึ่งเสี่ยงต่อภาวะ fluid overload และ/หรือ มีปัญหาความสมดุลของ minerals และ/หรือ electrolytes และ/หรือผู้ป่วยโรคไต ที่ยังไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (renal replacement therapy) เนื่องจาก สมดุลของ non protein energy ต่อ gram of nitrogen ไม่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย 2. ผลิตภัณฑ์ two-in-one parenteral nutrition อาจมี vitamins, trace minerals และ electrolytes บางชนิดไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ควรเติมสารอาหารเหล่านี้ให้เพียงพอ และเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด 3. กรณีที่ให้เป็น peripheral parenteral nutrition (PPN) ที่จำเป็นจะต้องให้เกินกว่า 14 วัน ควรพิจารณาให้ทาง central line 4. การให้อาหารทางหลอดเลือดดำมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ (thrombophlebitis)
Urea	cream, cream (hosp), oint (hosp)	ก	13.2. Emollient and barrier preparations	หมายเหตุ :Urea รูปแบบ cream ความแรงต่ำกว่า 10% จัดเป็นเครื่องสำอาง ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
Ursodeoxycholic acid	cap	ง	1.8. Drugs affecting intestinal secretions	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ cholestatic liver disease
Ursodiol				ดู Ursodeoxycholic acid
Vancomycin hydrochloride	sterile pwdr	ง	5.1.7. Some other antibacterials	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ที่รุนแรง หรือการติดเชื้อ methicillin-resistant S. epidermidis (MRSE) 2. ใช้สำหรับโรค infective endocarditis (IE) กรณีแพ้ยา penicillin ชนิดรุนแรง
Vecuronium bromide	sterile pwdr	ค	15.1.3. Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)	-
Verapamil	sterile sol	ก	2.3. Anti-arrhythmic drugs	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับ supraventricular tachyarrhythmias ซึ่งรวมทั้ง atrial fibrillation ที่ต้องการฤทธิ์ของยาวนาน 4-6 ชั่วโมง และไม่ซื้อห้ามใช้ calcium channel blockers 2. ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดหัวใจเพื่อรักษาภาวะ no reflux ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ Percutaneous Coronary Intervention (PCI)
Verapamil hydrochloride	tab, SR tab (เฉพาะ 240 mg)	ก	2.6.2. Calcium-channel blockers	เงื่อนไข : ใช้สำหรับ ischemic heart disease (IHD)
Vigabatrin	tab	ง	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	เงื่อนไข : 1. ใช้ในการควบคุมอาการชัก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท 2. ใช้สำหรับ epileptic spasms โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารประสาทวิทยา

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
Vinblastine sulfate	sterile powdr, sterile sol	ค	8.1.4. Vinca alkaloids and etoposide	-
Vincristine sulfate	sterile powdr, sterile sol	ค	8.1.4. Vinca alkaloids and etoposide	-
Vinorelbine tartrate	sterile sol (เฉพาะ 10mg/ml)	ง	8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide	เงื่อนไข : ใช้เป็น adjuvant therapy ใน non small cell lung cancer stage II-IIIa
Vitamin A	cap, tab (เฉพาะ 25,000-50,000 IU ต่อ 1 cap/tab)	ก	9.3. Vitamins	-
Vitamin B complex	cap, tab	ก	9.3. Vitamins	หมายเหตุ : มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่
	sterile sol	ข	9.3. Vitamins	หมายเหตุ : มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่
Vitamin B1	tab (เฉพาะ 10-100 mg), sterile sol (เฉพาะ 100 mg/ml)	ก	9.3. Vitamins	-
Vitamin B12	tab (เฉพาะไม่ต่ำกว่า 100 mcg), sterile sol (เฉพาะ 1000 mcg/ml)	ก	9.3. Vitamins	-
Vitamin B2	tab (เฉพาะไม่ต่ำกว่า 10 mg)	ก	9.3. Vitamins	-
Vitamin B6	sterile sol (เฉพาะ 50 mg)	ค	16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษจากยา Isoniazid และเห็ดสมองวัว (Gyromitra spp.)
	tab (เฉพาะ 10-100 mg), sterile sol (เฉพาะ 100 mg/ml)	ก	9.3. Vitamins	คำเตือนและข้อควรระวัง : การรับประทานวิตามิน B6 ขนาดตั้งแต่ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นไปเป็นเวลานาน มีความสัมพันธ์กับการเกิด neuropathy ได้
Vitamin C	sterile sol	ข	9.3. Vitamins	-
	tab (เฉพาะ 50, 100 mg)	ก	9.3. Vitamins	-
Vitamin D2	cap	ก	9.3. Vitamins	เงื่อนไข : เป็น first -line drug ในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดวิตามิน D
Vitamin E	emulsion (hosp), syr	ค	9.3. Vitamins	เงื่อนไข : 1. ใช้กับทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยหรือเกิดก่อนกำหนดเท่านั้น 2. ใช้ป้องกันและรักษาภาวะขาดวิตามินอีในทารก และเด็กที่มีปัญหาการย่อยไขมันและ/หรือการดูดซึมไขมันบกพร่อง หมายเหตุ : รูปแบบ syrup เป็นตัวรับ water miscible vitamin E
Vitamin K1	sterile sol	ก	9.3. Vitamins	-
			16. Antidotes	เงื่อนไข : ใช้บำบัดพิษจากยา anticoagulants (coumarin derivatives)
Voriconazole	tab, sterile powdr	จ(2)	5.2. Antifungal drugs	1. ใช้รักษา invasive aspergillosis โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 2. ใช้รักษา invasive fungal infection จากเชื้อ Fusarium spp., Scedosporium spp. โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
Warfarin sodium	tab	ค	2.8. Anticoagulants	-
Water for injection	sterile sol	ก	9.2. Fluids and electrolytes	-
White head varnish	varnish (hosp)	ค	12.3.5. Other dental preparations	-
White petrolatum	oint (hosp)	ก	13.2. Emollient and barrier preparations	-

ชื่อยา (generic name)	รูปแบบ (dosage)	บัญชี	กลุ่มยา (class)	เงื่อนไข/ อื่น ๆ (conditions/ others)
White petrolatum + Mineral oil + Liquid lanolin anhydrous (preservative free)	eye oint	ค	11.6. Tear deficiency, ocular lubricants and astringents	เงื่อนไข : ใช้กับผู้ป่วยตาแห้งปานกลางถึงตาแห้งมาก ที่ใช้น้ำตาเทียมที่มี preservative ไม่ได้
Whitfield's ointment				ดู Benzoic acid + Salicylic acid
Whole blood		ก	9.1.1. Whole blood and blood products	-
Zidovudine	cap, oral sol	ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
Zidovudine + Lamivudine	tab (เฉพาะ 300 + 150 mg)	ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine	tab (เฉพาะ 250 + 150 + 200 mg)	ก	5.3.2. Antiretrovirals	-
Zinc oxide	cream, cream (hosp), oint (hosp), paste (hosp)	ก	13.2. Emollient and barrier preparations	-
	powdr (hosp)	ก	12.3.5. Other dental preparations	หมายเหตุ : ใช้อุดคลองรากฟันที่จับคเคียว หรือใช้สำหรับอุดฟันชั่วคราวที่ต้องการให้ remove ออกได้ง่าย
Zinc oxide with zinc acetate	powdr (hosp)	ก	12.3.5. Other dental preparations	หมายเหตุ : ใช้สำหรับอุดคลองรากฟันและอุดชั่วคราวที่ต้องการความแข็งแรงมาก
Zinc sulfate	lotion (hosp)	ก	13.2. Emollient and barrier preparations	-
	oral sol (hosp)	ก	1.4. Drugs used in acute diarrhea	คำแนะนำ : ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ แนะนำให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทุกคน ที่มีอาการท้องร่วงได้รับธาตุสังกะสีเสริมในกระบวนการรักษา โดยให้นานาน 10-14 วัน เพราะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดระยะเวลาการเป็นโรคและป้องกันการเกิดท้องร่วงในครั้งถัดไปได้ด้วย
	oral sol (hosp), cap, tab, sterile sol (hosp)	ก	9.5. Minerals	-
Zoledronic acid	sterile sol (เฉพาะ 4mg/5mL)	ง	6.6 Drugs affecting bone metabolism	เงื่อนไข : 1. ใช้สำหรับภาวะ hypercalcemia ที่เกิดจากโรคมะเร็ง 2. ใช้สำหรับป้องกันโรคแทรกซ้อนทางกระดูกซึ่งมี osteolytic lesion จากภาพรังสี (plain X-ray หรือ CT scan) และเกิดจากโรคมะเร็งดังต่อไปนี้ 2.1) โรคมะเร็ง multiple myeloma โดยให้ zoledronic acid เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี 2.2) โรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดที่ต่อต้านฮอร์โมน (castration resistant prostate cancer) โดยให้ zoledronic acid เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี หมายเหตุ : ให้อดยาเมื่อไม่มีการรักษาที่จำเพาะสำหรับโรคมะเร็ง
Zuclopenthixol	tab (as hydrochloride), sterile sol/sterile emulsion (as acetate or decanoate)	ค	4.2.1. Antipsychotic drugs	เงื่อนไข : ใช้ในกรณีมีชื่อยาอื่นไม่ได้ผล