

أداة الفرز المتكاملة المشتركة بين الوكالات: السن 12 سنة فأكثر (أعدتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود)

المرضى ذوو العلامات
الحيوية المرتفعة الخطورة
تستدعي حالتهم السريرية
إجراء مستوى متقدم من
الفرز أو مراجعة فورية
على يد المسؤول
السريري المشرف



العلامات الحيوية المرتفعة الخطورة	
معدل النبض >60 أو <130	
معدل التنفس >10 أو <30	
درجة الحرارة >36 أو <39 درجة مئوية	
تشبع الدم المحيطي بالأكسجين >92% (في حال توافره)	
مقياس AVPU بخلاف A	



النقل إلى منطقة رعاية الحالات المنخفضة الشدة أو منطقة الانتظار

معايير الفئة الصفراء

- المسالك الهوائية والتنفس
- أي تورم /كتلة في الفم أو الحلق أو الرقبة
- أزيز (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- النورة الدموية
- تغير كل شيء أو إسهال مستمر
- عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب
- شحوب شديد (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- استمرار النزيف (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- إغماء حديث
- الإعاقة
- تغير الحالة العقلية أو الهياج (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- ضعف علم حد
- شكوى عصبية بوزية حادة
- اضطرابات إحصارية حادة
- ألم شديد (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- أخرى
- تفاقم طغح جلدي جديد على مدار ساعات أو تقشر (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- تشوه حاد واضح في الأطراف
- كسر مفتوح
- خلع مشتبه فيه
- إصابات /حروق أخرى (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- تشخيص معروف يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً
- اعتداء جنسي
- ألم حاد في الخصية/الصفن أو الفساح
- عدم القدرة على التبول
- تعرّض يتطلب علاجاً وقائياً لا يحتمل الانتظار (مثل عضه حيوان، وخز إبرة)
- الحمل، إحالة بسبب المضاعفات

نعم

النقل إلى منطقة العلاج السريري

معايير الفئة الحمراء

- غير مستجيب
- المسالك الهوائية والتنفس
- صرير
- ضلقة تنفسية* أو زراق حول الشفاه
- النورة الدموية
- زمن عود امتلاء الشعيرات < 3 ثوان
- ضعف النبض وسرعته
- نزيف حاد
- النبض >50 أو <150
- الإعاقة
- تشنجات نشطة
- أي عرضين من الأعراض الآتية:
- تغير الحالة العقلية
- رقبة متقيسة
- هبوط حرارة الجسم أو الخُمى
- صداع
- نقص سكر الدم
- أخرى
- إصابة مرتفعة الخطورة*
- التسمم/الابتلاع أو التعرض لمواد كيميائية خطيرة*
- ظرف معرض للخطر*
- لدغة ثعبان
- ألم حاد في الصدر أو البطن (أكبر من 50 سنة)
- تخطيط القلب مع إقفار حاد (في حالة إجرائه)
- عنف أو عدوانية
- سيدة حامل تعاني من أي مما يلي:
- صداع شديد
- نزيف حاد
- ألم شديد في البطن
- نوبت أو تغير الحالة العقلية
- تغيرات بصرية
- ضغط الدم الانقباضي ≤ 160 أو ضغط الدم الانبساطي ≤ 110
- الطور الفعال للمخاض
- الرضوح

نعم

النقل إلى منطقة إنعاش الحالات المرتفعة الشدة على الفور

*انظر البطاقة المرجعية

أداة الفرز المتكاملة المشتركة بين الوكالات: أقل من 12 سنة

(أعدتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود)

المرضى ذوو العلامات
الحيوية المرتفعة الخطورة
تستدعي حالتهم السريرية
إجراء مستوى متقدم من
الفرز أو مراجعة فورية
على يد المسؤول
السريري المشرف

نعم

العلامات الحيوية المرتفعة الخطورة			
درجة الحرارة >36 أو <39 درجة مئوية			
تشبع الدم المحيطي بالأكسجين >92% (في حال توافره)			
A بخلاف AVPU مقياس			
معدل التنفس	أقل من سنة واحدة	من سن 1-4 سنوات	من سن 5-12 سنة
مرتفع	50	40	30
منخفض	25	20	10
معدل النبض	أقل من سنة واحدة	من سن 1-4 سنة	من سن 5-12 سنة
مرتفع	180	160	140
منخفض	>90	>80	>70



النقل إلى منطقة رعاية
الحالات المنخفضة الشدة أو
منطقة الانتظار

معايير الفئة الصفراء

- المسالك الهوائية والتنفس**
- أي تورم / كتلة في الفم أو الحلق أو الرقبة
 - أزيز (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- الدورة الدموية**
- عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب
 - تقيؤ كل شيء
 - إسهال مستمر
 - جفاف
 - شحوب شديد (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- الإعاقة**
- تلمل أو حمول أو تهيج مستمر
 - ألم شديد
- أخرى**
- أي رضيع يتراوح عمره بين 8 أيام و6 أشهر
 - سوء تغذية: هزال شديد واضح أو وذمة في كفتا القدمين
 - إصابة/حرق (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
 - اعتداء جنسي
 - تشخيص معروف يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً
 - تفاقم طفح جلدي جديد على مدار ساعات أو تقشر (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
 - تعرض يتطلب علاجاً وقائياً لا يحتمل الانتظار (مثل عضه حيوان)
 - الحمل (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
 - صداع (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)

نعم

النقل إلى منطقة العلاج السريري

معايير الفئة الحمراء

- غير مستجيب
 - المسالك الهوائية والتنفس
 - صرير
 - ضائقة تنفسية* أو زراق حول الشفاه*
- الدورة الدموية**
- زمن عودة امتلاء الشعيرات < 3 ثوانٍ
 - ضعف النبض وسرعه
 - تزيق حاد
 - برودة الأطراف
 - أي عرضين من الأعراض الآتية:
 - حمول
 - تغور العينين
 - بطم شديد في عودة ثنية الجاد بعد قرصها
 - ضعف القدرة على تناول المشروبات
- الإعاقة**
- تشنجات تشنطة
 - أي عرضين من الأعراض الآتية:
 - تغيير الحالة العقلية (تشوش، تملل، تهيج أو حمول مستمر)، مع تصلب الرقبة، انخفاض حرارة الجسم أو الحمى.
 - نض سكر الدم (إذا كان معروفاً)
- أخرى**
- أي رضيع عمره أقل من 8 أيام
 - السن أقل من شهرين ودرجة الحرارة أقل من 36 درجة مئوية أو أكثر من 39 درجة مئوية
 - إصابة مرتفعة الخطورة*
 - طرف معرض للخطر*
 - ألم حاد في الخصية/الصفن أو الأستاح
 - لدغة ثعبان
 - التسمم/الابتلاع أو التعرض لمواد كيميائية خطيرة*
 - سيدة حامل ينطبق عليها معايير البالغين لتصنيفها ضمن الفئة الحمراء

نعم

النقل إلى منطقة إنعاش الحالات
المرتفعة الشدة على الفور

*انظر البطاقة المرجعية

أداة الفرز المتكاملة المشتركة بين الوكالات: *البطاقة المرجعية

معايير أخرى المرتفعة الخطورة

علامات الضائقة التنفسية

الأطفال	البالغون
تنفُّس سريع جداً	تنفُّس سريع جداً أو بطيء جداً
عدم القدرة على التحدث أو الأكل أو الرضاعة الطبيعية	عدم القدرة على التحدث أو المشي دون مساعدة
اتساع فتحتي الأنف، الحَفْحَفَة	التشوُّش أو النعاس أو الهياج
استخدام العضلات الإضافية (على سبيل المثال، الإيماء بالرأس، انسحاب أسفل الصدر للداخل)	استخدام العضلات الإضافية (الرقبة، بين الأضلاع، البطن)

ابتلاع جسم غريب/ التَّعْرُض

قد لا تُفيد العلامات السريرية وحدها في تحديد جميع من يحتاجون إلى تدخل طارئ. ينبغي في بادئ الأمر تصنيف المرضى الذين يعانون من التَّعْرُض أو ابتلاع مواد قد تتسبب في خطورة مرتفعة في الفئة الحمراء من أجل التقييم السريري المبكر.

معايير الرضوح المرتفعة الخطورة

حوادث الطرق	إصابات شديدة عامة
حدث تصادم سيارة بسرعة عالية	سقوط من ارتفاع يعادل ضعف طول الشخص
اصطدام سيارة بأحد المشاة أو راكبي الدراجات الهوائية	إصابة مختزقة للجسم باستثناء الجزء البعيد عن الركبة/ الكوع مع السيطرة على النزيف
شخص آخر في السيارة نفسها لقي حتفه في موقع الحادثة	إصابة هَرَسِيَّة
حدث تصادم سيارة بدون حزام أمان	رضوح متعددة (إصابات في أماكن متعددة من الجسم)
شخص محبوس في سيارة أو أُلقي منها (بما في ذلك الدراجة النارية)	مريض يعاني من اضطراب نزفي أو يتناول مضاد تخثر
	سيدة حامل

الحروق الكبيرة

إصابات استنشاقية	تشير المعايير أدناه إلى الحروق ذات الثخانة الجزئية أو الكاملة حرق يصيب أكثر من 15% من مساحة سطح الجسم
أي حرق يصيب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سنتين أو تتجاوز 70 سنة	حرق محيطي أو يشمل الوجه أو العنق

طرف معرَّض للخطر

مريض يعاني من طرف:
 - ليس به نبض
 - مؤلم ويعاني من أحد الأعراض التالية: شحوب، ضعف، خَدْر، أو يعاني من تورُّم جسيم بعد التَّعْرُض لإصابة شديدة

