

أداة الفرز المتكاملة المشتركة بين الوكالات: السن 12 سنة فأكثر

(أعدتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود)

المرضى ذوو العلامات
الحيوية المرتفعة الخطورة
تسندي حالتهم السريرية
إجراء مستوى متقدم من
الفرز أو مراجعة فورية
على يد المسؤول
السريري المشرف



العلامات الحيوية المرتفعة الخطورة

معدل النبض < 60 أو > 130

معدل التنفس < 10 أو > 30

درجة الحرارة < 36 أو > 39 درجة مئوية

تشبع الدم المحيطي بالأكسجين < 92% (في حال توافره)

مقاييس AVPU بخلاف A



النقل إلى منطقة رعاية الحالات المنخفضة الشدة أو منطقة الانتظار

معايير الفئة الصفراء

المسالك الهوائية والتلف

- أي تورم / كتلة في الفم أو الحلق أو الرقبة
- أزيز (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
الليرة الدموية

تنفس كل شيء أو إبطاء مستمر

- عد القدرة على تناول الطعام أو الشراب

شحوب شديد (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)

- استمرار التزيف (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
الإعافاة
- إغماء حديث

تغير حالة العقلية أو الهياج (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)

ضعف عام حاد

شكوى حصبية بورمية حادة

اضطرابات إصبارية حادة

الم شديد (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء) **آخر**

- تفاقم طفح جلدي جديد على مدار ساعات أو نقش (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- تشوه حاد واضح في الأطراف

كسر مفتوح

خلع مشتبه فيه

- اصطبات / حروق أخرى (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحالة ضمن الفئة الحمراء)
- تشخيص معروف يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلاً

اعتداء جنسي

الم حاد في الخصوبة/الصفون أو القستان

عد القدرة على التبول

- تعرض يتطلب علاجاً وقائياً لا يتحمل الانتظار (مثل عضة حيوان، وخز إبرة)
- الحمل، إحالة بسبب المضاعفات

نعم

النقل إلى منطقة العلاج السريري

معايير الفئة الحمراء

المسالك الهوائية والتلف

- غير مستجيب
- صرير
- صلقة تنفسية* أو رُراق حول الشفاه

الدورة الدموية

- زمن عود امتلاء الشعيرات < 3 ثوانٍ
- ضعف النبض وسرعته

نزيف حاد

النبض < 50 أو > 150

الإعافاة

- شنحات شطة
- أي عرضين من الأعراض الآتية:

تغير الحالة العقلية

رقيقة مُقيسة

هيوبط حرارة الجسم أو المُمَيَّ

صداع

نقص سكر الدم

أخرى

- أصلية مرتفعة الخطورة*
- التسمم/الابتلاع أو العرض لمادة كيميائية خطيرة*
- طرف معزز للخطر*

لدغة/ثعبان

- الم حاد في الصدر أو البطن (أكبر من 50 سنة)

ختطفي القلب مع إقبال حاد (في حالة إجرائه)

عنف أو عدوانية

سيدة حامل تعاني من أي مما يلي:

صداع شديد

نزيف حاد

الم شديد في البطن

نوبات أو تغير الحالة العقلية

تغيرات بصرية

ضغط الدم الانقباضي ≤ 160 أو ضغط الدم الابتساطي ≤ 110

الطور الغقال للمخاض

الرضوح

نعم

النقل إلى منطقة إنعاش الحالات
المرتفعة الشدة على الفور

*انظر البطاقة المرجعية

المرضى ذوو العلامات
الحيوية المرتفعة الخطورة
تستدعي حالتهم السريرية
إجراء مستوى متقدم من
الفرز أو مراجعة فورية
على يد المسؤول
السريري المشرف



العلامات الحيوية المرتفعة الخطورة				
درجة الحرارة > 36 أو < 39 درجة مئوية				
تشبع الدم المحيطي بالأكسجين < 92% (في حال توافره)				
مقياس AVPU بخلاف A				
معدل التنفس	أقل من سن واحدة	من سن 4-1 سنوات	من سن 12-5 سنوات	من سن 12-5 سنوات
مرتفع	50	40	30	10
منخفض	25	20	10	10
معدل النبض	أقل من سن واحدة	من سن 1-4 سنوات	من سن 12-5 سنوات	من سن 12-5 سنوات
مرتفع	180	160	140	70>
منخفض	90>	80>	70>	70>



النقل إلى منطقة رعاية
الحالات المنخفضة الشدة أو
منطقة الانتظار

أداة الفرز المتكاملة المشتركة بين الوكالات: أقل من 12 سنة

(أعدتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود)

معايير الفئة الحمراء

- غير مستجيب
 - المسالك الهوائية والتتنفس
 - صرير
 - ضلالة تنفسية* أو ذرّاق حول الشفاه*
 - التورّة الدمويّة
 - زمن عودة امتلاء الشعيرات < 3 ثوانٍ
 - ضعف النبض وسرعته
 - نزيف حاد
 - بروادة الأطراف
 - أي عرضين من الأعراض الآتية:
 - خمول
 - تغور العينين
 - بطء شديد في عودة ثانية الجلد بعد قرصها
 - ضعف القرحة على تناول المشروبات
- الاعاقة
- شنجات شطة
 - أي عرضين من الأعراض الآتية:
 - تغّير الحالة العقلية (تشوش، تململ، تهيج أو خمول مستمر)، مع تصلب الرقبة، انخفاض حرارة الجسم أو الحمى.
 - نقص سكر الدم (إذا كان معروفاً)
 - أي رضيع عمره أقل من 8 أيام
 - السن أقل من شهرين ودرجة الحرارة أقل من 36 درجة مئوية أو أكثر من 39 درجة مئوية
 - إصابة مرتفعة الخطورة*
 - طرف معزّز للخطر*
 - آلم حاد في الخصية/الصفن أو القساح
 - لدغة ثعبان
 - التسمم/الابتلاع أو التعرّض لمواد كيميائية خطيرة*
 - سيدة حامل ينطبق عليها معايير البالغين لتصنيفها ضمن الفئة الحمراء

معايير الفئة الصفراء

- المسالك الهوائية والتتنفس
- أي تورّم / كثافة في الفم أو الحلق أو الرقبة
 - أزيز (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحاله ضمن الفئة الحمراء)
- التورّة الدمويّة
- عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب
 - تقوّي كل شيء
 - إسهال مستمر
 - جفاف
 - شعور شديد (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحاله ضمن الفئة الحمراء)
- الإعاقه
- تململ أو خمول أو تهيج مستمر
 - الم شديد
 - أخرى
 - أي رضيع يتراوح عمره بين 8 أيام و 6 أشهر
 - سوء تغذية: هزال شديد واضح أو ونمة في كلتا القدمين
 - إصابة حرق (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحاله ضمن الفئة الحمراء)
 - اعتداء جنسي
 - شخص معروف يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً
 - تفاقم طفح جلدي جديد على مدار ساعات أو نقشر (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحاله ضمن الفئة الحمراء)
 - تعرّض يتطلب علاجاً وقائياً لا يحتمل الانتظار (مثل عضة حربان)
 - الحمل (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحاله ضمن الفئة الحمراء)
 - صداع (لا توجد معايير تستوجب تصنيف الحاله ضمن الفئة الحمراء)

نعم

النقل إلى منطقة العلاج السريري

نعم

النقل إلى منطقة إنعاش الحالات المرتفعة الشدة على الفور

*انظر البطاقة المرجعية


أداة الفرز المتكاملة المشتركة بين الوكالات: *البطاقة المرجعية

معايير أخرى المرتفعة الخطورة

معايير الصائفة التنفسية	
الأطفال	البالغون
تنفس سريع جداً	تنفس سريع جداً أو بطيء جداً
عدم القدرة على التحدث أو الأكل أو الرضاعة الطبيعية	عدم القدرة على التحدث أو المشي دون مساعدة
اتساع فتحتي الأنف، الخُفْخفة	التشنُّش أو النعاس أو الهياج
استخدام العضلات الإضافية (على سبيل المثال، الإيماء بالرأس، انسحاب أسفل الصدر للداخل)	استخدام العضلات الإضافية (الرقبة، بين الأضلاع، البطن)

ابتلاع جسم غريب/ التَّعرُّض

قد لا تؤيد العلامات السريرية وحدها في تحديد جميع من يحتاجون إلىتدخل طارئ. ينبغي في بدئ الأمر تصنيف المرضى الذين يعانون من التَّعرُّض أو ابتلاع مواد قد تتسبب في خطورة مرتفعة في الفتنة الحمراء من أجل التقييم السريري المبكر.



معايير الرضوح المرتفعة الخطورة

حوادث الطرق	اصابات شديدة عامة
حادث تصدام سيارة بسرعة عالية	سقوط من ارتفاع يعادل ضعف طول الشخص
اصطدام سيارة بأحد المشاة أو راكبي الدراجات الهوائية	إصابة مختربة للجسم باستثناء الجزء بعيد عن الركبة/ الكوع مع السيطرة على التزيف
شخص آخر في السيارة نفسها لقي حتفه في موقع الحادثة	إصابة هَرَبِيَّة
حدث تصدام سيارة بدون حزام أمان	رضوح متعددة (اصابات في أماكن متعددة من الجسم)
شخص محبوس في سيارة أو أُلقي منها (بما في ذلك الدراجة النارية)	مريض يعني من اضطراب نزفي أو يتناول مضاد تخثر
	سيدة حامل

الحروق الكبيرة

إصابات استنشاقية	تشير المعايير أدناه إلى الحروق ذات الثخانة الجزئية أو الكاملة
أي حرق يصيب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سنتين أو تتجاوز 70 سنة	حرق يصيب أكثر من 15% من مساحة سطح الجسم

طرف معرض للخطر

مريض يعني من طرف:
- ليس به نبض
- مؤلم ويعلاني من أحد الأعراض التالية: شحوب، ضعف، خَدَر، أو يعني من توُّرم جسيم بعد التَّعرُّض لإصابة شديدة

