

ADULTE (Age ≥ 12)

Rechercher pour les critères ROUGE

Airway & Breathing	Other
Pas de réponse	Traumatisme grave
Stridor	Intoxication ou exposition a des produits chimiques dangereux
Détresse respiratoire ou cyanose	Risque de perte d'un membre
Circulation	Morsure de serpent
Pouls faible ou temps de recoloration cutanée >3sec	Douleur thoracique ou abdominale (>50 ans)
FC <50 ou >150	ECG avec onde d'ischémie
Saignement actif	Violent ou agressif
Disability	Enceinte avec l'une de:
Convulsions en cours	- Saignement
Deux parmi:	- Douleur abdominale intense
- Trouble de la vigilance	- Convulsions
- Nuqalgie	- Cephalées intenses
- Hypothermie or fièvre	- Altération de la vision
- Céphalées	- PAS ≥160 ou PAD ≥110
	- En travail
	- Traumatisme
Hypoglycemie	

NON

OUI

Déplacer dans la zone
HAUT-RISQUE / DÉCHOCAGE

Rechercher pour les critères JAUNE

Vomissements incoercibles ou diarrhée	Douleur intense (pas de critère rouge)
Incapable de manger ni boire	Lésion déformante d'un membre
Paleur intense	Fracture ouvert
Saignement actif (pas de critère rouge)	Luxation suspecte
Syncope récent	Autre trauma/brûlure (pas de critère rouge)
Trouble de la vigilance ou agitation (pas de critère rouge)	Viol
Asthénie intense	Douleur testiculaire/ scrotale ou priapisme
Lésion focale neurologique	Rétention aïgue d'urine
Altération de la vision	Sibilance (pas de critère rouge)
D'apparition brutale d'un rash, ou décollement épidermique (pas de critère rouge)	Lésion nécessitant prise en charge immédiate (ex. morsure d'animale, AES)

OUI

Déplacer au chariot des soins
d'urgences

OUI

Evaluer les risques
vitaux immédiats

FC <60 ou >130

FR <12 ou >30

Temp <36° ou >39°

SpO2 <92%

AVPU apart A

NON

NON

Déplacer au
chariot ou attendre