

# HERRAMIENTA DE TRIAGE INTEGRADO INTERINSTITUCIONAL: EDAD ≥ 12



## 1 VERIFICAR CRITERIOS ROJOS

- Inconsciente, no responde a estímulos

### VÍA AÉREA & RESPIRACIÓN

- Estridor
- Dificultad respiratoria\* o cianosis central

### CIRCULACIÓN

- Pulso débil y rápido
- Sangrado abundante
- FC <50 o >150

### DISCAPACIDAD

- Convulsiones activas
- Dos de las siguientes:
  - Estado mental alterado - Hipotermia o fiebre
  - Cuello rígido - Cefalea
- Hipoglucemia

### OTROS

- Trauma de alto riesgo\*
- Envenenamiento/ingesta o exposición química peligrosa\*
- Extremidad comprometida\*
- Mordedura de serpiente
- Dolor agudo torácico o abdominal (>50 años)
- ECG con isquemia aguda (si se realizó)
- Violento o agresivo

### EMBARAZADA CON:

- Sangrado abundante
- Dolor abdominal severo
- Convulsiones o estado mental alterado
- Cefalea intensa
- Alteraciones visuales
- PAS ≥160 o PAD ≥110
- Trabajo de parto activo
- Trauma

SI

TRASLADO INMEDIATO AL ÁREA DE REANIMACION DE ALTA PRIORIDAD

## 2 VERIFICAR CRITERIOS AMARILLOS

### VÍA AÉREA & RESPIRACIÓN

- Cualquier inflamación/masa en boca, garganta o cuello
- Sibilancias (sin criterios rojos)

### CIRCULACIÓN

- Vómito incoercible o diarrea continua
- Incapaz de comer o beber
- Palidez severa (sin criterios rojos)
- Sangrado continuo (sin criterios rojos)
- Desmayo reciente

### DISCAPACIDAD

- Estado mental alterado o agitado (sin criterios rojos)
- Debilidad general aguda
- Alteraciones neurológicas focales agudas
- Alteración visual aguda
- Dolor agudo (sin criterios rojos)

### OTROS

- Salpullido nuevo que empeora en horas o se descama (sin criterios rojos)
- Deformidad aguda visible en extremidades
- Fractura expuesta
- Sospecha de dislocación
- Otro traumatismo/quemadura (sin criterio rojo)
- Diagnóstico que requiera cirugía urgente
- Agresión sexual
- Dolor agudo testicular/escrotal o priapismo
- Incapacidad para orinar
- Profilaxis urgente post-exposición (ej. mordedura de animal, pinchazo con aguja)
- Embarazada, referida por complicaciones

SI

TRASLADO AL AREA DE TRATAMIENTO CLÍNICO



Pacientes con signos vitales de alto riesgo o si existe preocupación clínica, requieren ascenso en el triage o revisión inmediata por un supervisor clínico.

SI

## 3 VERIFICAR SIGNOS VITALES DE ALTO RIESGO

FC <60 or >130

FR <10 or >30

Temp <36° or >39°

SpO2 <92%

AVDI diferente a A

NO

TRASLADO AL AREA DE BAJA PRIORIDAD O DE ESPERA

# HERRAMIENTA DE TRIAGE INTEGRADO INTERINSTITUCIONAL: EDAD < 12



## 1 VERIFICAR CRITERIOS ROJOS

- Inconsciente, no responde a estímulos

### VÍA AÉREA & RESPIRACIÓN

- Estridor
- Dificultad respiratoria\* o cianosis central

### CIRCULACIÓN

- Llenado capilar >3 seg
- Pulso débil y rápido
- Sangrado abundante
- Extremidades frías
- Dos de los siguientes:
  - Letargo
  - Ojos hundidos
  - Signo del pliegue cutáneo positivo\*
  - Bebe pocos líquidos

### DISCAPACIDAD

- Convulsiones activas
- Estado mental alterado (confundido, inquieto, continuamente irritable o letárgico) y cuello rígido, hipotermia o fiebre
- Hipoglucemia (si se conoce)

### OTROS

- Recién nacido/neonato <8 días de nacido
- Edad <2 meses y temp <36° o >39°C
- Trauma de alto riesgo\*
- Extremidad comprometida\*
- Dolor agudo testicular/escrotal o priapismo
- Mordedura de serpiente
- Envenenamiento/ingesta o exposición química peligrosa\*
- Embarazada con criterio rojo de adulto

SI

TRASLADO INMEDIATO AL ÁREA DE REANIMACION DE ALTA PRIORIDAD

## 2 VERIFICAR CRITERIOS AMARILLOS

### VÍA AÉREA & RESPIRACIÓN

- Cualquier inflamación/masa en boca, garganta o cuello
- Sibilancias (sin criterios rojos)

### CIRCULACIÓN

- Incapaz de comer o beber
- Vomita lo que ingiere
- Diarrea continua
- Deshidratación
- Palidez severa (sin criterios rojos)

### DISCAPACIDAD

- Inquieto, continuamente irritable o letargo
- Dolor severo

### OTROS

- Edad entre 8 días y 6 meses de edad
- Desnutrición con signos de emaciación severa O edema en ambos pies
- Traumatismos/quemaduras (sin criterios rojos)
- Agresión sexual
- Diagnóstico que requiere cirugía urgente
- Salpullido nuevo que empeora en horas o se descama (sin criterios rojos)
- Profilaxis urgente post-exposición (ej. mordedura de animal,)
- Embarazada (sin criterios rojos)
- Cefalea (sin criterios rojos)

SI

TRASLADO AL AREA DE TRATAMIENTO CLÍNICO



Pacientes con signos vitales de alto riesgo o si existe preocupación clínica, requieren ascenso en el triage o revisión inmediata por un supervisor clínico.

SI

## 3 VERIFICAR SIGNOS VITALES DE ALTO RIESGO

Temp <36° or >39°

SpO2 < 92%

AVDI diferente a A

FR	< 1 año	1- 4 años	5-12 años
Alta	50	40	30
Baja	25	20	10
FR	< 1 año	1- 4 años	5-12 años
Alta	180	160	140
Baja	< 90	< 80	< 70

NO

TRASLADO AL AREA DE BAJA PRIORIDAD O DE ESPERA

# TRIAGE INTEGRADO INTERINSTITUCIONAL: \*Tarjeta de Referencia

## Criterios de Trauma de Alto Riesgo

 Trauma General	 Lesiones Causadas por el Tránsito
Caída desde dos veces la altura de la persona	Choque de vehículo a alta velocidad
Trauma penetrante excluyendo la parte distal a la rodilla/codo con sangrado controlado	Peatón o ciclista lesionado por vehículo
Lesión por aplastamiento	Otra persona en el mismo vehículo murió en el lugar del choque
Politraumatismo (lesiones en múltiples partes del cuerpo)	Choque de vehículo sin uso de cinturón de seguridad
Paciente con trastorno hemorrágico o en tratamiento anticoagulante	Atrapado o arrojado desde el vehículo (incluyendo motocicleta)
Embarazada	

### Quemaduras Graves

<small>(Los siguientes criterios se refieren a quemaduras de espesor parcial o total)</small>	Lesión por inhalación
Más del 15% de la superficie corporal	Cualquier quemadura en un rango de edad < 2 o > 70 años
Quemadura circunferencial o que involucra cabeza o cuello	

### Extremidad comprometida

Paciente que se presenta con una extremidad:

- Sin pulso O
- Dolorosa y con una de las siguientes: pálida, débil, entumecida o con edema masivo después de un traumatismo.

## Otros Criterios de Alto Riesgo

### Signos de Dificultad Respiratoria

Adulto	Niño
Respiración muy rápida o muy lenta	Respiración muy rápida
Incapacidad para hablar o caminar sin ayuda	Incapacidad para hablar, comer o amamantar
Confundido, somnoliento o agitado	Aleteo nasal, quejido
Uso de músculos accesorios (cuello, intercostal, abdominal)	Uso de músculos accesorios (p. ej., movimiento de la cabeza, retracción xifoidea)

### Ingesta / Exposición

Es posible que el solo uso de signos clínicos no identifique a todos los que necesitan una intervención urgente. Los pacientes con riesgo de ingestión o exposición de alto riesgo deben ser inicialmente clasificados Rojo para recibir una evaluación clínica temprana.

