

# International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

---

## Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN):

### List 35

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–65) and Recommended (1–31) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 8, 1992*.

## Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

---

## Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.):

### Liste 35

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [Actes off. Org. mond. Santé, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9)] les dénominations ci-dessous sont mises à l'étude par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales proposées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI proposées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–65) et recommandées (1–31) dans la *Liste récapitulative No. 8, 1992*.

## Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

---

## Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.):

### Lista 35

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [Act. Of. Mund. Salud, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–65) y Recomendadas (1–31) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 8, 1992*.

<i>Recommended INN (Latin, English, French, Spanish) DCI Recommandée DCI Recomendada</i>	<i>Chemical name or description and Molecular formula Nom chimique ou description et Formule brute Nombre química o descripción y Fórmula empírica</i>
<b>acidum gadoxeticum</b> gadoxetic acid	dihydrogen [ <i>N</i> -(2 <i>S</i> )-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-( <i>p</i> -ethoxyphenyl)propyl]- <i>N</i> -[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)gadolinate(2-)
acide gadoxétique	dihydrogénéo [ <i>N</i> -(2 <i>S</i> )-2-[bis(carboxyméthyl)amino]-3-(4-éthoxyphényl)propyl]- <i>N</i> -[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]glycinato(5-)gadolinate(2-)
ácido gadoxetico	dihidrógeno [ <i>N</i> -(2 <i>S</i> )-2-[bis(carboximetil)amino]-3-( <i>p</i> -etoxifenil)propil]- <i>N</i> -[2-[bis(carboximetil)amino]etil]glicinato(5-)gadolinato(2-)
	C <sub>23</sub> H <sub>30</sub> GdN <sub>3</sub> O <sub>11</sub>
<b>acidum ibandronicum</b> ibandronic acid	[1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]diphosphonic acid
acide ibandronique	acide [1-hydroxy-3-[méthyl(pentyl)amino]propylidène]bisphosphonique
ácido ibandrónico	ácido [1-hidroxi-3-(metilpentilamino)propilideno]difosfónico
	C <sub>9</sub> H <sub>23</sub> NO <sub>7</sub> P <sub>2</sub>
<b>acidum olpadronicum</b> olpadronic acid	[3-(dimethylamino)-1-hydroxypropylidene]diphosphonic acid
acide olpadronique	acide [3-(diméthylamino)-1-hydroxypropylidène]bisphosphonique
ácido olpadrónico	ácido [3-(dimetilamino)-1-hidroxipropilideno]difosfónico
	C <sub>5</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>7</sub> P <sub>2</sub>
<b>acidum zoledronicum</b> zoledronic acid	(1-hydroxy-2-imidazol-1-ylethylidene)diphosphonic acid
acide zolédronique	acide [1-hydroxy-2-(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)éthylidène]bisphosphonique
ácido zoledrónico	ácido (1-hidroxi-2-imidazol-1-iletiliden)difosfónico
	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> P <sub>2</sub>
<b>acitazanolastum</b> acitazanolast	3'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)oxanilic acid
acitazanolast	acide <i>N</i> -[3-(1 <i>H</i> -tétrazol-5-yl)phényl]oxamique
acitazanolast	ácido 3'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-il)oxanílico
	C <sub>9</sub> H <sub>7</sub> N <sub>5</sub> O <sub>3</sub>

**adefovirum**adefovir [[2-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphonic acidadéfoviro acide [[2-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)éthoxy]méthyl]phosphoniqueadefovir ácido [[2-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)etoxi]metil]fosfónicoC<sub>8</sub>H<sub>12</sub>N<sub>5</sub>O<sub>4</sub>P**afelimomabum**afelimomab immunoglobulin G 3 (mouse monoclonal LU54107 Fab' fragment  $\gamma$ -chain anti-human tumor necrosis factor  $\alpha$ ), disulfide with mouse monoclonal LU54107  $\kappa$ -chain, dimerafélimomab immunoglobuline G 3 (chaîne  $\gamma$  du fragment Fab' de l'anticorps monoclonal de souris LU54107 anti-facteur de nécrose tumorale  $\alpha$  humain), dimère du disulfure avec la chaîne  $\kappa$  de l'anticorps monoclonal de souris LU54107afelimomab inmunoglobulina G 3 (cadena  $\gamma$  del fragmento Fab' del anticuerpo monoclonal de ratón LU54107 anti-factor de necrosis tumoral  $\alpha$  humano), dímero del disulfuro con la cadena  $\kappa$  del anticuerpo monoclonal de ratón LU54107**alniditanum**alniditan 2-[[3-[(*R*)-2-chromanyl]methyl]amino]propyl]amino]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinealniditan N-[(2*R*)-3,4-dihydro-2*H*-chromén-2-yl]méthyl]-N'-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)propan-1,3-diyldiaminealniditan 2-[[3-[(*R*)-2-cromanil]methyl]amino]propyl]amino]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidina  
C<sub>17</sub>H<sub>26</sub>N<sub>4</sub>O**anakinrum**anakinra N<sup>2</sup>-L-methionylinterleukin 1 receptor antagonist (human isoform x reduced)anakinra N<sup>2</sup>-L-méthionylantagoniste du récepteur de l'interleukine-1 (isoforme x humaine réduite)anakinra N<sup>2</sup>-L-metionil antagonista del receptor de interleukina 1 (isoforma x reducida, humana)C<sub>759</sub>H<sub>1186</sub>N<sub>208</sub>O<sub>232</sub>S<sub>10</sub>**anastrozolum**anastrozole  $\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -tetramethyl-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-*m*-benzenediacetonitrileanastrozole 2,2'-diméthyl-2,2'-[5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]benzène-1,3-diyl]=dipropanenitrileanastrozol  $\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -tetrametil-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-*m*-bencendiacionitrioloC<sub>17</sub>H<sub>19</sub>N<sub>5</sub>**apaxifyllinum**

apaxifylline (-)-(S)-8-(3-oxocyclopentyl)-1,3-dipropylxanthine

apaxifylline (-)-(S)-8-(3-oxocyclopentyl)-1,3-dipropyl-3,7-dihydro-1*H*-purine-2,6-dione

apaxifilina (-)-(S)-8-(3-oxociclopentil)-1,3-dipropilxantina

C<sub>16</sub>H<sub>22</sub>N<sub>4</sub>O<sub>3</sub>

<b>aptiganelum</b>	
aptiganel	1-( <i>m</i> -ethylphenyl)-1-methyl-3-(1-naphthyl)guanidine
aptiganel	1-(3-éthylphényl)-1-méthyl-3-(naphtalén-1-yl)guanidine
aptiganel	1-( <i>m</i> -etilfenil)-1-metil-3-(1-naftil)guanidina
	C <sub>20</sub> H <sub>21</sub> N <sub>3</sub>
<b>atexakinum alfa</b>	
atexakin alfa	1-(1-L-alanyl-L-proline)interleukin 6 (human clone HGF15 protein moiety reduced), cyclic (44→50), (73→83)-bis(disulfide)
atexakine alfa	(44→50), (73→83)-bis(disulfure cyclique) de la [1-(1-L-alanyl-L-proline)]= interleukine 6 (partie protéique réduite de la substance issue du clone humain HGF15)
atexakina alfa	1-(1-L-alanil-L-prolina)interleukina 6 (fracción proteica reducida del clon humano HGF15), bis(disulfuro)cíclico (44→50), (73→83)
	C <sub>917</sub> H <sub>1483</sub> N <sub>255</sub> O <sub>288</sub> S <sub>9</sub>
<b>atibepronum</b>	
atibeprone	7-[(5-isopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methoxy]-3,4-dimethylcoumarin
atibéprone	3,4-diméthyl-7-[[5-(1-méthyléthyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]méthoxy]-2 <i>H</i> -chromén-2-one
atibeprona	7-[(5-isopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-il)metoxi]-3,4-dimetilcumarina
	C <sub>17</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> S
<b>atorvastatinum</b>	
atorvastatin	(β <i>R</i> ,δ <i>R</i> )-2-( <i>p</i> -fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoic acid
atorvastatine	acide (3 <i>R</i> ,5 <i>R</i> )-7-[2-(4-fluorophényl)-5-(1-méthyléthyl)-3-phényl-4-[(phényl-amino)carbonyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoïque
atorvastatina	ácido (β <i>R</i> ,δ <i>R</i> )-2-( <i>p</i> -fluorofenil)-β,δ-dihidroxi-5-isopropil-3-fenil-4-(fenilcarbamoi)pírrol-1-heptanoico
	C <sub>33</sub> H <sub>35</sub> FN <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
<b>azimilidum</b>	
azimilide	1-[[5-( <i>p</i> -chlorophenyl)furfurylidene]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]= hydantoin
azimiliide	1-[[[5-(4-chlorophényl)furan-2-yl]méthylène]amino]-3-[4-(4-méthylpipérazin-1-yl)butyl]imidazolidine-2,4-dione
azimilliда	1-[[5-( <i>p</i> -clorofenil)furfurilidén]amino]-3-[4-(4-metil-1-piperazinil)butil]hidantoina
	C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> ClN <sub>5</sub> O <sub>3</sub>
<b>balaziponum</b>	
balazipone	<i>m</i> -(2-acetyl-3-oxo-1-butenyl)benzonitrile
balazipone	3-(2-acétyl-3-oxobut-1-ényl)benzonitrile
balazipona	<i>m</i> -(2-acetil-3-oxo-1-butenil)benzonitrilo
	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>

**balofloxacinum**

balofloxacin

(±)-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)piperidino]-4-oxo-3-quinolincarboxylic acid

balofloxacine

acide (RS)-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-[3-(méthylamino)pipéridin-1-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

balofloxacino

ácido (±)-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-7-[3-(metilamino)=piperidino]-4-oxo-3-quinolincarboxílico

C20H24FN3O4**basifunginum**

basifungin

*N*-[(2*R*,3*R*)-2-hydroxy-3-methylvaleryl]-*N*-methyl-L-valyl-L-phenylalanyl-*N*-methyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-L-allosoleucyl-*N*-methyl-L-valyl-L-leucyl-3-hydroxy-*N*-methyl-L-valine  $\alpha_1$ -lactone

basifungine

 $\alpha_1$ -lactone de la [*N*-[(2*R*,3*R*)-2-hydroxy-3-méthylpentanoyl]-*N*-méthyl-L-valyl]-L-phénylalanyl-(*N*-méthyl-L-phénylalanyl)-L-prolyl-L-allo-isoleucyl-(*N*-méthyl-L-valyl)-L-leucyl-(3-hydroxy-*N*-méthyl-L-valine)

basifungina

*N*-[(2*R*,3*R*)-2-hidroxi-3-metilvaleril]-*N*-metil-L-valil-L-fenilalanil-*N*-metil-L-fenilalanil-L-prolil-L-allosoleucil-*N*-metil-L-valil-L-leucil-3-hidroxi-*N*-metil-L-valina  $\alpha_1$ -lactonaC60H92N8O11**berupipamum**

berupipam

(+)-(5*S*)-5-(5-bromo-2,3-dihydro-7-benzofuranyl)-8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1*H*-3-benzazepin-7-ol

bérupipam

(+)-(S)-5-(5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)-8-chloro-3-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1*H*-3-benzazépin-7-ol

berupipam

(+)-(5*S*)-5-(5-bromo-2,3-dihidro-7-benzofurani)-8-cloro-2,3,4,5-tetrahidro-3-metil-1*H*-3-benzazepin-7-olC19H19BrClNO2**bervastatinum**

bervastatin

ethyl (±)-(3*R*<sup>\*</sup>,5*S*<sup>\*</sup>,6*E*)-7-[4-(*p*-fluorophenyl)spiro[2*H*-1-benzopyran-2,1'-cyclopentan]-3-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate

bervastatine

(±)-(6*E*)-(3*RS*,5*SR*)-7-[4-(4-fluorophényl)spiro[2*H*-chromène-2,1'-cyclopentane]-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-énoate d'éthyle

bervastatina

(±)-(3*R*<sup>\*</sup>,5*S*<sup>\*</sup>,6*E*)-7-[4-(*p*-fluorofenil)espiro[2*H*-1-benzopiran-2,1'-ciclopentan]-3-i]-3,5-dihidroxi-6-heptenoato de etiloC28H31FO5**betasizofiranum**

betasizofiran

scleroglucan or poly[→3(*O*- $\beta$ -D-glucopyranosyl-(1→3)-*O*-[ $\beta$ -D-glucopyranosyl-(1→6)]-*O*- $\beta$ -D-glucopyranosyl-(1→3)-*O*- $\beta$ -D-glucopyranosyl-(1→)] produced by *Sclerotium rolfsii*; relative molecular mass is about 5.10<sup>6</sup>

bétasizofiran

scléroglycan ou poly[→3(*O*- $\beta$ -D-glucopyranosyl-(1→3)-*O*-[ $\beta$ -D-glucopyranosyl-(1→6)]-*O*- $\beta$ -D-glucopyranosyl-(1→3)-*O*- $\beta$ -D-glucopyranosyl-(1→)] produit par *Sclerotium rolfsii*; la masse moléculaire relative est voisine de 5.10<sup>6</sup>

betasizofiran

escleroglucano ó poli[→3(*O*- $\beta$ -D-glucopiranosil-(1→3)-*O*-[ $\beta$ -D-glucopiranosil-(1→6)]-*O*- $\beta$ -D-glucopiranosil-(1→3)-*O*- $\beta$ -D-glucopiranosil-(1→)] producido por *Sclerotium rolfsii*; la masa molecular relativa es aproximadamente de 5.10<sup>6</sup>(C24H40O20)n

<b>bivalirudinum</b>	
bivalirudin	D-phenylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L-asparaginylglycyl-L- $\alpha$ -aspartyl-L-phenylalanyl-L- $\alpha$ -glutamyl-L- $\alpha$ -glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L- $\alpha$ -glutamyl-L- $\alpha$ -glutamyl-L-tyrosyl-L-leucine
bivalirudine	D-phénylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolyl-glycyl-glycyl-glycyl-L-asparaginyl-glycyl-L- $\alpha$ -aspartyl-L-phénylalanyl-L- $\alpha$ -glutamyl-L- $\alpha$ -glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L- $\alpha$ -glutamyl-L- $\alpha$ -glutamyl-L-tyrosyl-L-leucine
bivalirudina	D-fenilalanil-L-proli-L-arginil-L-proliiglicilglicilglicil-L-asparaginilglicil-L- $\alpha$ -aspartil-L-fenilalanil-L- $\alpha$ -glutamil-L- $\alpha$ -glutamil-L-isoleucil-L-proli-L- $\alpha$ -glutamil-L- $\alpha$ -glutamil-L-tyrosil-L-leucina
	C <sub>98</sub> H <sub>138</sub> N <sub>24</sub> O <sub>33</sub>
<b>candesartanum</b>	
candesartan	2-ethoxy-1-[ <i>p</i> -( $\sigma$ -1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylphenyl)benzyl]-7-benzimidazolecarboxylic acid
candésartan	acide 2-éthoxy-1-[4-[2-(1 <i>H</i> -tétrazol-5-yl)phényl]benzyl]-1 <i>H</i> -benzimidazole-7-carboxylique
candesartan	ácido 2-etoxi-1-[ <i>p</i> -( $\sigma$ -1 <i>H</i> -tetrazol-5-ilfenil)bencil]-7-bencimidazolcarboxílico
	C <sub>24</sub> H <sub>20</sub> N <sub>6</sub> O <sub>3</sub>
<b>capecitabinum</b>	
capecitabine	pentyl 1-(5-deoxy- $\beta$ -D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinecarbamate
capécitabine	[1-(5-désoxy- $\beta$ -D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate de pentyle
capecitabina	1-(5-desoxi- $\beta$ -D-ribofuranosil)-5-fluoro-1,2-dihidro-2-oxo-4-pirimidin carbamato de pentilo
	C <sub>15</sub> H <sub>22</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>6</sub>
<b>cartasteinum</b>	
cartasteine	(S)-3-[ <i>N</i> [(R)-2-mercaptopropionyl]glycyl]-4-thiazolidinecarboxylic acid
cartastéine	acide (4 <i>S</i> )-3-[2-[(2 <i>R</i> )-2-mercaptopropanoyl]amino]acétyl]thiazolidine-4-carboxylique
cartasteina	ácido (S)-3-[ <i>N</i> [(R)-2-mercaptopropionil]glicil]-4-tiazolidinecarboxílico
	C <sub>9</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub>
<b>cefluprenatum</b>	
cefluprenam	(-)-(E)-3-[(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> )-7-[2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)glyoxylamido]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-en-3-yl]allyl](carbamoyl-methyl)ethylmethyle ammonium hydroxide, inner salt, 7 <sup>2</sup> -(Z)-[O-(fluoromethyl)=oxime]
céfluprénam	(-)-(2-amino-2-oxoéthyl)[(E)-3-[(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> )-7-[(Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(fluorométhoxy)imino]acétyl]amino]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-én-3-yl]prop-2-ényl]éthylméthyle ammonium
cefluprenam	hidróxido de (-)-(E)-3-[(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> )-7-[2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-il)glioxilamido]-2-carboxi-8-oxo-5-thia-1-azabicielo [4.2.0]oct-2-en-3-il]alil](carbamoiilmetyl)=etilmetilamonio, sal interna, 7 <sup>2</sup> -(Z)-[O-(fluorometil)oxima
	C <sub>20</sub> H <sub>25</sub> FN <sub>8</sub> O <sub>6</sub> S <sub>2</sub>

**cefoselisum**

**cefoselis** (-)-5-amino-2-[[((6*R*,7*R*)-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)glyoxylamido]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl]-1-(2-hydroxyethyl)=pyrazolium hydroxide, inner salt, 7<sup>2</sup>-(*Z*)-(O-methoxyloxime)

**céfosélis**

(-)-5-amino-2-[[((6*R*,7*R*)-7-[[(*Z*)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)=acétyl]amino]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-én-3-yl]=methyl]-1-(2-hydroxyéthyl)-1*H*-pyrazolium

**cefoselis**

(-)-5-amino-2-[[((6*R*,7*R*)-7-[[(*Z*)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(metoxiimino)acetil]=amino]-2-carboxilato-8-oxo-5-thia-1-azabicielo[4.2.0]oct-2-en-3-il]metil]-1-(2 hidroxietil)-1*H*-pirazolio

**cidofovirus**


**cidofovir** [[(S)-2-(4-amino-2-oxo-1(2*H*)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]=phosphonic acid

**cidofovir**

acide [[(1*S*)-2-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2*H*)-yl)-1-(hydroxyméthyl)éthoxy]=methyl]phosphonique

**cidofovir**

ácido [[(1*S*)-2-(4-amino-2-oxo-1(2*H*)-pirimidinil)-1-(hidroximetil)etoxi]metil]=fosfónico

**cilmostimum**


**cilmostim** 1-223-colony-stimulating factor 1 (human clone p3ACSF-69 protein moiety reduced) dímer, cyclic (7→90), (7'→ 90'), (31→31'), (48→139), (48'→ 139'), (102→146), (102'→ 146')-heptakis(disulfure cyclique) du dimère de 1-223-facteur 1 de stimulation des colonies (partie protéique réduite du clone humain p3ACSF-69)

**cilmostime**

(7→90), (7'→ 90'), (31→31'), (48→139), (48'→ 139'), (102→146), (102'→ 146')-heptakis(disulfuro cíclico) del dímero de 1- 223-factor 1 de estimulación de colonias (fracción proteica reducida del clón humano p3ACSF-69)

**cilmostim**

(7→90), (7'→ 90'), (31→31'), (48→139), (48'→ 139'), (102→146), (102'→ 146')-heptakis(disulfuro cíclico) del dímero de 1- 223-factor 1 de estimulación de colonias (fracción proteica reducida del clón humano p3ACSF-69)


**cipamfylline**

**cipamfylline** 8-amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)xanthine

**cipamfylline** 8-amino-1,3-bis(cyclopropylméthyl)-3,7-dihydro-1*H*-purine-2,6-dione

**cipamfilina**

8-amino-1,3-bis(ciclopropilmetil)xantina

**cromoglicas lisetilum**


**cromoglicate lisetil** diethyl 5,5'-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4*H*-1-benzopyran-2-carboxylate], ester with L-lysine

**cromoglicate lisétيل**

(+)-5,5'-[[2-[(2*S*)-2,6-diaminohexanoyl]oxy]propane-1,3-diyl]dioxy]bis(4-oxo-4*H*-chromène-2-carboxylate d'éthyle)

**cromoglicato lisetil**


5,5'-[(2-hidroxitrimetileno)dioxo]bis[4-oxo-4*H*-1-benzopirano-2-carboxilato] de dietilo, éster con L-lisina




<b>dacliximabum</b>	
dacliximab	immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal clone 1H4 $\gamma$ -chain anti-human interleukin 2 receptor), disulfide with human-mouse monoclonal clone 1H4 light chain, dimer
dacliximab	immunoglobuline G 1 (chaîne $\gamma$ de l'anticorps monoclonal du clone homme-souris 1H4 dirigé contre le récepteur de l'interleukine 2 humain), dimère du disulfure avec la chaîne légère de l'anticorps monoclonal du clone homme-souris 1H4
dacliximab	inmunoglobulina G 1 (cadena $\gamma$ del anticuerpo monoclonal del clon humano-murino 1H4 anti-receptor de la interleukina 2 humano), dímero del disulfuro con la cadena ligera del anticuerpo monoclonal del clon humano-murino
	C <sub>6394</sub> H <sub>9888</sub> N <sub>1696</sub> O <sub>2012</sub> S <sub>44</sub>
<b>delavirdinum</b>	
delavirdine	1-[3-(isopropylamino)-2-pyridyl]-4-[(5-methanesulfonamidoindol-2-yl)=carbonyl]piperazine
délavirdine	1-[3-[(1-méthyléthyl)amino]pyridin-2-yl]-4-[[5-[(méthylsulfonyl)amino]-1 <i>H</i> -indol-2-yl]carbonyl]pipérazine
delavirdina	1-[3-(isopropylamino)-2-piridil]-4-[(5-metanosulfonamidoindol-2-il)carbonil]=piperazina
	C <sub>22</sub> H <sub>28</sub> N <sub>6</sub> O <sub>3</sub> S
<b>dexpemedolacum</b>	
dexpemedolac	(1 <i>S,4R</i> )-4-benzyl-1-ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4- <i>b</i> ]indole-1-acetic acid acide 2-[(1 <i>S,4R</i> )-4-benzyl-1-éthyl-1,3,4,9-tétrahydropyrano[3,4- <i>b</i> ]indol-1-yl]=acétique
dexpémédolac	
dexpemedolaco	ácido (1 <i>S,4R</i> )-4-bencil-1-etil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4- <i>b</i> ]indol-1-acético
	C <sub>22</sub> H <sub>23</sub> NO <sub>3</sub>
<b>docetaxelum</b>	
docetaxel	(2 <i>R,3S</i> )- <i>N</i> -carboxy-3-phenylisoserine, <i>N</i> - <i>tert</i> -butyl ester, 13-ester with 5 <i><math>\beta</math></i> -20-epoxy-1,2 <i><math>\alpha</math></i> ,4,7 <i><math>\beta</math></i> ,10 <i><math>\beta</math></i> ,13 <i><math>\alpha</math></i> -hexahydroxytax-11-en-9-one 4-acetate 2-benzoate
docétaxel	(2 <i>R,3S</i> )-3-[(1,1-diméthyléthoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phénylpropanoate de 4-(acétyloxy)-2 <i><math>\alpha</math></i> -(benzoyloxy)-5 <i><math>\beta</math></i> ,20-époxo-1,7 <i><math>\beta</math></i> ,10 <i><math>\beta</math></i> -trihydroxy-9-oxotax-11-én-13 <i><math>\alpha</math></i> -yle
docetaxel	(2 <i>R,3S</i> )- <i>N</i> -carboxi-3-fenilisoserina, <i>N</i> - <i>terc</i> -butil éster, 13-éster con 5 <i><math>\beta</math></i> -20-epoxi-1,2 <i><math>\alpha</math></i> ,4,7 <i><math>\beta</math></i> ,10 <i><math>\beta</math></i> ,13 <i><math>\alpha</math></i> -hexahidroxítax-11-en-9-ona 4-acetato 2-benzoato
	C <sub>43</sub> H <sub>53</sub> NO <sub>14</sub>
<b>ebalzotanum</b>	
ebalzotan	( <i>R</i> )- <i>N</i> -isopropyl-3-(isopropylpropylamino)-5-chromancarboxamide
ébalzotan	(3 <i>R</i> )- <i>N</i> -(1-méthyléthyl)-3-[(1-méthyléthyl)propylamino]-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromène-5-carboxamide
ebalzotan	( <i>R</i> )- <i>N</i> -isopropil-3-(isopropilpropilamino)-5-cromancarboxamida
	C <sub>19</sub> H <sub>30</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>

**efegatranum**


efegatran	<i>N</i> -methyl-D-phenylalanyl- <i>N</i> [(1 <i>S</i> )-1-formyl-4-guanidinobutyl]-L-prolinamide
éfégatran	(2 <i>S</i> )- <i>N</i> [(1 <i>S</i> )-1-formyl-4-guanidinobutyl]-1-[(2 <i>R</i> )-2-(méthylamino)-3-phénylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide
efegatran	<i>N</i> -metil-D-fenilalanil-N[(1 <i>S</i> )-1-formil-4-guanidinobutil]-L-prolinamida

**effetirizinum**

effetirizine	[2-[4-[bis( <i>p</i> -fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid
éflétirizine	acide 2-[2-[4-[bis(4-fluorophényle)méthyl]pipérazin-1-yl]éthoxy]acétique
effetirizina	ácido [2-[4-[bis( <i>p</i> -fluorofenil)metil]-1-piperazinil]etoxi]acético

**elisartanum**

elisartan	( $\pm$ )-1-hydroxyethyl 2-butyl-4-chloro-1-[ <i>p</i> -( <i>o</i> -1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylphenyl)benzyl]-imidazole-5-carboxylate, ethyl carbonate (ester)
élisartan	2-butyl-4-chloro-1-[4-[2-(1 <i>H</i> -tétrazol-5-yl)phényl]benzyl]-1 <i>H</i> -imidazol-5-carboxylate de ( <i>RS</i> )-1-[(éthoxycarbonyl)oxy]éthyle
elisartan	( $\pm$ )-2-butyl-4-cloro-1-[ <i>p</i> -( <i>o</i> -1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylfenil)bencil]imidazol-5-carboxilato, etil carbonato de 1-hidroxietilo (éster)


**epoetinum epsilonum**

epoetin epsilon	1-165-erythropoietin (human clone $\lambda$ HEPOFL13 protein moiety), glycoform $\epsilon$
époétine epsilon	1-165-érythropoétine (partie protéique du clone humain $\lambda$ HEPOFL13), forme glycosylée $\epsilon$
epoetina epsilon	1-165-eritropoietina (fracción proteica del clon humano $\lambda$ HEPOFL13), forma glicosilada $\epsilon$


$\text{C}_{809}\text{H}_{1301}\text{N}_{229}\text{O}_{240}\text{S}_5$   
(for non-glycosylated protein)  
(pour la protéine non glycosylée)  
(fracción proteica no glicosilada)

**eprosartanum**

eprosartan	( <i>E</i> )-2-butyl-1-( <i>p</i> -carboxybenzyl)- $\alpha$ -2-thienylimidazole-5-acrylic acid
éprosartan	acide ( <i>E</i> )-3-[2-butyl-1-(4-carboxybenzyl)-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl]-2-[(2-thiénil)=méthyl]prop-2-énoïque
eprosartan	ácido ( <i>E</i> )-2-butyl-1-( <i>p</i> -carboxibencil)- $\alpha$ -2-fienilimidazol-5-acrílico

**eptacogum alfa (activatum)**

eptacog alfa (activated)	blood-coagulation factor VII (human clone $\lambda$ HVII2463 protein moiety)
eptacog alfa (activé)	facteur VII de coagulation sanguine (partie protéique de la substance issue du clone humain $\lambda$ HVII2463)
eptacog alfa (activado)	factor de coagulación VII (fracción proteica del clon humano $\lambda$ HVII2463)



<b>ersentilidum</b>	
ersentilide	4'-[ <i>(2S)</i> -2-hydroxy-3-[[2-( <i>p</i> -imidazol-1-ylphenoxy)ethyl]amino]propoxy]=methanesulfonanilide
ersentilide	<i>N</i> -[4-[( <i>S</i> )-2-hydroxy-3-[[2-[4-(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)phénoxy]éthyl]amino]propyl]=oxyphénylméthanesulfonamide
ersentilida	4'-[ <i>(2S)</i> -2-hidroxi-3-[[2-( <i>p</i> -imidazol-1-ilfenoxi)etil]amino]propoxi]=metansulfonanilida
	C <sub>21</sub> H <sub>26</sub> N <sub>4</sub> O <sub>5</sub> S
<b>examorelinum</b>	
examorelin	L-histidyl-2-methyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide
examoréline	L-histidyl-(2-méthyl-D-tryptophyl)-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phénylalanyl-L-lysinamide
examorelina	L-histidil-2-metil-D-triptofil-L-alanil-L-triptofil-D-fenilalanil-L-lisinamida
	C <sub>47</sub> H <sub>58</sub> N <sub>12</sub> O <sub>6</sub>
<b>fampridinum</b>	
fampridine	4-aminopyridine
fampridine	pyridin-4-ylamine
fampridina	4-aminopiridina
	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub>
<b>faropenemum</b>	
faropenem	(+)-(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> )-6-[(1 <i>R</i> )-1-hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2 <i>R</i> )-tetrahydro-2-furyl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
faropénem	acide (+)-(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> )-6-[(1 <i>R</i> )-1-hydroxyéthyl]-7-oxo-3-[(2 <i>R</i> )-tétrahydrofuran-2-yl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ène-2-carboxylique
faropenem	ácido (+)-(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> )-6-[(1 <i>R</i> )-1-hidroxietil]-7-oxo-3-[(2 <i>R</i> )-tetrahidro-2-furi]-4-tia-1-azaciclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxílico
	C <sub>12</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>5</sub> S
<b>fenleutonom</b>	
fenleuton	(±)-1-[3-[ <i>m</i> -( <i>p</i> -fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propynyl]-1-hydroxyurea
fenleuton	(±)-1-[(1 <i>RS</i> )-3-[3-(4-fluorophénoxy)phényl]-1-méthylprop-2-ynyl]-1-hydroxyurée
fenleuton	(±)-1-[3-[ <i>m</i> -( <i>p</i> -fluorofenoxi)fenil]-1-metil-2-propinil]-1-hidroxiurea
	C <sub>17</sub> H <sub>15</sub> FN <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
<b>fodipirum</b>	
fodipir	<i>N,N'</i> -ethylenebis[ <i>N</i> -[3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridyl]=methyl]glycine] 5,5'-bis(dihydrogenphosphate)
fodipir	<i>N,N'</i> -éthane-1,2-diylibis[ <i>N</i> -[3-hydroxy-2-méthyl-5-[(phosphonoxy)méthyl]=pyridin-4-yl]méthyl]glycine]
fodipir	<i>N,N'</i> -etilenbis[ <i>N</i> -[3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metil-4-piridil]metil]glicina] 5,5'-bis(dihidrógenofosfato)
	C <sub>22</sub> H <sub>32</sub> N <sub>4</sub> O <sub>14</sub> P <sub>2</sub>

**follitropinum alfa**

follitropin alfa

follicle-stimulating hormone, glycoform  $\alpha$   
 $\alpha$ -subunit:  
 chorionic gonadotropin (human  $\alpha$ -subunit protein moiety reduced)  
 $\beta$ -subunit:  
 follicle-stimulating hormone (human clone  $\lambda$  15B  $\beta$ -subunit protein moiety reduced)

**follitropine alfa**

hormone folliculo-stimulante, forme glycosylée  $\alpha$   
 Sous-unité  $\alpha$  :  
 gonadotropine chorionique (partie protéique réduite de la sous-unité  $\alpha$  humaine)  
 Sous-unité  $\beta$  :  
 hormone folliculo-stimulante (partie protéique réduite de la sous-unité  $\beta$  du clone humain  $\lambda$  15B)

**foltropina alfa**

hormona estimulante del folículo, glicoforma  $\alpha$   
 subunidad  $\alpha$  :  
 gonadotropina coriónica (fracción proteica reducida de la subunidad  $\alpha$  humana)  
 subunidad  $\beta$  :  
 hormona estimulante del folículo (fracción proteica reducida de la subunidad  $\beta$  del clón humano humano  $\lambda$  15B)  
 $\alpha$  : C<sub>437</sub>H<sub>682</sub>N<sub>122</sub>O<sub>134</sub>S<sub>13</sub>  
 $\beta$  : C<sub>538</sub>H<sub>833</sub>N<sub>145</sub>O<sub>171</sub>S<sub>13</sub>

**fradafibanum**

fradafiban

(3S,5S)-5-[(4'-amidino-4-biphenylyl)oxy]methyl]-2-oxo-3-pyrrolidineacetic acid

**fradafiban**

acide 2-[(3S,5S)-5-[(4'-amidinobiphényl-4-yl)oxy]méthyl]-2-oxopyrrolidin-3-yl]acétique

**fradafiban**ácido (3S,5S)-5-[(4'-amidino-4-bifenilil)oxi]metil]-2-oxo-3-pirrolidinacético  
C<sub>20</sub>H<sub>21</sub>N<sub>3</sub>O<sub>4</sub>**fuladectinum**

fuladectin

a mixture of components A<sub>4</sub> and A<sub>3</sub>,  
 component A<sub>4</sub> (major component):  
 4'-[2-[(2aE,4E,5'S,6S,6'R,7R,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-ethyl-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahydro-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxospiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran]-7-yl]oxy]ethyl]-N-methylmethanesulfonanilide  
 component A<sub>3</sub> (minor component):  
 4'-[2-[(2aE,4E,5'S,6S,6'R,7R,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahydro-20,20b-dihydroxy-5',6,6',8,19-pentamethyl-17-oxospiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran]-7-yl]oxy]ethyl]-N-methylmethanesulfonanilide

fuladectine	mélange des constituants A <sub>4</sub> et A <sub>3</sub> , constituant A <sub>4</sub> (constituant principal): <i>N</i> -[4-[2-[(2aE,4E,8E)-(2'R,5'S,6S,6'R,7R,11R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-éthyl-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tétraméthyl-7-oxo-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tétradécahydrospiro[11,15-méthano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadécène-13,2'-[2H]pyran]-7-yl]oxy]éthyl]phényl]- <i>N</i> -méthylméthanesulfonamide constituant A <sub>3</sub> (constituant secondaire): <i>N</i> -[4-[2-[(2aE,4E,8E)-(2'R,5'S,6S,6'R,7R,11R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-20,20b-dihydroxy-5',6,6',8,19-pentaméthyl-7-oxo-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tétradécahydrospiro[11,15-méthano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadécène-13,2'-[2H]pyran]-7-yl]oxy]éthyl]phényl]- <i>N</i> -méthylméthanesulfonamide
fuladectina	mezcla de los componentes A <sub>4</sub> y A <sub>3</sub> , componente A <sub>4</sub> (constituyente principal): 4'-[2-[(2aE,4E,5'S,6S,6'R,7R,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-etil-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahidro-20,20b-dihidrox-5',6,8,19-tetrametil-17-oxospiro[11,15-metano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacicloclooctadecin-13,2'-[2H]piran]-7-il]oxi]etil]- <i>N</i> -metilmetasulfonanilida componente A <sub>3</sub> (constituyente secundario): 4'-[2-[(2aE,4E,5'S,6S,6'R,7R,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahidro-20,20b-dihidrox-5',6,6',8,19-pentametil-17-oxospiro[11,15-metano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacicloclooctadecin-13,2'-[2H]piran]-7-il]oxi]etil]- <i>N</i> -metilmetasulfonanilida
	A <sub>4</sub> : C <sub>42</sub> H <sub>59</sub> NO <sub>10</sub> S + A <sub>3</sub> : C <sub>41</sub> H <sub>57</sub> NO <sub>10</sub> S
gadoversetamidum	
gadoversetamide	[ <i>N,N</i> -bis[2-[(carboxymethyl)[(2-methoxyethyl)carbamoyl]methyl]amino]ethyl]=glycinato(3-)gadolinium
gadoversétamide	[ <i>N,N</i> -bis[2-[(carboxyméthyl)[2-[(2-méthoxyéthyl)amino]-2-oxoéthyl]amino]=éthyl]glycinato(3-)gadolinium
gadoversetamida	[ <i>N,N</i> -bis[2-[(carboximetyl)[(2-metoxietil)carbamoi]metil]amino]etil]=glicinato(3-)gadolino
	C <sub>20</sub> H <sub>34</sub> GdN <sub>5</sub> O <sub>10</sub>
galdansetronum	
galdansetron	(+)-(3 <i>R</i> )-2,3-dihydro-9-methyl-3-[(5-methylimidazol-4-yl)methyl]carbazol-4(1 <i>H</i> )-one
galdansétron	(+)-(3 <i>R</i> )-9-méthyl-3-[(5-méthyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)méthyl]-1,2,3,9-tétrahydro-4 <i>H</i> -carbazol-4-one
galdansetron	(+)-(3 <i>R</i> )-2,3-dihdro-9-metil-3-[(5-metilimidazol-4-il)metil]carbazol-4(1 <i>H</i> )-ona
	C <sub>18</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O
goralatidum	
goralatide	1-[ <i>N</i> <sup>2</sup> -[ <i>N</i> -( <i>N</i> -acetyl-L-séryl)-L-α-aspartyl]-L-lysyl]-L-proline
goralatide	( <i>N</i> -acétyl-L-séryl)-L-α-aspartyl-L-lysyl-L-proline
goralatida	1-[ <i>N</i> <sup>2</sup> -[ <i>N</i> -( <i>N</i> -acetil-L-seril)-L-α-aspartil]-L-lisil]-L-prolina
	C <sub>20</sub> H <sub>33</sub> N <sub>5</sub> O <sub>9</sub>

<b>Idramantonum</b>	
idramantone	5-hydroxy-2-adamantanone
idramantone	5-hydroxytricyclo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]décane-2-one
idramantona	5-hidroxi-2-adamantanona
	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>
<b>Ifetrobanum</b>	
ifetroban	o-[[[(1S,2R,3S,4R)-3-[4-(pentylcarbamoyl)-2-oxazolyl]-7-oxabicyclo-[2.2.1]hept-2-yl]methyl]hydrocinnamic acid
iféetroban	acide 3-[2-[[[(1S,2R,3S,4R)-3-[4-[(pentylamino)carbonyl]oxazol-2-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]méthyl]phényle]propanoïque
ifetroban	ácido o-[[[(1S,2R,3S,4R)-3-[4-(pentilcarbamoi)-2-oxazolil]-7-oxabiciclo-[2.2.1]hept-2-il]metil]hidrocinámico
	C <sub>25</sub> H <sub>32</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
<b>imidaprilatum</b>	
imidaprilat	(4S)-3-[(2S)-N-[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]alanily]-1-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
imidaprilate	acide (S)-3-[[[(S)-2-[[[(S)-1-carboxy-3-phénylpropyl]amino]propanoyl]-1-méthyl-2-oxo-imidazolidine-4-carboxylique
imidaprilat	ácido (4S)-3-[(2S)-N-[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]alanil]-1-metil-2-oxo-4-imidazolidincarboxílico
	C <sub>18</sub> H <sub>23</sub> N <sub>3</sub> O <sub>6</sub>
<b>imiglucerasum</b>	
imiglucerase	495-L-histidineglucosylceramidase (human placenta isoenzyme protein moiety)
imiglucérase	[495-L-histidine]glucosylcéramidase (partie protéique d'isoenzyme de placenta humain)
imiglucerasa	495-L-histidinaglucosilceramidasa (isoenzima de placenta humana, fracción proteica)
	C <sub>2532</sub> H <sub>3843</sub> N <sub>671</sub> O <sub>711</sub> S <sub>16</sub>
<b>Inogatranum</b>	
inogatran	N-[(1 <i>R</i> )-2-cyclohexyl-1-[[[(2S)-2-[(3-guanidinopropyl)carbamoyl]piperidino]=carbonyl]ethyl]glycine
inogatran	acide 2-[[[(1 <i>R</i> )-1-(cyclohexylméthyl)-2-[(2S)-2-[[[(3-guanidinopropyl)amino]=carbonyl]pipéridin-1-yl]-2-oxoéthyl]amino]acétique
inogatran	N-[(1 <i>R</i> )-2-ciclohexil-1-[[[(2S)-2-[(3-guanidinopropil)carbamoi]piperidino]=carbonil]etil]glicina
	C <sub>21</sub> H <sub>38</sub> N <sub>6</sub> O <sub>4</sub>
<b>inolimomabum</b>	
inolimomab	immunoglobulin G 1 (mouse monoclonal B-B10 $\gamma$ -chain anti-human interleukin-2 receptor $\alpha$ -chain), disulfide with mouse monoclonal B-B10 $\kappa$ -chain, dimer
inolimomab	immunoglobuline G 1 (chaîne $\gamma$ de l'anticorps monoclonal de souris B-B10 dirigé contre la chaîne $\alpha$ du récepteur de l'interleukine-2 humain), dimère du disulfure avec la chaîne $\kappa$ de l'anticorps monoclonal de souris B-B10

inolimomab	inmunoglobulina G 1 (cadena $\gamma$ del anticuerpo monoclonal de ratón B-B10 anti-cadena $\alpha$ del receptor de interleukina-2 humana), dímero del disulfuro con la cadena $\kappa$ del anticuerpo monoclonal de ratón B-B10
<b>insulinum lisprum</b>	
insulin lispro	28 <sup>B</sup> -L-lysine-29 <sup>B</sup> -L-prolineinsulin (human)
insuline lispro	[28 <sup>B</sup> -L-lysine-29 <sup>B</sup> -L-proline]insuline humaine
insulina lispro	28 <sup>B</sup> -L-lisina-29 <sup>B</sup> -L-prolinainsulina (humana)
	C <sub>257</sub> H <sub>383</sub> N <sub>65</sub> O <sub>77</sub> S <sub>6</sub>
<b>ipenoxazonum</b>	
ipenoxazone	(+)-(4S,5R)-3-[3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)propyl]-4-isobutyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
ipénoxazole	(+)-(4S,5R)-3-[3-(hexahydro-1H-azépin-1-yl)propyl]-4-(2-méthylpropyl)-5-phényloxazolidin-2-one
ipenoxazona	(+)-(4S,5R)-3-[3-(hexahidro-1H-azepin-1-il)propil]-4-isobutil-5-fenil-2-oxazolidinona
	C <sub>22</sub> H <sub>34</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
<b>irbesartanum</b>	
irbesartan	2-butyl-3-[ <i>p</i> -( <i>o</i> -1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylphenyl)benzyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
irbésartan	2-butyl-3-[4-[2-(1 <i>H</i> -tétrazol-5-yl)phényl]benzyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-4-one
irbesartan	2-butyl-3-[ <i>p</i> -( <i>o</i> -1 <i>H</i> -tetrazol-5-ilfenil)bencil]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ona
	C <sub>25</sub> H <sub>28</sub> N <sub>6</sub> O
<b>itameInum</b>	
itameline	<i>p</i> -chlorophenyl 3-formyl-5,6-dihydro-1(2 <i>H</i> )-pyridinecarboxylate, <i>O</i> -methyloxime
itaméline	(E)-3-[(méthoxyimino)méthyl]-5,6-dihydropyridine-1(2 <i>H</i> )-carboxylate de 4-chlorophényle
itamelina	<i>p</i> -cloroenil 3-formil-5,6-dihidro-1(2 <i>H</i> )-piridinacarboxilato, <i>O</i> -metiloxima
	C <sub>14</sub> H <sub>15</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
<b>lamifibanum</b>	
lamifiban	[[1-[ <i>N</i> -( <i>p</i> -amidinobenzoyl)-L-tyrosyl]-4-piperidyl]oxy]acetic acid
lamifiban	acide 2-[[1-[(2 <i>S</i> )-2-[(4-amidinobenzoyl)amino]-3-(4-hydroxyphényl)=propanoyl]pipéridin-4-yl]oxy]acétique
lamifiban	ácido[[1-[ <i>N</i> -( <i>p</i> -amidinobenzoil)-L-tirosil]-4-piperidil]oxi] acético
	C <sub>24</sub> H <sub>28</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub>
<b>lanperisonum</b>	
lanperisone	(-)-(R)-2-methyl-3-(1-pyrrolidinyl)-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
lanpérisone	(-)-(2 <i>R</i> )-2-méthyl-3-(pyrrolidin-1-yl)-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-one
lanperisona	(-)-(R)-2-metil-3-(1-pirrolidinil)-4'-(trifluorometil)propiofenona
	C <sub>15</sub> H <sub>18</sub> F <sub>3</sub> NO

<b>lanprostorum</b>	
lanproston	( <i>Z</i> )-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> )-2-[( <i>E</i> )-2-[2-[( <i>m</i> -chlorophenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]vinyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid
lanprostone	acide ( <i>5Z</i> )-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> )-2-[( <i>1E</i> )-2-[2-[(3-chlorophénoxy)méthyl]-1,3-dioxolan-2-yl]éthényl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-énoïque
lanproston	ácido ( <i>Z</i> )-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> )-2-[( <i>1E</i> )-2-[2-[( <i>m</i> -clorofenoxy)metyl]-1,3-dioxolan-2-yl]vinil]-3,5-dihidroxiciclopentil]-5-heptenoico
	C <sub>24</sub> H <sub>31</sub> ClO <sub>7</sub>
<b>lenerceptum</b>	
lenercept	1-182-tumor necrosis factor receptor (human reduced), (182→104')-protein with 104-330-immunoglobulin G 1 (human clone pTJ5 Cγ 1 reduced)
lénercept	1-182-récepteur du facteur de nécrose tumorale (humain réduit), (182→104')-protéine avec la 104-330-immunoglobuline G 1 (clone humain pTJ5 Cγ 1 réduit)
lenercept	1-182-receptor del factor de necrosis tumoral (humano reducido), (182→104')-proteína con la 104-330-inmunoglobulina G 1 (clon humano pTJ5 Cγ 1 reducido)
	C <sub>1993</sub> H <sub>3112</sub> N <sub>562</sub> O <sub>624</sub> S <sub>34</sub>
<b>levosemotiadilum</b>	
levosemotiadil	( <i>α</i> )-(S)-2-[5-methoxy-2-[3-[methyl[2-[3,4-(methylenedioxy)phenoxy]ethyl]=amino]propoxy]phenyl]-4-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzothiazin-3(4 <i>H</i> )-one
lévosémotiadiil	( <i>α</i> )-(2 <i>S</i> )-2-[2-[[3-[2-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)éthyl]méthylamino]propyl]oxy]-5-méthoxyphényl]-4-méthyl-2 <i>H</i> -1,4-benzothiazin-3(4 <i>H</i> )-one
levosemotiadil	( <i>α</i> )-(S)-2-[5-metoxi-2-[3-[metil[2-[3,4-(metilenedioxi)fenoxi]etil]=amino]propoxi]fenil]-4-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzotiazin-3(4 <i>H</i> )-ona
	C <sub>29</sub> H <sub>32</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S
<b>lexacalcitolum</b>	
lexacalcitol	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,20 <i>R</i> )-20-[(4-ethyl-4-hydroxyhexyl)oxy]-9,10-secopregna-5,7,10(19)-triene-1 <i>α</i> ,3 <i>β</i> -diol
lexacalcitol	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> )-(20 <i>R</i> )-20-[(4-éthyl-4-hydroxyhexyl)oxy]-9,10-sécoprégna-5,7,10(19)-triène-1 <i>α</i> ,3 <i>β</i> -diol
lexacalcitol	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,20 <i>R</i> )-20-[(4-etyl-4-hidroxihexil)oxi]-9,10-secopregna-5,7,10(19)-trieno-1 <i>α</i> ,3 <i>β</i> -diol
	C <sub>29</sub> H <sub>48</sub> O <sub>4</sub>
<b>lirequinilum</b>	
lirequinil	(3 <i>S</i> )-1-[(10-chloro-6,7-dihydro-4-oxo-3-phenyl-4 <i>H</i> -benzo[a]quinolizin-1-yl)=carbonyl]-3-ethoxypyrrolidine
liréquinil	(3 <i>S</i> )-1-[(10-chloro-4-oxo-3-phényl-6,7-dihydro-4 <i>H</i> -benzo[a]quinolizin-1-yl)=carbonyl]-3-éthoxypyrrolidine
lirequinilo	(3 <i>S</i> )-1-[(10-cloro-6,7-dihidro-4-oxo-3-fenil-4 <i>H</i> -benzo[a]quinolizin-1-il)=carbonil]-3-etoxipirrolidina
	C <sub>26</sub> H <sub>25</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

<b>lisofyllinum</b>	
lisofylline	1-[( <i>R</i> )-5-hydroxyhexyl]theobromine
lisofylline	1-[(5 <i>R</i> )-5-hydroxyhexyl]-3,7-diméthyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dione
lisofilina	1-[( <i>R</i> )-5-hidroxihexil]teobromina
	C <sub>13</sub> H <sub>20</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>
<b>lobucavirum</b>	
lobucavir	9-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> )-2,3-bis(hydroxymethyl)cyclobutyl]guanine
lobucavir	2-amino-9-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> )-2,3-bis(hydroxyméthyl)cyclobutyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-one
lobucavir	9-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> )-2,3-bis(hidroximetil)ciclobutil]guanina
	C <sub>11</sub> H <sub>15</sub> N <sub>5</sub> O <sub>3</sub>
<b>lutropinum alfa</b>	
lutropin alfa	luteinizing hormone (human $\alpha$ -subunit reduced complex human $\beta$ -subunit reduced), glycoform $\alpha$ $\alpha$ -subunit: chorionic gonadotropin (human $\alpha$ -subunit protein moiety reduced) $\beta$ -subunit: luteinizing hormone (human $\beta$ -subunit protein moiety reduced)
lutropine alfa	hormone lutéinisante (complexe de sous-unités $\alpha$ humaine réduite et de sous-unité $\beta$ humaine réduite), forme glycosylée $\alpha$ Sous-unité $\alpha$ : gonadotropine chorionique (partie protéique réduite de la sous-unité $\alpha$ humaine) Sous-unité $\beta$ : hormone luteinizable (partie protéique réduite de la sous-unité $\beta$ humaine)
lutropina alfa	hormona luteinizante (complejo de los subunidades $\alpha$ humana reducida y $\beta$ humana reducida), glicoforma $\alpha$ subunidad $\alpha$ : gonadotropina coriónica (fracción proteica reducida de la subunidad $\alpha$ humana) subunidad $\beta$ : hormona luteinizante (fracción proteica reducida de la subunidad $\beta$ humana) $\alpha$ : C <sub>437</sub> H <sub>682</sub> N <sub>122</sub> O <sub>134</sub> S <sub>13</sub> + $\beta$ : C <sub>577</sub> H <sub>929</sub> N <sub>165</sub> O <sub>161</sub> S <sub>14</sub>
<b>mangafodipirum</b>	
mangafodipir	hexahydrogen (OC-6-13)-[[ <i>N,N'</i> -ethylenabis[ <i>N</i> [[3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridyl]methyl]glycine] 5,5'-bis(phosphato)](8-)]manganate(6-)
mangafodipir	(OC-6-13)-hexahydrogénico[[ <i>N,N'</i> -etano-1,2-diylbis[ <i>N</i> [[3-hydroxy-2-méthyl-5-[(phosphonoxy)méthyl]pyridin-4-yl]méthyl]glycinato](8-)]manganate(6-)]
mangafodipir	hexahidrógeno (OC-6-13)-[ <i>N,N'</i> -etilenbis[ <i>N</i> [[3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metil-4-piridil]metil]glicina] 5,5'-bis(fosfato)](8-)]manganato(6-)
	C <sub>22</sub> H <sub>30</sub> MnN <sub>4</sub> O <sub>14</sub> P <sub>2</sub>

**mapinastinum**

mapinastine

1-(2-ethoxyethyl)-2-[[4-(4-pyrazol-1-ylbutyl)-1-piperazinyl]methyl]=benzimidazole

mapinastine

1-(2-éthoxyéthyl)-2-[[4-[4-(1*H*-pyrazol-1-yl)butyl]pipérazin-1-yl]méthyl]-1*H*-benzimidazole

mapinastina

1-(2-etoxitil)-2-[[4-(4-pirazol-1-ilbutil)-1-piperazinil]metil]bencimidazol

C<sub>23</sub>H<sub>34</sub>N<sub>6</sub>O**mazapertinum**

mazapertine

1-[α-[4-(*o*-isopropoxyphenyl)-1-piperazinyl]-*m*-toluoyl]piperidine

mazapertine

1-[3-[[4-[2-(1-méthyléthoxy)phényl]pipérazin-1-yl]méthyl]benzoyl]pipéridine

mazapertina

1-[α-[4-(*o*-isopropoxifenil)-1-piperazinil]-*m*-toluoil]piperidinaC<sub>26</sub>H<sub>35</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>**mibefradilum**

mibefradil

(1*S*,2*S*)-2-[2-[[3-(2-benzimidazolyl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isopropyl-2-naphthyl methoxyacetate

mibéfradil

2-méthoxyacétate de (1*S*,2*S*)-2-[2-[[3-(1*H*-benzimidazol-2-yl)propyl]méthyl]amino]éthyl]-6-fluoro-1-(1-méthyléthyl)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalén-2-yile

mibefradil

(1*S*,2*S*)-2-[2-[[3-(2-bencimidazolil)propil]metilamino]etil]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahidro-1-isopropil-2-naftil metoxiacetatoC<sub>29</sub>H<sub>38</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>3</sub>**mirisetronum**

mirisetron

1-cyclohexyl-1,4-dihydro-4-oxo-*N*-1*αH*,5*αH*-tropan-3*α*-yl-3-quinoline=carboxamide

mirisétron

1-cyclohexyl-*N*-[(1*R*,3*r*,5*S*)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxamide

mirisetron

1-ciclohexil-1,4-dihidro-4-oxo-*N*-1*αH*,5*αH*-tropan-3*α*-il-3-quinolina=carboxamidaC<sub>24</sub>H<sub>31</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>**mobenakinum**

mobenakin

71-L-serineinterleukin 1β (human clone pIL-1-14 reduced)

mobénakine

[71-L-sérine]interleukine 1β (clone humain pIL-1-14, réduite)

mobenakina

71-L-serinainterleuquina 1β (clon humano pIL-1-14 reducido)

C<sub>773</sub>H<sub>1219</sub>N<sub>201</sub>O<sub>238</sub>S<sub>7</sub>

<b>monteplasum</b>	
monteplase	84-L-serineplasminogen activator (human tissue-type 2-chain form), cyclic (6→36), (32'→48'), (34→43), (40'→109'), (51→73), (56→62), (75→83), (92→173), (113→155), (120'→ 264), (134'→209'), (144→168), (166'→182'), (180→261), (199'→227'), (201→243), (232→256)-heptadecakis(disulfide)
montéplase	(6→36), (32'→48'), (34→43), (40'→109'), (51→73), (56→62), (75→83), (92→173), (113→155), (120'→ 264), (134'→209'), (144→168), (166'→182'), (180→261), (199'→227'), (201→243), (232→256)-heptadécakis(disulfure cyclique) du 84-L-sérine(activateur du plasminogène, humain, de type tissulaire, constitué de deux chaînes)
monteplasa	84-L-serina activador del plasminógeno (tipo tisular humano forma bicatenaria), (6→36), (32'→48'), (34→43), (40'→109'), (51→73), (56→62), (75→83), (92→173), (113→155), (120'→ 264), (134'→209'), (144→168), (166'→182'), (180→261), (199'→227'), (201→243), (232→256)-heptadecakis(disulfuro cíclico)
	<chem>C2569H3896N746O783S39</chem>
<b>moroctocogum alfa</b>	
moroctocog alfa	(1-742)-(1637-1648)-blood-coagulation factor VIII (human reduced) complex with 1649-2332-blood-coagulation factor VIII (human reduced)
moroctocog alfa	complexe du (1-742)-(1637-1648)-facteur VIII de coagulation sanguine (humain réduit) avec le 1649-2332-facteur VIII de coagulation sanguine (humain réduit)
moroctocog alfa	(1-742)-(1637-1648)-factor de coagulación VIII (humano reducido) complejo con 1649-2332-factor de coagulación VIII (humano reducido)
	<chem>C3953H6020N1040O1158S29 + C3553H5412N956O1028S33</chem>
<b>muplestimum</b>	
muplestim	interleukin 3 (human protein moiety reduced)
muplestim	interleukine 3 (partie protéique humaine réduite)
muplestim	interleukina 3 (fracción proteica reducida humana)
	<chem>C670H1076N186O199S5</chem>
<b>nacolomabum tafenatoxum</b>	
nacolomab tafenatox	20-244-immunoglobulin G 1 (mouse monoclonal r-C242Fab-SEA clone pKP941 Fab fragment $\gamma$ -chain anti-human colorectal tumor antigen C242) (244→1')-protein with enterotoxin A ( <i>Staphylococcus aureus</i> ), disulfide with mouse monoclonal r-C242Fab-SEA clone pKP941 $\kappa$ -chain
nacolomab tafénatox	20-244-immunoglobuline G1 (chaîne $\gamma$ du fragment Fab de l'anticorps monoclonal de souris r-C242Fab-SEA, clone pKP941, anti-antigène C242 de tumeur colorectale humaine) (244→1')-protéine avec l'entérotoxine A ( <i>Staphylococcus aureus</i> ), disulfure avec la chaîne $\kappa$ de l'anticorps monoclonal de souris r-C242Fab-SEA, clone pKP941
nacolomab tafenatox	20-244-inmunoglobulina G 1 (cadena $\gamma$ del fragmento Fab del anticuerpo monoclonal de ratón r-C242Fab-SEA, clon pKP941, antiantígeno C 242 de tumor colorrectal humano) (244→1 )-proteína con la enterotoxina A ( <i>Staphylococcus aureus</i> ), disulfuro con la cadena $\kappa$ del anticuerpo monoclonal de ratón r-C242Fab-SEA, clon pKP941

**napsagatranum**

napsagatran

*N*<sup>1</sup>-[*N*<sup>4</sup>-[(3*S*)-1-amidino-3-piperidyl]methyl]-*N*<sup>2</sup>-(2-naphthylsulfonyl)-L-asparaginyl-*N*-cyclopropylglycine

napsagatran

acide 2-[[[(2*S*)-4-[[[(3*S*)-1-amidinopipéridin-3-yl]méthyl]amino]-2-[(naphtalén-2-yl)sulfonyl]amino]-4-oxobutanoyl](cyclopropyl)amino]acétique

napsagatran

*N*<sup>1</sup>-[*N*<sup>4</sup>-[(3*S*)-1-amidino-3-piperidyl]métيل]-*N*<sup>2</sup>-(2-naftilsulfonil)-L-asparaginil-*N*-ciclopropilglicinaC26H34N6O6S**nemorubicinum**

nemorubicin

(1*S,3S*)-3-glycoloyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-3,5,12-trihydroxy-10-methoxy-6,11-dioxo-1-naphthacenyl 2,3,6-trideoxy-3-[(*S*)-2-methoxymorpholino]- $\alpha$ -L-lyxo-hexopyranoside

némorubicine

(8*S,10S*)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacétyl)-1-méthoxy-10-[[3-[(2*S*)-2-methoxymorpholin-4-yl]-2,3,6-tridesoxy- $\alpha$ -L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-7,8,9,10-tétrahydronaphtacène-5,12-dione

nemorubicina

(1*S,3S*)-3-glicoloyl-1,2,3,4,6,11-hexahidro-3,5,12-trihidroxi-10-metoxi-6,11-dioxo-1-naftacenil 2,3,6-tridesoxi-3-[(*S*)-2-metoximorfolino]- $\alpha$ -L-lyxo-hexopiranósidoC32H37NO13**netivudinum**

netivudine

1- $\beta$ -D-arabinofuranosyl-5-(1-propynyl)uracil

nétivudine

1-( $\beta$ -D-arabinofuranosyl)-5-(prop-1-ynyl)pyrimidine-2,4(1*H,3H*)-dione

netivudina

1- $\beta$ -D-arabinofuranosil-5-(1-propinil)uraciloC12H14N2O6**nicanartinum**

nicanartine

2,6-di-*tert*-butyl-4-[3-(3-pyridylmethoxy)propyl]phenol

nicanartine

2,6-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-[3-[(pyridin-3-yl)méthoxy]propyl]phénol

nicanartina

2,6-di-*terc*-butyl-4-[3-(3-piridilmétoxi)propil]fenolC23H33NO2**ocinaplonum**

ocinaplon

2-pyridyl 7-(4-pyridyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl ketone

ocinap lone

(pyridin-2-yl)[7-(pyridin-4-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]méthanone

ocinaplon

2-piridil 7-(4-piridil)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il cetona

C17H11N5O**olopatadinum**

olopatadine

11-[(*Z*)-3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[*b,e*]oxepin-2-acetic acid

olopatadine

acide 2-[11-[(1*Z*)-3-(diméthylamino)propylidène]-6,11-dihydrodibenzo-[*b,e*]oxépin-2-yl]acétique

olopatadina

ácido 11-[(*Z*)-3-(dimetilamino)propilidén]-6,11-dihidrodibenz[*b,e*]oxepin-2-acéticoC21H23NO3

**ontazolastum**

ontazolast

2-[(*S*)-2-cyclohexyl-1-(2-pyridyl)ethyl]amino]-5-methylbenzoxazole

ontazolast

[(1*S*)-2-cyclohexyl-1-(pyridin-2-yl)éthyl](5-méthylbenzoxazol-2-yl)amine

ontazolast

2-[(*S*)-2-cyclohexyl-1-(2-piridil)ethyl]amino]-5-metilbenzoxazolC21H25N3O**orientiparcinum**

orientiparcin

a mixture of orienticine A and orienticine D,

orienticine A (major component):

(-)-(3*S*,6*R*,7*R*,22*R*,23*S*,26*S*,36*R*,38*aR*)-22-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-*C*-methyl- $\alpha$ -L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-44-[[2-*O*-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-*C*-methyl- $\alpha$ -L-arabino-hexopyranosyl)- $\beta$ -D-glucopyranosyl]oxy]-3-(carbamoylmethyl)-19-chloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,28,30,32-tetrahydroxy-6-[(2*R*)-4-methyl-2-(methyllamino)valeramido]-2,5,24,38,39-pentaoxo-22*H*-8,11:18,21-dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1*H*,16*H*-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-*m*][10,2,16]benzoxadiazia=cyclotetracosine-26-carboxylic acid

orienticine D (minor component) :

(-)-(3*S*,6*R*,7*R*,22*R*,23*S*,26*S*,36*R*,38*aR*)-22-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-*C*-methyl- $\alpha$ -L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-44-[[2-*O*-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-*C*-methyl- $\alpha$ -L-arabino-hexopyranosyl)- $\beta$ -D-glucopyranosyl]oxy]-3-(carbamoylmethyl)-19-chloro-6-[(2*R*)-2-(dimethylamino)-4-methylvaleramido]-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,28,30,32-tetrahydroxy-2,5,24,38,39-pentaoxo-22*H*-8,11:18,21-dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1*H*,16*H*-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-*m*][10,2,16]benzoxadiazia=cyclotetracosine-26-carboxylic acid

**orientiparcine**

mélange d'orienticine A et d'orienticine D,

orienticine A (constituant principal):


acide (3*S*,6*R*,7*R*,22*R*,23*S*,26*S*,36*R*,38*aR*)-22-[(3-amino-3-*C*-méthyl-2,3,6-tridésoxy- $\alpha$ -L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-44-[[2-*O*-(3-amino-3-*C*-méthyl-2,3,6-tridésoxy- $\alpha$ -L-arabino-hexopyranosyl)- $\beta$ -D-glucopyranosyl]oxy]-3-(carbamoylméthyl)-19-chloro-7,28,30,32-tétrahydroxy-6-[(*R*)-4-méthyl-2-(méthyllamino)pentanoyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tétradécahydro-8,11:18,21-diétheno-23,36-(iminométhano)-22*H*-13,16:31,35-dimétheno-1*H*,13*H*-[1,6,9]oxadiazacyclohexadécino[4,5-*m*][10,2,16]benzoxadiazia=cyclotétracosène-26-carboxylique

orienticine D (constituant secondaire):

acide (3*S*,6*R*,7*R*,22*R*,23*S*,26*S*,36*R*,38*aR*)-22-[(3-amino-3-*C*-méthyl-2,3,6-tridésoxy- $\alpha$ -L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-44-[[2-*O*-(3-amino-3-*C*-méthyl-2,3,6-tridésoxy- $\alpha$ -L-arabino-hexopyranosyl)- $\beta$ -D-glucopyranosyl]oxy]-3-(carbamoylméthyl)-19-chloro-7,28,30,32-tétrahydroxy-6-[(*R*)-2-(diméthylamino)-4-méthylpentanoyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tétradécahydro-8,11:18,21-diétheno-23,36-(iminométhano)-22*H*-13,16:31,35-dimétheno-1*H*,13*H*-[1,6,9]oxadiazacyclohexadécino[4,5-*m*][10,2,16]benzoxadiazia=cyclotétracosène-26-carboxylique

**orientiparcina**

mezcla de orienticina A y de orienticina D,  
 orienticina A (constituyente principal):  
 ácido (3*S*,6*R*,7*R*,22*R*,23*S*,26*S*,36*R*,38a*R*)-22-[(3-amino-3-C-metil-2,3,6-tridesoxi- $\alpha$ -L-arabino-hexopiranosil)oxi]-44-[[2-O-(3-amino-3-C-metil-2,3,6-tridesoxi- $\alpha$ -L-arabino-hexopiranosil)- $\beta$ -D-glucopiranosil]oxi]-3-(carbamoilmetil)-19-cloro-7,28,30,32-tetrahidroxi-6-[(*R*)-4-metil-2-(metilamino)pentanoil]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahidro-8,11:18,21-dieten-23,36-(íminometano)-22*H*-13,16:31,35-dimeteno-1*H*,13*H*-[1,6,9]oxadiazaciclohexadecino[4,5-*m*][10,2,16]=benzoxadiazaciclotetracoseno-26-carboxílico  
 orienticina D (constituyente secundario):  
 ácido (3*S*,6*R*,7*R*,22*R*,23*S*,26*S*,36*R*,38a*R*)-22-[(3-amino-3-C-metil-2,3,6-tridesoxi- $\alpha$ -L-arabino-hexopiranosil)oxi]-44-[[2-O-(3-amino-3-C-metil-2,3,6-tridesoxi- $\alpha$ -L-arabino-hexopiranosil)- $\beta$ -D-glucopiranosil]oxi]-3-(carbamoilmetil)-19-cloro-7,28,30,32-tetrahidroxi-6-[(*R*)-2-(dimetilamino)-4-metilpentanoil]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahidro-8,11:18,21-dieten-23,36-(íminometano)-22*H*-13,16:31,35-dimeteno-1*H*,13*H*-[1,6,9]oxadiazaciclohexadecino[4,5-*m*][10,2,16]benzoxadiazaciclotetracoseno-26-carboxílico

**paclitaxelum**  
**paclitaxel**


(2*a**R*,4*S*,4*a**S*,6*R*,9*S*,11*S*,12*S*,12*a**R*,12*b**S*)-1,2*a*,3,4,4*a*,6,9,10,11,12,12*a*,12*b*-dodecahydro-4,6,9,11,12,12*b*-hexahidroxy-4*a*,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5*H*-cyclodeca[3,4]benz[1,2-*b*]oxet-5-one 6,12*b*-diacetate, 12-benzoate, 9-ester with (2*R*,3*S*)-*N*-benzoyl-3-phenylisoserine

**paclitaxel**

(2*R*,3*S*)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phénylpropanoate de (2*a**R*,4*S*,4*a**S*,6*R*,9*S*,11*S*,12*S*,12*a**R*,12*b**S*)-6,12*b*-bis(acétyloxy)-12-(benzoyloxy)-4,11-dihidroxy-4*a*,8,13,13-tétraméthyl-5-oxo-2*a*,3,4,4*a*,5,6,9,10,11,12,12*a*,12*b*-dodécahydro-7,11-méthano-1*H*-cyclodéca[3,4]benzo[1,2-*b*]oxét-9-yle

**paclitaxel**

(2*a**R*,4*S*,4*a**S*,6*R*,9*S*,11*S*,12*S*,12*a**R*,12*b**S*)-1,2*a*,3,4,4*a*,6,9,10,11,12,12*a*,12*b*-dodecahidro-4,6,9,11,12,12*b*-hexahidroxi-4*a*,8,13,13-tetrametil-7,11-metano-5*H*-ciclodeca[3,4]benz[1,2-*b*]oxet-5-ona 6,12*b*-diacetato, 12-benzoato, 9-ester con (2*R*,3*S*)-*N*-benzoiol-3-fenilisoserina

**pazufloxacinum**  
**pazufloxacin**


(*2S*)-10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7*H*-pyrido[1,2,3-*de*]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid

**pazufloxacine**

ácido (*2S*)-10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-3-méthyl-7-oxo-2,3-dihydro-7*H*-pyrido[1,2,3-*de*]-1,4-benzoxazine-6-carboxylique

**pazufloxacino**

ácido (*2S*)-10-(1-aminociclopropil)-9-fluoro-2,3-dihidro-3-metil-7-oxo-7*H*-pirido[1,2,3-*de*]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico



<b>pegorgoteinum</b>	
pegorgotein	superoxide dismutase, reaction product with succinic anhydride, esters with polyethylene glycol monomethyl ether
pégorgotéine	esters du produit de réaction de l'anhydride succinique sur la superoxyde dismutase et de monoéther méthylique de polyéthylèneglycol
pegorgotein	esteres del producto de reacción del anhídrido succínico con la superóxido dismutasa y del monoéster metílico del polietilenglicol
<b>perospiromum</b>	
perospirone	<i>cis</i> -N-[4-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]butyl]-1,2-cyclohexane=dicarboximide
pérospirone	<i>cis</i> -2-[4-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)pipérazin-1-yl]butyl]hexahydro-2H-isodiole-1,3-dione
perospirona	<i>cis</i> -N-[4-[4-(1,2-bencisotiazol-3-il)-1-piperazinil]butil]-1,2-ciclohexano=dicarboximida
	C <sub>23</sub> H <sub>30</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S
<b>pimilprostum</b>	
pimilprost	(+)-methyl [2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>a</i> <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>a</i> <i>S</i> )-octahydro-5-hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> )-3-hydroxy-5-methyl-1-nonenyl]-2-pentalenyl]ethoxy]acetate
pimilprost	(+)-2-[2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>a</i> <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>a</i> <i>S</i> )-5-hydroxy-4-[( <i>E</i> )-(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> )-3-hydroxy-5-méthylnon-1-ényl]octahydropentalen-2-yl]éthoxy]acétate de méthyle
pimilprost	(+)-2-[2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>a</i> <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>a</i> <i>S</i> )-5-hidroxi-4-[( <i>E</i> )-(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> )-3-hidroxi-5-metilnon-1-enil]octahidropentalen-2-il]etoxi]acetato de metilo
	C <sub>23</sub> H <sub>40</sub> O <sub>5</sub>
<b>premafloxacinum</b>	
premafloxacin	1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(3 <i>R</i> )-3-[(1 <i>S</i> )-1-(methylamino)ethyl]-1-pyrrolidinyl]-4-oxo-3-quinolincarboxylic acid
prémafloxacine	acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-[(3 <i>R</i> )-3-[(1 <i>S</i> )-1-(méthylamino)=éthyl]pyrrolidin-1-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique
premafloxacino	ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-7-[(3 <i>R</i> )-3-[(1 <i>S</i> )-1-(metilamino)etyl]-1-pirrolidinil]-4-oxo-3-quinolincarboxílico
	C <sub>21</sub> H <sub>26</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>4</sub>
<b>priliximabum</b>	
priliximab	immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal cm-T412 anti-human antigen CD 4), disulfide with human-mouse monoclonal cm-T412 κ-chain, dimer
priliximab	immunoglobuline G1 (anticorps monoclonal homme-souris cm-T412 anti-antigène CD 4 humain), dimère du disulfure avec la chaîne κ de l'anticorps monoclonal homme-souris cm-T412
priliximab	inmunoglobulina G 1 (anticuerpo monoclonal hombre-ratón cm-T412 anti-antígeno CD 4 humano),dímero del disulfuro con la cadena κ del anticuerpo monoclonal hombre-ratón cm-T412

<b>prulifloxacinum</b>	
prulifloxacin	( $\pm$ )-7-[4-[(Z)-2,3-dihydroxy-2-butenyl]-1-piperazinyl]-6-fluoro-1-methyl-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid, cyclic carbonate
prulifloxacine	acide ( $\pm$ )-(1RS)-6-fluoro-1-méthyl-7-[4-[(5-méthyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)=méthyl]pipérazin-1-yl]-4-oxo-4H-[1,3]thiazéto[3,2-a]quinoléine-3-carboxylique
prulifloxacino	ácido ( $\pm$ )-7-[4-[(Z)-2,3-dihidroxi-2-butenil]-1-piperazinil]-6-fluoro-1-metil-4-oxo-1H,4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]quinolina-3-carboxílico, carbonato cíclico
	C <sub>21</sub> H <sub>20</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>6</sub> S
<b>quiflaponum</b>	
quiflapon	3-( <i>tert</i> -butylthio)-1-( <i>p</i> -chlorobenzyl)- $\alpha,\alpha$ -dimethyl-5-(2-quinolylmethoxy)=indole-2-propionic acid
quiflapon	acide 3-[1-(4-chlorobenzyl)-3-[(1,1-diméthylethyl)thio]-5-[(quinoléin-2-yl)=méthoxy]-1H-indol-2-yl]-2,2-diméthylpropanoïque
quiflapon	ácido 3-( <i>terc</i> -butiltio)-1-( <i>p</i> -clorobencil)- $\alpha,\alpha$ -dimetil-5-(2-quinolilmetoxi)indol-2-propiónico
	C <sub>34</sub> H <sub>35</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub> S
<b>regavirumabum</b>	
regavirumab	immunoglobulin G 1 (human monoclonal $\gamma$ -chain anti-human cytomegalovirus glycoprotein B), disulfide with human monoclonal $\kappa$ -chain, dimer
régavirumab	immunoglobuline G1 (chaîne $\gamma$ de l'anticorps monoclonal humain anti-glycoprotéine B de cytomégalovirus humain), dimère du disulfure avec la chaîne $\kappa$ de l'anticorps monoclonal humain
regavirumab	inmunoglobulina G 1 (cadena $\gamma$ del anticuerpo monoclonal humano antiglicoproteína B de Citomegalovirus humano), dímero del disulfuro con la cadena $\kappa$ del anticuerpo monoclonal humano
<b>rocepafantum</b>	
rocepafant	6-( <i>o</i> -chlorophenyl)-7,10-dihydro-1-methylthio-4H-pyrido[4',3':4,5]thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-9(8H)-carboxy- <i>p</i> -anisidine
rocépafant	6-(2-chlorophényl)- <i>N</i> -(4-méthoxyphényl)-1-méthyl-7,10-dihydro-4H-pyrido-[4',3':4,5]thiéno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazépine-9(8H)-carbothioamide
rocepafant	6-( <i>o</i> -clorofenil)-7,10-dihidro-1-metiltio-4H-pirido[4',3':4,5]tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina-9(8H)-carboxi- <i>p</i> -anisidida
	C <sub>26</sub> H <sub>23</sub> ClN <sub>6</sub> OS <sub>2</sub>
<b>rofleponidum</b>	
rofleponide	6 $\alpha$ ,9-difluoro-11 $\beta$ ,16 $\alpha$ ,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, cyclic (R)-16,17-acetal with butyraldehyde
rofléponide	16 $\alpha$ ,17-[(1R)-butylidènedioxy]-6 $\alpha$ ,9-difluoro-11 $\beta$ ,21-dihydroxyprég-4-ène-3,20-dione
rofleponida	6 $\alpha$ ,9-difluoro-11 $\beta$ ,16 $\alpha$ ,17,21-tetrahidroxipregn-4-eno-3,20-diona,(R)-16,17-acetal cílico con butiraldehído
	C <sub>25</sub> H <sub>34</sub> F <sub>2</sub> O <sub>6</sub>

<b>ruzadolatum</b>	
ruzadolane	3-[[2-[4-(2,4-difluorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl] thio]-s-triazolo[4,3-a]pyridine
ruzadolane	3-[[2-[4-(2,4-difluorophényle)pipérazin-1-yl]éthyl]thio]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
ruzadolano	3-[[2-[4-(2,4-difluorofenil)-1-piperazinil]etil]thio]-s-triazolo[4,3-a]piridina
	C <sub>18</sub> H <sub>19</sub> F <sub>2</sub> N <sub>5</sub> S
<b>samixogrelum</b>	
samixogrel	(E)-6-[p-[2-(p-chlorobenzenesulfonamido)ethyl]phenyl]-6-(3-pyridyl)-5-hexenoic acid
samixogrel	acide (5E)-6-[4-[2-[(4-chlorophényl)sulfonyl]amino]éthyl]phényl]-6-(pyridin-3-yl)hex-5-énoïque
samixogrel	ácido(E)-6-[p-[2-(p-clorobencensulfonamido)etil]fenil]-6-(3-piridil)-5-hexenoico
	C <sub>25</sub> H <sub>25</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S
<b>sanfetrinemum</b>	
sanfetrinem	(1S,5S,8aS,8bR)-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydro-1-[(R)-1-hydroxyethyl]-5-methoxy-2-oxoazeto[2,1-a]isoindole-4-carboxylic acid
sanfétrinem	acide (1S,5S,8aS,8bR)-1-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéo[2,1-a]iso-indole-4-carboxylique
sanfetrinem	ácido(1S,5S,8aS,8bR)-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahidro-1-[(R)-1-hidroxietil]-5-metoxi-2-oxoazeto[2,1-a]isoindol-4-carboxílico
	C <sub>14</sub> H <sub>19</sub> NO <sub>5</sub>
<b>saprissartanum</b>	
saprissartan	1-[[3-bromo-2-[o-(1,1,1-trifluoromethanesulfonamido)phenyl]-5-benzofuranyl]methyl]-4-cyclopropyl-2-ethylimidazole-5-carboxamide
saprissartan	1-[[3-bromo-2-[2-[(trifluorométhyl)sulfonyl]amino]phényl]benzofuran-5-yl]méthyl]-4-cyclopropyl-2-éthyl-1H-imidazole-5-carboxamide
saprissartan	1-[[3-bromo-2-[o-(1,1,1-trifluorometansulfonamido)fenil]-5-benzofuranyl]metil]-4-ciclopropil-2-etylimidazol-5-carboxamida
	C <sub>25</sub> H <sub>22</sub> BrF <sub>3</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub> S
<b>seprilosum</b>	
seprilose	3-O-heptyl-1,2-O-isopropylidene- $\alpha$ -D-glucofuranose
séprilose	3-O-heptyl-1,2-O-(1-méthyléthylidène)- $\alpha$ -D-glucofuranose
sepnlosa	3-O-heptil-1,2-O-isopropiliden- $\alpha$ -D-glucofuranosa
	C <sub>16</sub> H <sub>30</sub> O <sub>6</sub>
<b>setipafantum</b>	
setipafant	6-(o-chlorophenyl)-7,10-dihydro-1-methyl-4H-pirido[4',3':4,5]thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-9(8H)-carbox- <i>p</i> -anisidine
sétipafant	6-(2-chlorophényle)-N-(4-méthoxyphényle)-1-méthyl-7,10-dihydro-4H-pirido[4',3':4,5]thiéno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazépine-9(8H)-carboxamide
setipafant	6-(o-clorofenil)-7,10-dihidro-1-metil-4H-pirido[4',3':4,5]tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina-9(8H)-carboxi- <i>p</i> -anisidida
	C <sub>26</sub> H <sub>23</sub> CIN <sub>6</sub> O <sub>2</sub> S

<b>tagorizinum</b>	
tagorizine	(E)-N-[4-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]butyl]-6-methyl-3-pyridine=acrylamide
tagorizine	(2E)-N-[4-[4-(diphénylméthyl)pipérazin-1-yl]butyl]-3-(6-méthylpyridin-3-yl)prop-2-énamide
tagorizina	(E)-N-[4-[4-(difenilmetil)-1-piperazinil]butil]-6-metil-3-piridinacrilamida
	C <sub>30</sub> H <sub>36</sub> N <sub>4</sub> O
<b>talsaclidinum</b>	
talsaclidine	(3R)-3-(2-propynyloxy)quinuclidine
talsaclidine	(3R)-3-(prop-2-ynyloxy)-1-azabicyclo[2.2.2]octane
talsaclidina	(3R)-3-(2-propiniloxi)quinuclidina
	C <sub>10</sub> H <sub>15</sub> NO
<b>tasosartanum</b>	
tasosartan	5,8-dihydro-2,4-dimethyl-8-[ <i>p</i> -( <i>o</i> -1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylphenyl)benzyl]pyrido[2,3- <i>d</i> ]pyrimidin-7(6 <i>H</i> )-one
tasosartan	2,4-diméthyl-8-[4-[2-(1 <i>H</i> -tétrazol-5-yl)phényl]benzyl]-5,8-dihydro=pyrido[2,3- <i>d</i> ]pyrimidin-7(6 <i>H</i> )-one
tasosartan	5,8-dihidro-2,4-dimetil-8-[ <i>p</i> -( <i>o</i> -1 <i>H</i> -tetrazol-5-ilfenil)bencil]pirido[2,3- <i>d</i> ]pirimidin-7(6 <i>H</i> )-ona
	C <sub>23</sub> H <sub>21</sub> N <sub>7</sub> O
<b>tazarotenum</b>	
tazarotene	ethyl 6-[(4,4-dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl]nicotinate
tazarotène	6-[2-(4,4-diméthyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzothiin-6-yl)éthynyl]pyridine-3-carboxylate d'éthyle
tazaroteno	6-[(4,4-dimetiltiocroman-6-il)etinil]nicotinato de etilo
	C <sub>21</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>2</sub> S
<b>teverelixum</b>	
teverelix	<i>N</i> -acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl- <i>p</i> -chloro-L-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl- <i>N</i> <sup>6</sup> -carbamoyl-D-lysyl-L-leucyl- <i>N</i> <sup>6</sup> -isopropyl-L-lysyl-L-prolyl-D-alaninamide
tévérélix	[ <i>N</i> -acétyl-3-(naphtalén-2-yl)-D-alanyl]-( <i>4</i> -chloro-L-phénylalanyl)-[3-(pyridin-3-yl)-D-alanyl]-L-séryl-L-tyrosyl-[ <i>N</i> <sup>6</sup> -(aminocarbonyl)-D-lysyl]-L-leucyl-[ <i>N</i> <sup>6</sup> -(1-méthyléthyl)-L-lysyl]-L-prolyl-D-alaninamide
teverelix	[ <i>N</i> -acetil-3-(naftalen-2-il)-D-alanil]-[4-cloro-L-fenilalanil]-[3-(piridin-3-il)-D-alanil]-L-seril-L-tirosil-[ <i>N</i> <sup>6</sup> -(aminocarbonil)-D-lisil]-L-leucil-[ <i>N</i> <sup>6</sup> -(1-metiletil)-L-lisil]-L-proll-D-alaninamida
	C <sub>74</sub> H <sub>100</sub> ClN <sub>15</sub> O <sub>14</sub>
<b>toborinonum</b>	
toborinone	(±)-6-[2-hydroxy-3-(veratrilamino)propoxy]carbostyriI
toborinone	(±)-6-[(2RS)-3-[(3,4-diméthoxybenzyl)amino]-2-hydroxypropyl]oxy]quinoléin-2(1 <i>H</i> )-one
toborinona	(±)-6-[2-hidroxi-3-(veratrilamino)propoxi]carbostiril
	C <sub>21</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>

<b>vedaprofenum</b>	
vedaprofen	( $\pm$ )-4-cyclohexyl- $\alpha$ -methyl-1-naphthaleneacetic acid
védaprofène	acide ( <i>RS</i> )-2-(4-cyclohexylnaphtalén-1-yl)propanoïque
vedaprofeno	ácido ( $\pm$ )-4-ciclohexil- $\alpha$ -metil-1-naftalenacético
	C <sub>19</sub> H <sub>22</sub> O <sub>2</sub>
<b>versetamidum</b>	
versetamide	<i>N,N</i> -bis[2-[(carboxymethyl)[(2-methoxyethyl)carbamoyl]methyl]amino]ethyl]-glycine
versétamide	<i>N,N</i> -bis[2-[(carboxyméthyl)[2-[(2-méthoxyéthyl)amino]-2-oxoéthyl]amino]-éthyl]glycine
versetamida	<i>N,N</i> -bis[2-[(carboximetil)[(2-metoxietil)carbamoi]metil]amino]etil]glicina
	C <sub>20</sub> H <sub>37</sub> N <sub>5</sub> O <sub>10</sub>
<b>verteporfinum</b>	
verteporfin	a mixture (50:50) of : ( $\pm$ )- <i>trans</i> -3,4-dicarboxy-4,4a-dihydro-4a,8,14,19-tetramethyl-18-vinyl-23H,25H-benzo[ <i>b</i> ]porphine-9,13-dipropionic acid, 3,4,9-trimethyl ester and ( $\pm$ )- <i>trans</i> -3,4-dicarboxy-4,4a-dihydro-4a,8,14,19-tetramethyl-18-vinyl-23H,25H-benzo[ <i>b</i> ]porphine-9,13-dipropionic acid, 3,4,13-trimethyl ester
vertéporfine	mélange sensiblement équimoléculaire : d'acide 3-[( $\pm$ )- <i>trans</i> -18-éthényl-3,4-bis(méthoxycarbonyl)-13-[2-(méthoxycarbonyl)éthyl]-4a,8,14,19-tétraméthyl-4,4a-dihydro-23H,25H-benzo[ <i>b</i> ]porphyrin-9-yl]propanoïque et d'acide 3-[( $\pm$ )- <i>trans</i> -18-éthényl-3,4-bis(méthoxycarbonyl)-9-[2-(méthoxycarbonyl)éthyl]-4a,8,14,19-tétraméthyl-4,4a-dihydro-23H,25H-benzo[ <i>b</i> ]porphyrin-13-yl]propanoïque
verteporfina	mezcla (50:50) del : 3,4,9-trimétíl ester del ácido ( $\pm$ )- <i>trans</i> -3,4-dicarboxi-4,4a-dihidro-4a,8,14,19-tetrametil-18-vinil-23H,25H-benzo[ <i>b</i> ]porfina-9,13-dipropiónico, con el 3,4,13-trimétíl ester del ácido ( $\pm$ )- <i>trans</i> -3,4-dicarboxi-4,4a-dihidro-4a,8,14,19-tetrametil-18-vinil-23H,25H-benzo[ <i>b</i> ]porfina-9,13-dipropiónico
	C <sub>41</sub> H <sub>42</sub> N <sub>4</sub> O <sub>8</sub>
<b>zafirlukastum</b>	
zafirlukast	cyclopentyl 3-[2-methoxy-4-[( <i>o</i> -tolylsulfonyl) carbamoyl]benzyl]-1-methylindole-5-carbamate
zafirlukast	[3-[2-méthoxy-4-[[[(2-méthylphényl)sulfonyl]amino]carbonyl]benzyl]-1-méthyl-1 <i>H</i> -indol-5-yl]carbamate de cyclopentyle
zafirlukast	ciclopentil 3-[2-metoxi-4-[( <i>o</i> -tolilsulfonil)carbamoi]bencil]-1-metilindol-5-carbamato
	C <sub>31</sub> H <sub>33</sub> N <sub>3</sub> O <sub>6</sub> S
<b>zaleplonum</b>	
zaleplon	3'-(3-cyanopyrazolo[1,5- <i>a</i> ]pyrimidin-7-yl)- <i>N</i> -ethylacetanilide
zaléplone	<i>N</i> -[3-(3-cyanopyrazolo[1,5- <i>a</i> ]pyrimidin-7-y)phényl]- <i>N</i> -éthylacétamide
zaleplon	3'-(3-cianopirazolo[1,5- <i>a</i> ]pirimidin-7-il)- <i>N</i> -etilacetanilida
	C <sub>17</sub> H <sub>15</sub> N <sub>5</sub> O

---

<b>zifrosilorum</b>	
<b>zifrosilone</b>	2,2,2-trifluoro-3'-(trimethylsilyl)acetophenone
<b>zifrosilone</b>	2,2,2-trifluoro-1-[3-(triméthylsilyl)phényl]éthanone
<b>zifrosilona</b>	2,2,2-trifluoro-3'-(trimetilsilil)acetofenona
	C <sub>11</sub> H <sub>13</sub> F <sub>3</sub> OSi
<b>ziprasidonium</b>	
<b>ziprasidone</b>	5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-2-indolinone
<b>ziprasidone</b>	5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)pipérazin-1-yl]éthyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
<b>ziprasidona</b>	5-[2-[4-(1,2-bencisotiazol-3-il)-1-piperazinil]etil]-6-cloro-2-indolinona
	C <sub>21</sub> H <sub>21</sub> CIN <sub>4</sub> OS
<b>zucapsaicinum</b>	
<b>zucapsaicin</b>	(Z)-8-methyl-N-vanillyl-6-nonanamide
<b>zucapsaicine</b>	(Z)-N-(4-hydroxy-3-méthoxybenzyl)-8-méthylnon-6-énamide
<b>zucapsaicina</b>	(Z)-8-metil-N-vanilil-6-nonenamida
	C <sub>18</sub> H <sub>27</sub> NO <sub>3</sub>

---

## AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS

WHO Drug Information, Vol. 1, No. 4, 1987

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 27**

- |                  |  |
|------------------|--|
| p. 4 ebrotidinum | <i>replace the chemical name by the following:</i>   |
| ebrotidine       | p-bromo-N([(E)-[[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]-4-thiazoly]methyl]=thio]ethyl]amino]methylene]benzenesulfonamide |

WHO Drug Information, Vol. 3, No. 3, 1989

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 29**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| p. 2 alteplasum | <i>replace the description and the molecular formula by the following:</i>   |
| alteplase       | plasminogen activator (human tissue-type protein moiety), glycoform $\alpha$ C <sub>2569</sub> H <sub>3894</sub> N <sub>746</sub> O <sub>781</sub> S <sub>40</sub> |

WHO Drug Information, Vol. 4, No. 3, 1990

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 30**

- |                  |  |
|------------------|--|
| p. 8 nebivololum | <i>replace the chemical name by the following:</i>   |
| nebivolol        | [2R*[R*[R*(S*)]]]- $\alpha,\alpha'$ -[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] |

## MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES

Informations pharmaceutiques OMS, Vol. 1, No. 4, 1987

**Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 27**

- |                  |  |
|------------------|--|
| p. 4 ebrotidinum | <i>remplacer le nom chimique par:</i>  |
| ébrotidine       | 4-bromo-N-[(E)-[[2-[[2-[(diaminométhylène)amino]thiazol-4-yl]méthyl]=sulfanyl]éthyl]amino]méthylène]benzènesulfonamide |

Informations pharmaceutiques OMS, Vol. 3, No. 3, 1989

**Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 29**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| p. 2 alteplasum | <i>remplacer la description et la formule brute par:</i>   |
| altéplase       | activateur du plasminogène (type tissulaire humain, partie protéique), forme glycosylée $\alpha$<br>$C_{2569}H_{3894}N_{746}O_{781}S_{40}$ |

Informations pharmaceutiques OMS, Vol. 4, No. 3, 1990

**Dénominations communes Internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 30**

- |                  |   |
|------------------|---|
| p. 9 nebivololum | <i>remplacer le nom chimique par:</i>   |
| nébivolol        | (1 $RS$ , 1' $RS$ )-1-[(2 $RS$ , 2' $SR$ )-bis(6-fluoro-3,4-dihydro-2 $H$ -chromén-2-yl)]-2,2'-iminodiéthanol |

## MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES

Información Farmacéutica, de la OMS, Vol. 1, No. 4, 1987

**Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 27**

- |                  |   |
|------------------|---|
| p. 4 ebrotidinum | <i>sustituyase el nombre químico por lo siguiente:</i>  |
| ebrotidina       | $\rho$ -bromo-N-[(E)-[[2-[[2-[(diaminometileno)amino]-4-tiazolil]metil]tio]etil]amino]metileno]bencenosulfonamida |

Información Farmacéutica, de la OMS, Vol. 3, No. 3, 1989

**Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 29**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| p. 2 alteplasum | <i>sustituyanse la descripción y la fórmula molecular por las siguientes:</i>   |
| alteplasa       | activador del plasminógeno (tipo tisular humano, fracción proteica), forma glicosilada $\alpha$<br>$C_{2569}H_{3894}N_{746}O_{781}S_{40}$ |

Información Farmacéutica, de la OMS, Vol. 4, No. 3, 1990

**Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 30**

- |                  |   |
|------------------|---|
| p. 8 nebivololum | <i>sustituyase el nombre químico por lo siguiente:</i>  |
| nebivolol        | [2 $R^*$ [R' $R^*(S^*)]]-\alpha,\alpha'-(iminobis(metilen))bis[6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-metanol]$ |