

Lors des activités de vaccination contre la mpox, les précautions standards doivent être appliquées. Les personnes qui recevront le vaccin ne doivent présenter aucun signe ou symptôme de la mpox.



### Pratiquez l'hygiène des mains pour protéger la santé de tout le monde à chaque séance de vaccination

- Suivez les guides de l'OMS pour l'hygiène des mains lors de la vaccination. Le personnel de vaccination doit pratiquer l'hygiène des mains avant la préparation du vaccin et entre chaque administration.
- Les personnes qui recevront le vaccin doivent être encouragées à pratiquer l'hygiène des mains à leur arrivée et à la sortie.
- Placez des postes d'hygiène des mains sur le lieu des soins (p. ex. aux entrées, aux sorties et à chaque poste de vaccination).

L'EPI n'est pas requis pour l'administration du vaccin (en sous-cutané ou en intramusculaire) si la peau est intacte. Évaluez le risque d'exposition aux lésions cutanées ou aux liquides biologiques avant de procéder. Si la peau n'est pas intacte, envisagez de porter des gants non stériles à usage unique. En cas d'utilisation, les gants doivent être changés après chaque vaccination.



### Sécurité des injections

- **Utiliser des dispositifs sécurisés** : Optez pour des dispositifs sécurisés (p. ex. seringues autobloquantes) lorsqu'ils sont disponibles.
- **Nettoyer la zones de préparation** : Préparez les injections dans des zones propres prévues à cet effet.
- **Stérilisation des flacons** : Essuyez le septum des flacons avec de l'alcool à 70 % avant utilisation et utilisez une aiguille stérile pour chaque injection.
- **Flacons multidoses** : Étiquetez et jetez les flacons selon le protocole, en veillant à maintenir la stérilité.



### Nettoyage de l'environnement, désinfection et gestion des déchets

- **Nettoyage régulier** : Nettoyez quotidiennement les sites de vaccination en vous concentrant sur les zones fréquemment touchées et en utilisant des produits efficaces contre le virus monkeypox (par exemple, du chlore à 0,05 %).
- **Objets tranchants** : Jetez les seringues immédiatement après usage dans un conteneur pour objets piquants/tranchants imperforable. Maintenir les conteneurs à ¾- pleins en vue de leur élimination finale ; ne les réutilisez pas. Équipez chaque poste d'un système d'élimination des déchets piquants/tranchants et des flacons.
- **Gestion des déchets** : Veiller à ce que des plans et des ressources suffisantes soient en place pour administrer le vaccin contre la mpox et gérer les déchets en toute sécurité. Réduire au minimum les déchets inutiles d'EPI.



### Contrôles techniques sur le site de vaccination

- **Espace et aménagement** : Veiller à ce que les zones d'attente soient suffisamment spacieuses pour éviter qu'elles ne soient surpeuplées.
- **Zone de filtrage** : Mettez en place une zone de filtrage à l'entrée réservée à l'évaluation des symptômes.
- **Ventilation** : Assurez une ventilation adéquate (mécanique, naturelle ou hybride) dans toutes les zones, y compris les zones de filtrage, d'attente, d'observation et de vaccination.