


أذربيجان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

8.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
280	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

1% >	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.03	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

6	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
3	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 566 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
12 500

أرمينيا


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

11.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
7.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
99	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.65	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية



برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2017	سنة التشييد:
14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	


2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
68%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2005):
0.08	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

حصول أقل من 1 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-59 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

3	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
6	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1144	الجراحون (2014):
306	أخصائيو الأشعة (2019):
8	أخصائيو الطب النووي (2019):

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):

> 1 ملجم

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
23 780 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
211 000

أسبانيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

8.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
5.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
860	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.42	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2007	سنة التشييد:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

22%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.03	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021): علم الخلايا (اختبار الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري اعتباراً من السنوات 35)
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):
نعم	

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
5	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

26	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
31	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
395	الجراحون (2014):
225	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
245 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

أستراليا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

7.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
5.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
340	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.36	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2007	سنة التشييد:
12-13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
11%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-74 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
11	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
36	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
223	الجراحون (2015):
102	أخصائيو الأشعة (2019):
20	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
274 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021


أفغانستان

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


6.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
540	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.69	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة بين 0 و 74 عاماً



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.04	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 414 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
16 400


ألبانيا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


9.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
48	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.56	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

7%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
42%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2008-2009):
0.02	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

8	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
2	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
36	أخصائيو الأشعة (2019):
4	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
12 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
42 270 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
370 000

ألمانيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

11	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
7.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.44	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 4 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2007	سنة التشييد:
9-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

17%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021): علم الخلايا (اختبار الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري اعتباراً من السنوات 35)
20-65 عاماً	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):
نعم	

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
26	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
901	الجراحون (2013):
163	أخصائيو الأشعة (2019):
16	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
391 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

أنتيغوا وبربودا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	9
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2018
الفئة المستهدفة الرئيسية:	9-13 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	21-65 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	نعم
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	نعم
العلاج الكيميائي:	نعم
العلاج الإشعاعي:	نعم

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

أندورا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
سنة
ب غ م

البيانات غير متاحة

الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2014
الفئة المستهدفة الرئيسية:	12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	24%
معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	لا
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	-
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	-
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	لا

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	نعم
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	نعم
العلاج الكيميائي:	نعم
العلاج الإشعاعي:	نعم

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
69 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
16 080 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
104 000

أنغولا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

19.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
37.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
4.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 900	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.61	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
44%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2016):
1.32	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1>	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
19	أخصائيو الأشعة (2019):
2	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
3ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 790 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
17 400

أوروغواي


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

15.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
11.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
170	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.58	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2013	سنة التشييد:
11 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
17%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.2	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
21-69 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
9	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2014):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
11 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

أوزبكستان


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

11.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
11	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
840	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.58	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشيين:
وعمام	الفئة المستهدفة الرئيسية:
	عوامل الخطر ذات الصلة:
1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.07	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2017):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2017):
	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
2	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
22 460 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
99 400


أو غندا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


30	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
56.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
6.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
4 400	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.66	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):

إجمالي
الوفيات
النسبة المئوية
للكل 100 000
سنة
المرأة
عمر 15+



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 3 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2015	سنة التدشين:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
51%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2011):
2.01	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1>	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
63	الجراحون (2012):
13	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
23 610 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
300 000

أوكرانيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

20.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 400	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.44	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

9%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
80%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2017):
0.2	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
18-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

4	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
6	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
396	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

غ م	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 460 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
14 900

أيرلندا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

13.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.31	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2010	سنة التشييد:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

18%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-60 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2017):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2017):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

11	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
68	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
727	الجراحون (2014):
128	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

ب غ م	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
ب غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
190 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القظرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
169 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 200

أيسلندا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

9.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
8.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
9	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.31	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيدين:	2011
الفئة المستهدفة الرئيسية:	12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	12%
معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	0.03
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
23-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

12	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
6	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
الجراحون (2014):	الجراحون (2014):
أخصائيو الأشعة (2019):	أخصائيو الأشعة (2019):
أخصائيو الطب النووي (2019):	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
359 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
56 010 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
288 000


إثيوبيا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


13	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
21.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
5 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.72	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيدين:	
2018	سنة التشيدين:
14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
44%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2016):
0.21	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

1>	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1>	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
52	الجراحون (2014):
24	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 744 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
12 400

إريتريا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
130	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.73	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

>1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.11	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
3	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
699 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
8 100

إستونيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

28.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
18.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
68	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.32	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 5 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيدين:	سنة التشيدين:
2018	سنة التشيدين:
12-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:

19%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.13	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-55 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

18	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
14	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
247	الجراحون (2014):
201	أخصائيو الأشعة (2019):
10	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
25 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
4 282 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
22 800

إسرائيل

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

5.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
4.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
130	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.49	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 5 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيين:	2010
الفئة المستهدفة الرئيسية:	13 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

13%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-54 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 6 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
5	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1182	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
28	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
242 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
585 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
5 100


إسواتيني

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


57.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
84.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
8.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
210	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.63	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
سنة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

%2	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
%60	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2006-2007):
12.45	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
18-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
2ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
8 683 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
36 600


إكوادور

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


17.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
16	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
840	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.53	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة سنوياً



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2014	سنة التشييد:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.1	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (اختبار الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري اعتباراً من السنوات 30)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
21-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):
نعم	
نعم	

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:	
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	
جراحة السرطان:	
العلاج الكيميائي:	
العلاج الإشعاعي:	

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
3	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1946	الجراحون (2014):
154	أخصائيو الأشعة (2019):
4	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
2 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
134 400 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
843 000


إندونيسيا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


27	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
24.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
19 300	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
دون وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التدشين:	
الفئة المستهدفة الرئيسية:	
عوامل الخطر ذات الصلة:	


4%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.1	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

تلقت أقل من 1 من كل 10 فتيات في المجموعة المستهدفة الأولية في عام 2020 جرعة التطعيم النهائية ضد فيروس الورم الحليمي البشري

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-50 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1>	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

1	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
26	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
ب غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

إيطاليا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 200	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.32	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2009	سنة التشييد:
11 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

17%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.03	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021): علم الخلايا (اختبار الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري اعتباراً من السنوات 30)
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):
نعم	

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
25	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
296	الجراحون (2011):
44	أخصائيو الأشعة (2019):
17	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
109 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
22 940 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
171 000


الأرجنتين

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


19.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
16.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 500	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.56	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات لكل 100 000 امرأة بين 0 و 74 عاماً



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيخ:	سنة التشيخ:
2011	سنة التشيخ:
11 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:

19%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.09	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
ب غ م	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
ب غ م	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
ب غ م	جراحة السرطان:
ب غ م	العلاج الكيميائي:
ب غ م	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
13	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
310	أخصائيو الأشعة (2019):
31	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
21 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
4 988 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
13 800

الأردن

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

2.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
2.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
64	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.62	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

13%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
ب غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
27	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات من 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القظرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 004 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
4 800

الإمارات العربية المتحدة

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
57	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.48	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 2 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيين:	سنة التشيين:
الفئة المستهدفة الرئيسية:	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.06	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

15	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
74	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
1064	أخصائيو الأشعة (2019):
32	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
78 270 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
906 000

الاتحاد الروسي

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

19.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
7 400	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.49	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

13%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
18-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
11	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
439	الجراحون (2014):
456	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
5ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
586 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 700

البحرين

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

3.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
3.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
12	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

5%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30 عاماً فما فوق	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

16	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
286	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1918	الجراحون (2012):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
48	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
7 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
107 300 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
608 000

البرازيل

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

16.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
12.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
9 500	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.52	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشدين:	2014
الفئة المستهدفة الرئيسية:	9-14 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

10%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
ب غ م	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
ب غ م	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
ب غ م	جراحة السرطان:
ب غ م	العلاج الكيميائي:
ب غ م	العلاج الإشعاعي:

6	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

13	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
13	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1257	الجراحون (2013):
230	أخصائيو الأشعة (2019):
17	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
9 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 390 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
54 900


البرتغال

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


16.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
330	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.44	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 9 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2008	سنة التشييد:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

15%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.04	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-60 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

15	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
23	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
989	الجراحون (2013):
212	أخصائيو الأشعة (2019):
14	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
86 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 684 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
18 600


البوسنة والهرسك

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


18.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
130	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.49	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

%28	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-60 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
12	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
191	الجراحون (2013):
131	أخصائيو الأشعة (2019):
19	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
13 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
317 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
3 400


الجبل الأسود

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


35.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
26.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
20	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.48	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

%33	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

ب غ م	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

25	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
4	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
211	أخصائيو الأشعة (2019):
17	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
24 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021


الجزائر

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


7.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
7.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.56	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
46%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2017):
0.05	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

6	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
19	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
604	الجراحون (2013):
264	أخصائيو الأشعة (2019):
21	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 429 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
55 400

الجمهورية التشيكية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

14.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
9.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
350	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.52	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيئين:	
2012	
13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

24%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
15 عاماً فما فوق	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

39	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
22	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1290	الجراحون (2013):
229	أخصائيو الأشعة (2019):
19	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
109 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 373 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
30 900

الجمهورية الدومينيكية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

19.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
17.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
560	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.66	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



تلقت أقل من 1 من كل 10 فتيات في المجموعة المستهدفة الأولية في عام 2020 جرعة التطعيم النهائية ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيدين:	2017
الفئة المستهدفة الرئيسية:	9-14 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	
7%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
63%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2013):
0.41	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-70 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
6	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
78	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
2ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
8 516 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
43 800

الجمهورية العربية السورية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

2.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
2.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
190	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.64	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-50 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

5	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
13	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
4	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 902 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
26 700


الدانمرك

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


13.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
150	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.36	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات لكل 100 000 امرأة
سرطان عنق الرحم
2000 2010 2015 2019



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2007	سنة التشييد:
12-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

17%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
23-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

44	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
44	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
613	الجراحون (2012):
156	أخصائيو الأشعة (2019):
26	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
275 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 430 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
17 600


السلفادور

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


15.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
13.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
450	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة سنوياً



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 2 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأولى في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إجراء فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2020	سنة التشيين:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.15	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-59 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2009):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):

6ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
8 350 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
42 200

السنگال

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

22.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
36.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
4.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 400	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.68	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 3 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2018	سنة التشييد:
9-13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
69%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2014):
0.09	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

3	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
2	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
36	الجراحون (2011):
47	أخصائيو الأشعة (2019):
3	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
3 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
21 430 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
112 000


السودان

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


5.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
8.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
770	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.67	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.11	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

4	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
11	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
117	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 011 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
46 800

السويد

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

13	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
230	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.3	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2010	سنة التشييد:
10-11 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

18%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 9 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

110	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
49	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
642	الجراحون (2013):
251	أخصائيو الأشعة (2019):
12	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
200 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
7 743 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
75 800


الصومال

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


13.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
25.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
880	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.77	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.02	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
15	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
698 200 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
4 134 000

الصين

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

15.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
51 600	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.54	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

%2	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
35-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

4	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1>	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
5	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
684	الجراحون (2012):
282	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
2ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
19 420 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
70 000

العراق

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

1.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
2.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
160	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.67	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
ب غ م	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
ب غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
0	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
24	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
423	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
4	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
53 800 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
335 000

القلب

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

14.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
3 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.51	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



تلقت أقل من 1 من كل 10 فتيات في المجموعة المستهدفة الأولية في عام 2020 جرعة التطعيم النهائية ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
دون وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيين:	سنة التشيين:
الفئة المستهدفة الرئيسية:	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:
6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
11%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2008):
0.03	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-55 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

4	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

13	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
8	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
177	الجراحون (2014):
108	أخصائيو الأشعة (2019):
8	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

الكاميرون

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

20.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
33.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 600	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.65	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2020	سنة التدشين:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
52%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2018):
1.06	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

تلقت أقل من 1 من كل 10 فتيات في المجموعة المستهدفة الأولية في عام 2020 على أول جرعة تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
53	الجراحون (2013):
25	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 693 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
17 400

الكونغو

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

12.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
22.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
200	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.61	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
48%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2011-2012):
3.93	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
29	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 644 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
2 000

الكويت

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

3.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
2.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
32	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.53	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
223	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
558	أخصائيو الأشعة (2019):
140	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
5ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة


* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021


المرضاة والوفيات

11.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 500	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.55	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
9	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
480	الجراحون (2011):
135	أخصائيو الأشعة (2019):
12	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح م = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
65 170 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
316 000


المكسيك

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


14.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
12.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
4 800	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.46	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 9 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2012	سنة التشييد:
9-11	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.07	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (اختبار الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري اعتباراً من السنوات 34)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
25-64 عاماً	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):
نعم	

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
ب غ م	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2012):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاححة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):

3 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
14 480 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
50 400

المملكة العربية السعودية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

2.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
2.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
160	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.5	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.02	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

25	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
102	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
1114	أخصائيو الأشعة (2019):
32	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
7 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
34 180 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
309 000

المملكة المتحدة

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

11	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
9.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.3	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2008	سنة التشييد:
12-13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

12%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

16	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
38	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
485	الجراحون (2012):
82	أخصائيو الأشعة (2019):
2	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
160 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 662 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
20 800

النرويج

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

14.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
12	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
120	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.24	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2009	سنة التشييد:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

15%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-69 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

12	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

42	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
54	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1094	الجراحون (2012):
238	أخصائيو الأشعة (2019):
16	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
230 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
4 546 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
43 400

النمسا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

8.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
5.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
210	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.44	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2014	سنة التشييد:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

22%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
20 عاماً فما فوق	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 9 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

12	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

22	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
46	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1695	الجراحون (2014):
348	أخصائيو الأشعة (2019):
51	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
511 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية يبلغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
11 600 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
86 000

النيجر

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

5.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
490	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.76	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

%1	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
%54	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2012):
0.06	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
2	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
36	الجراحون (2014):
2	أخصائيو الأشعة (2019):
2	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
656 300 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
4 191 000

الهند

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

18.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
18	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
45 300	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.62	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

12%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
40%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2015-2016):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

5	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

3	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
16	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
273	الجراحون (2009):
346	أخصائيو الأشعة (2019):
3	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القظرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
166 200 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 441 000

الولايات المتحدة الأمريكية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

8.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
7 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.42	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2006	سنة التشييد:
2006	الفئة المستهدفة الرئيسية:
11-12 عاماً	عوامل الخطر ذات الصلة:
17%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
21-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
ب غ م	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
ب غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

17	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
الجراحون (2011):	الجراحون (2011):
أخصائيو الأشعة (2019):	أخصائيو الأشعة (2019):
أخصائيو الطب النووي (2019):	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
324 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

اليابان


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

19.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
3 800	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.33	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2011	سنة التشييد:
13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
8%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
20 عاماً فما فوق	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2013):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
33 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
14 470 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
75 900

اليمن

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

1.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
2.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
120	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.68	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

8%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.04	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
غ م	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

غ م	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
غ م	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
غ م	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
غ م	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
غ م	جراحة السرطان:
غ م	العلاج الكيميائي:
غ م	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
5	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
79	الجراحون (2014):
207	أخصائيو الأشعة (2019):
5	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 333 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
62 200

اليونان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

13.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
8.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
240	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.4	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:

نطاق برنامج التطعيم:

سنة التشيين:

الفئة المستهدفة الرئيسية:

عوامل الخطر ذات الصلة:

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):


استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):

معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
أثناء ممارسة النشاط الجنسي	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 9 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):

خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم جراحة السرطان:
نعم العلاج الكيميائي:
نعم العلاج الإشعاعي:

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
9
عدد وحدات العلاج الكي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
الجراحون (2013):
أخصائيو الأشعة (2019):
أخصائيو الطب النووي (2019):

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):

118 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

بابوا غينيا الجديدة

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

24.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
29.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
660	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

25%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
28%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2018):
0.69	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2016):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2016):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
30	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 464 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
14 200

باراغواي


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

33.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
34.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
520	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.55	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2013	سنة التشيين:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
4%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.15	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
سن الإنجاب	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2014):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
105 100 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
741 000

باكستان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

4.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
4 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.64	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

7%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.07	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

4	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

2	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
129	الجراحون (2012):
57	أخصائيو الأشعة (2019):
14	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

بالاو

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة سنوياً

البيانات غير متاحة

الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2008
الفئة المستهدفة الرئيسية:	ب غ م
عوامل الخطر ذات الصلة:	ب غ م

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	%8
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيتولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	21-64 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	ب غ م
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	نعم
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	لا
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	لا
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	لا
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):

12 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
148 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 800

بربادوس

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

26.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
28	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.67	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 1 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2013	سنة التششين:
10-11 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
31%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2017):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
9	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
8	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
145	الجراحون (2014):
32	أخصائيو الأشعة (2019):
8	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
6ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
208 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 000

بروني دار السلام

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

25.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
20.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
18	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.26	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2012	سنة التشييد:
13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
20-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

20	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
33	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي للمبغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
8 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 828 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
57 800

بلجيكا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
7.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
240	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.37	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2011	سنة التشييد:
12-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

19%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

20	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
27	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
697	الجراحون (2012):
186	أخصائيو الأشعة (2019):
38	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
272 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 600 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
51 000

بلغاريا


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

28.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
18	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
420	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.5	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية



برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشدين:	سنة التشدين:
2017	سنة التشدين:
12-13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:

30%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-59 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 6 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

13	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
24	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1656	الجراحون (2013):
141	أخصائيو الأشعة (2019):
15	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي للمبغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
17 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات من 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
196 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
720

بليز

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

17	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
19.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
28	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.74	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 1 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2016	سنة التشيين:
9-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.66	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
18-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

0	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
642	الجراحون (2014):
335	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
80 570 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
360 000


بنغلاديش

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


10.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
5 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

15%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-60 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

2	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
22	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
173	الجراحون (2012):
33	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح م = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 120 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
8 700

بنما

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

16.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
180	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.56	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 5 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2008	سنة التشييد:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.34	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
20-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
18	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
513	الجراحون (2014):
199	أخصائيو الأشعة (2019):
6	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 910 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
43 500

بنين

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

9.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
670	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.66	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
40%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2011-2012):
0.31	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
101	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
358 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 900

بوتان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

13	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
30	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 9 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأولى ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إجراء فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2009	سنة التشييد:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.07	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
103	الجراحون (2014):
51	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 190 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
9 600

بوتسوانا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

30.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
34.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
160	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.55	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2015	سنة التشييد:
9-13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
8%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
8.74	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

5	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
10	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
205	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
6ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
10 170 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
70 200


بوركنيا فاصو

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


10.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
18.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.74	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
68%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2010):
0.08	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-48 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
2	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
31	الجراحون (2014):
69	أخصائيو الأشعة (2019):
3	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021


بوروندي

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


26.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
49.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
5.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 500	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.71	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
32%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2010):
0.14	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

0	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
7	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
19 530 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
195 000

بولندا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

19.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
12.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 900	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.55	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

19%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-59 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
غ م	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

غ م	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

25	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
11	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
321	الجراحون (2014):
136	أخصائيو الأشعة (2019):
10	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
37 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 733 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
43 900

بوليفيا (دولة- المتعددة القوميات)

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

34.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
36.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.53	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2017	سنة التشييد:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
5%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
28%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2003):
0.09	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

5	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2012):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

غ م	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
16 360 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
67 400

بيرو

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

25.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
22.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 900	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.54	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2015	سنة التشييد:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
18%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2000):
0.07	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1321	الجراحون (2014):
116	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 052 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
58 200


بيلا روس

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


16.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
11.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
300	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.43	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة بين 0 و 74 عاماً



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

9%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.09	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
18 عاماً فما فوق	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

28	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1520	الجراحون (2013):
161	أخصائيو الأشعة (2019):
8	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
7 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات من 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
35 720 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
222 000

تايلند

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

25.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
16.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
5 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.51	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2017	سنة التشييد:
11 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
4%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
76%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2017):
0.05	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-60 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 6 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

6	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
4	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
9	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
251	الجراحون (2014):
81	أخصائيو الأشعة (2019):
3	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 016 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
16 300

تركمانستان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

15.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
250	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 9 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2016	سنة التشييد:
وعمام	الفئة المستهدفة الرئيسية:
	عوامل الخطر ذات الصلة:
>1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
7%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2000):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
6	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
2697	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
42 260 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
212 000

تركيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

5.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
4.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 300	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.49	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

19%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

12	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
22	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
290	الجراحون (2011):
190	أخصائيو الأشعة (2019):
26	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
11 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
706 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
3 900

ترينيداد وتوباغو

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

28.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
19.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
97	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.63	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2013	سنة التشييد:
11-15 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	


ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.08	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

حصول أقل من 1 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
18-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
18	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

24	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
24	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
733	الجراحون (2014):
89	أخصائيو الأشعة (2019):
9	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

تشاد

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
20.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
630	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.73	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
36%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2014-2015):
0.4	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
24	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
4 062 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
24 000

توغو

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
19.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
420	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.68	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
51%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2013-2014):
0.68	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
0	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
42	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

توفالو

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة سنوياً



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التدشين:	2021
الفئة المستهدفة الرئيسية:	ب غ م
عوامل الخطر ذات الصلة:	%22

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	30-49 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	نعم
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	نعم
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	لا
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	لا
جراحة السرطان:	لا
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	لا
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي للمبغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 897 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
31 100

تونس

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

5.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
4.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
200	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.54	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.03	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-59 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
19	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
206	الجراحون (2014):
503	أخصائيو الأشعة (2019):
38	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

توغا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	7
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	لا
نطاق برنامج التطعيم:	-
سنة التدشين:	-
الفئة المستهدفة الرئيسية:	-
عوامل الخطر ذات الصلة:	-

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):	15%
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	أثناء ممارسة النشاط الجنسي
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	نعم
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	لا
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	نعم
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
2 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقى 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
640 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
3 500


تيمور-لشتي

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


10	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
28	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

10%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.1	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
76	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
7 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 485 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
8 700

جامايكا


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

25.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
21.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
360	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.64	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية



برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التدشين:	2017
الفئة المستهدفة الرئيسية:	11-12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

4%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.61	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
20-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

5	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
249	الجراحون (2014):
82	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات من 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

جزر البهاما


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

19.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
21	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.72	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2015	سنة التدشين:
9-10	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.25	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
11	عدد وحدات العلاج الكي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
16	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
64	أخصائيو الأشعة (2019):
11	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاححة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
9ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
422 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
2 400


جزر القمر

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


38.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
56	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
6.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.65	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات
لكل 100 000 امرأة
عمر 15+



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

11%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
48%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2012):
0.01	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القظرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
329 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
2 100

جزر سليمان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

19.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
25.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
41	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.62	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأولى ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشدين:
وعمام	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

20%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
99	الجراحون (2011):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

جزر كوك

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
سنة
ب غ م



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 9 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2011
الفئة المستهدفة الرئيسية:	وعماماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):	%20
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيتولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	21-65 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	لا
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	لا

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	لا
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	لا
جراحة السرطان:	لا
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 393 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
25 800

جمهورية أفريقيا الوسطى

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

12.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
21.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
230	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.75	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

0	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
34	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

جمهورية إيران الإسلامية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

2.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
2.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
500	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.61	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.03	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

22	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
32	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
116	الجراحون (2014):
211	أخصائيو الأشعة (2019):
18	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
43 470 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
327 000

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

17.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
31.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
4 800	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.71	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
27%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2013-2014):
0.29	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

1>	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
11	الجراحون (2013):
19	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1> ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
29 020 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
150 000

جمهورية تنزانيا المتحدة

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

34.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
62.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
7.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
6 400	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.64	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 4 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشدين:	
2018	
14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
37%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2016-2017):
2.51	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
24	الجراحون (2010):
14	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
25 580 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
135 000

جمهورية كوريا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

12.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
8.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 100	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.32	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2016	سنة التشييد:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
20 عاماً فما فوق	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 6 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

5	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
6	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
570	الجراحون (2014):
117	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
48 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

15	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
11.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
700	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

>1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
ب غ م	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
ب غ م	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2016):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2016):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي للمبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
>1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 570 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
19 500

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
12	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
190	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.51	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأولى في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2020	سنة التشيين:
10-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
10%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.13	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
84	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 105 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
19 600

جمهورية مولدوفا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

22.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
16.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
210	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.52	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 4 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
دون وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشدين:	سنة التشدين:
الفئة المستهدفة الرئيسية:	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:
6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
42%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2005):
0.17	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-61 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
10	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
368	الجراحون (2013):
196	أخصائيو الأشعة (2019):
2	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
7 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
29 700 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
226 000

جنوب أفريقيا


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

35.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
35.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
5 600	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.55	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2014	سنة التشييد:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
7%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
8.43	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-59 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2014):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
13 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 526 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
41 700

جنوب السودان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

12.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
20.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
760	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.74	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
2.52	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
16	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 091 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
25 900

جورجيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

15.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
190	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.62	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 2 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشدين:	سنة التشدين:
الفئة المستهدفة الرئيسية:	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:

%7	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.12	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-60 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

14	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
19	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
1502	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
462 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
3 200

جيبوتي

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

13.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
40	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.7	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.13	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
252	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

دومينيكا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي الوفيات
بالسرطان الناجمة
عن سرطان عنق الرحم
لكل 100 000 امرأة
يقطن
البلد

البيانات غير متاحة

الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2019
الفئة المستهدفة الرئيسية:	11-12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	ب غ م

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيتولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	18-65 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	نعم
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	نعم
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	نعم
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	لا
جراحة السرطان:	نعم
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	نعم

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	لا
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
6 421 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
29 800


رواندا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


18.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
28.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
940	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.67	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

إجمالي
الوفيات
النسبة المئوية
للكل 100 000
سيدة
عمرها
15+



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2011	سنة التشييد:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

7%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
55%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2014-2015):
0.68	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
39	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
9 946 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
124 000

رومانيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

34.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
22.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 900	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.53	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

18%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.02	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
3	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1097	الجراحون (2013):
206	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
23 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021


زامبيا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


34.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
65.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
7.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 800	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشيين:
14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
46%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2018):
7.92	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
ب غ م	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
5	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
80	الجراحون (2012):
8	أخصائيو الأشعة (2019):
2	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقى 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
7 662 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
57 100


زيمبابوي

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


39.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
61.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
6.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.65	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

إجمالي
معدل السن لكل الإصابة بالسرطان
100 000 امرأة
عمر 0-74



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2018	سنة التشييد:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
79%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2015):
3.06	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-50 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
3	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
46	الجراحون (2014):
3	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
95 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
590

ساموا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
12.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
6	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

15%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
146	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

سان تومي وبرينسيبي

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

11.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
16	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
9	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.77	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2021	سنة التدشين:
ب غ م	الفئة المستهدفة الرئيسية:
	عوامل الخطر ذات الصلة:

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
57%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2008-2009):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

سان كيتس ونيفيس

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
سنة
ب غ م

البيانات غير متاحة

الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2019
الفئة المستهدفة الرئيسية:	11 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	ب غ م

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	16-69 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	لا
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	لا

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	نعم
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	نعم
العلاج الكيميائي:	نعم
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	لا
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

سان مارينو

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	نعم

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
سنة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 2 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2008
الفئة المستهدفة الرئيسية:	11-14 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	اختبار الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	26-55 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	نعم
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 6 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	لا
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	نعم
العلاج الكيميائي:	نعم
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):	ب غ م
--	-------

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

سانت فنسنت و غرينادين

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	8
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 1 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إجراء فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشيين:	2017
الفئة المستهدفة الرئيسية:	11-12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	أثناء ممارسة النشاط الجنسي
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	نعم
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	نعم
العلاج الكيميائي:	نعم
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
3 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً


انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

سائت لوسيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المراسة والوفيات

21.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
16.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
12	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.65	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشيين:
11-12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
15-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

0	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
532	الجراحون (2014):
106	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


سري لانكا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


12.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
9.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
760	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.55	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة بين 0 و 74 عاماً



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 5 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:

نطاق برنامج التطعيم:

سنة التشيين:

الفئة المستهدفة الرئيسية:

عوامل الخطر ذات الصلة:

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):


استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):

معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
35-45 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

6	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

19	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
11	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
50	الجراحون (2013):
81	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):

1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 800 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
24 200

سلوفاكيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

24.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
16.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
270	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.41	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

%23	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
23 عاماً فما فوق	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
ب غ م	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
ب غ م	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
ب غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
ب غ م	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
ب غ م	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
ب غ م	جراحة السرطان:
ب غ م	العلاج الكيميائي:
ب غ م	العلاج الإشعاعي:

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
10	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
342	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
18	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

ب غ م	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
ب غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
103 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 044 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
10 400


سلوفينيا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


10	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
60	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.52	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 4 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2009	سنة التشييد:
11 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

17%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
>0.01	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
20-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

23	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
632	الجراحون (2013):
199	أخصائيو الأشعة (2019):
28	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
114 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

سنغافورة

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

11.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
85	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.56	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2010	سنة التشييد:
9.26	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	


4%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

حصول أقل من 1 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 6 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

16	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
16	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
389	الجراحون (2013):
115	أخصائيو الأشعة (2019):
11	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
12 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
289 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
2 000

سورينام


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

26.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
23.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
48	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.62	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إجراء فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التدشين:	2013
الفئة المستهدفة الرئيسية:	9-13 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	
معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	0.34

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

19	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
9	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
19	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
96	أخصائيو الأشعة (2019):
10	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

سويسرا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

5.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
3.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
110	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.42	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2006	سنة التشييد:
11-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

21%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
21-70 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

14	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

21	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
38	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
724	الجراحون (2013):
154	أخصائيو الأشعة (2019):
38	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
281 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 915 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
32 900

سيراليون

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

12.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
21.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
260	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.73	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
12%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2013):
0.94	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
12	الجراحون (2012):
10	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

سيشيل


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	9
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	نعم



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2014
الفئة المستهدفة الرئيسية:	10 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	6%
معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	لا
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	-
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	-
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	لا
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	لا

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	نعم
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	نعم
العلاج الكيميائي:	نعم
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	ب غ م
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	ب غ م

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
7 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
9 610 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
51 900

شيلي

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

1.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
11.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
780	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.53	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2014	سنة التشييد:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

26%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
39%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2015-2016):
0.13	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
6	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1337	الجراحون (2012):
135	أخصائيو الأشعة (2019):
8	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
18 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
4 475 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
57 200

صربيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

27	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
18.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
640	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.53	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

36%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 6 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

6	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
10	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
13	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
37 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

طاجيكستان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

6.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
8.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
110	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.59	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.09	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

3	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
2351	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم


ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


المرضاة والوفيات

5.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
42	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

>1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
75	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1674	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
27	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 066 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
6 100


غابون

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


21.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
30.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
96	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.5	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
64%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2012):
0.92	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25 عاماً فما فوق	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2018):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
6	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

غامبيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

23.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
42.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
140	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.7	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأولى ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التدشين:
9-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
57%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2013):
1.54	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
142	الجراحون (2011):
0	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
15 000 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
80 700

غانا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

18.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
27.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 200	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.61	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

1%>	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
26%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2014):
1.14	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
25	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
39	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

غرينادا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

ب غ م	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
ب غ م	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
ب غ م	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
10	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
ب غ م	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 3 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشيين:
و عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً


انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

غواتيمالا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

17.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
20.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
810	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.56	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 2 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2018	سنة التدشين:
10-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
41%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2014-2015):
0.03	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-55 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

4	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
123	الجراحون (2014):
72	أخصائيو الأشعة (2019):
2	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
2 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
390 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
3 400

غيانا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

31	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
29.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
91	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.52	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 1 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيخ:	سنة التشيخ:
2017	سنة التشيخ:
9-16 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
63%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2009):
0.55	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
9	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

13	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
13	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
599	الجراحون (2014):
133	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
6 605 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
55 100


غينيا

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


30.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
50.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
5.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 500	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.71	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
سنة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
39%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2018):
0.77	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
0	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

غينيا الاستوائية

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

19.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
32.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
56	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.59	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة مغذية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
3	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

غينيا-بيساو

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

23.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
39.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
4.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
150	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.72	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
1.4	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
ب غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
ب غ م	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
ب غ م	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
ب غ م	جراحة السرطان:
ب غ م	العلاج الكيميائي:
ب غ م	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

ب غ م	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
ب غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
148 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
850


فانواتو

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


14.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
17.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
13	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.86	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
222	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
33 610 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
301 000

فرنسا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 600	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.43	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 3 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2006	سنة التشييد:
11-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

26%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021): علم الخلايا (اختبار الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري اعتباراً من السنوات 30)
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):
نعم	

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

15	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
11	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
486	الجراحون (2014):
221	أخصائيو الأشعة (2019):
13	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
146 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
14 470 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
71 100

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

25.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
22.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.08	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
550	الجراحون (2014):
77	أخصائيو الأشعة (2019):
4	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 805 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
27 800

فنلندا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

6.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
5.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
62	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.36	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيخ:	سنة التشيخ:
الفئة المستهدفة الرئيسية:	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:

15%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 9 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

14	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

180	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
54	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1227	الجراحون (2014):
216	أخصائيو الأشعة (2019):
90	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
128 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
439 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
3 200

فيجي

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

30.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
29.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
86	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.68	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 4 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2013	سنة التدشين:
8-13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
11%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.2	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-70 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
105	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
3 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تدخين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
48 310 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
323 000


فييت نام

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


8.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 400	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.54	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.05	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
35-54 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

2	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

7	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
9	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
194	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
599 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
3 200

قبرص

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

7.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
5.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
18	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.72	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2016	سنة التشييد:
12-13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
22%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

ب غ م	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

15	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
124	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
292	الجراحون (2012):
320	أخصائيو الأشعة (2019):
14	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
62 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القظرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
699 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 500

قطر

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

3.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
4.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
13	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.48	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2020	سنة التشيين:
9-14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.04	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
21-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

20	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
7	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
159	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
532	الجراحون (2011):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
40	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 242 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
13 700

قير غيزستان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

15.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
310	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
67%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2012):
0.09	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
غ م	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
2	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
2854	الجراحون (2013):
1069	أخصائيو الأشعة (2019):
5	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

غ م	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
274 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 300

كابو فيردي

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

16.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
17	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
27	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.59	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2021	سنة التدشين:
ب غ م	الفئة المستهدفة الرئيسية:
ب غ م	عوامل الخطر ذات الصلة:

5%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
889	الجراحون (2011):
47	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

كازاخستان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

18.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
15.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
810	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.47	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

7%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.16	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-70 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
5	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
191	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
ب غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 140 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
26 600

كرواتيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

15.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.1	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
160	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.45	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيين:	
2016	سنة التشيين:
14 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

31%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 9 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
21	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
829	الجراحون (2013):
313	أخصائيو الأشعة (2019):
26	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
36 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

كمبوديا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

13.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
730	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
67%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2014):
0.05	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
18 850 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
136 000

كندا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

7.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
5.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
580	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.45	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2009	سنة التشييد:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
10%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-69 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
29	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
301	الجراحون (2013):
94	أخصائيو الأشعة (2019):
11	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
436 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 706 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
50 200

كوبا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

20.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
13.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
670	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

11%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
79%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2019):
0.18	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-64 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

4	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
11	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1763	الجراحون (2013):
151	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
12 740 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
82 000

كوت ديفوار

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

15.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
31.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 400	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.69	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 1 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إجراء فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشييد:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
50%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2011-2012):
0.45	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
0	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
220	الجراحون (2014):
21	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

كوستاريكا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

14.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
11.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
160	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.52	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إجراء فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشيين:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
5%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.37	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

5	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2014):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
9 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
25 630 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
108 000

كولومبيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

18.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
14.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 300	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.53	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 3 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2012	سنة التشييد:
9-17 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
5%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
71%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2015):
0.04	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-69 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

8	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2014):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
15 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021


كيريبياتي

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	30
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي
الوفيات
النسبة المئوية
للكل 100 000
سكان
بغ م



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	لا
نطاق برنامج التطعيم:	-
سنة التشيخ:	-
الفئة المستهدفة الرئيسية:	-
عوامل الخطر ذات الصلة:	-

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):	%27
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	25-65 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	لا
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	لا

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	لا
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	لا
جراحة السرطان:	لا
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	لا
في المجتمع أو رعاية منزلية:	لا

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
26 450 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
134 000

كينيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

19.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
31.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
3 400	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.61	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 1 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إجراء فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشييد:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
44%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2014):
1.4	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

3	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
66	الجراحون (2014):
63	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القظرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 029 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
16 300

لاتفيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

26.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
18.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
130	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.51	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 4 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التدشين:	2010
الفئة المستهدفة الرئيسية:	12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	
20%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-70 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
37	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
867	الجراحون (2014):
246	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
41 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 406 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
16 100

لبنان

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

3.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
3.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.41%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
130	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.59	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

29%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
21-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

17	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
12	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
1473	الجراحون (2014):
231	أخصائيو الأشعة (2019):
9	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
305 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
2 100

لكسمبرغ

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

7.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
5.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
10	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.42	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 4 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2008	سنة التشييد:
9-13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

19%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-69 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

12	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2017):
6	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2017):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

18	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
890	الجراحون (2014):
260	أخصائيو الأشعة (2019):
43	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
144 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
3 355 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
12 600

ليبيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

7.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
7.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
130	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.59	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيدين:	
الفئة المستهدفة الرئيسية:	
عوامل الخطر ذات الصلة:	

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.04	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
4	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
95	أخصائيو الأشعة (2019):
16	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
2 456 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
17 800

ليبيريا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

26.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
40.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
4.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
470	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.71	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 1 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشيين:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
29%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2013):
0.51	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
غ م	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
0	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
82	الجراحون (2009):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 483 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
22 600

ليتوانيا


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

28.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
18.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
220	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.47	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إجراء فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشدين:	سنة التشدين:
الفئة المستهدفة الرئيسية:	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	عوامل الخطر ذات الصلة:
18%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-58 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
5	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
الجراحون (2013):	الجراحون (2013):
أخصائيو الأشعة (2019):	أخصائيو الأشعة (2019):
أخصائيو الطب النووي (2019):	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
29 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 077 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
16 600

ليسوتو

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

49.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
56.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
5.7%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
370	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.67	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

5%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
76%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2014):
9.54	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
ب غ م	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
ب غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
ب غ م	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
ب غ م	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
ب غ م	جراحة السرطان:
ب غ م	العلاج الكيميائي:
ب غ م	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
21	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

ب غ م	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
ب غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
220 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
1 900

مألطة

ملاص سرطان عنق الرحم


المراسة والوفيات

5.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
3.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
4	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.38	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشيين:	2013
الفئة المستهدفة الرئيسية:	12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

19%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-35 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

12	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

17	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
17	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
928	الجراحون (2014):
168	أخصائيو الأشعة (2019):
22	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
9 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**


منظمة الصحة العالمية: الملاحق القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

ماليزيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

11.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
10.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
1 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 8 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2010	سنة التشييد:
13 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.06	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

13	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

3	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
65	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
449	الجراحون (2011):
114	أخصائيو الأشعة (2019):
114	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


مد غشقر

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


27.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
41.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
4.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
3 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.65	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

12%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
9%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2008-2009):
0.31	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
50	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك


* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021


المرضاة والوفيات

2.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
2.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
620	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.56	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

1% >	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.02	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
ب غ م	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
ب غ م	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
ب غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-----	--

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيميائي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

ب غ م	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
ب غ م	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
ب غ م	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
ب غ م	جراحة السرطان:
ب غ م	العلاج الكيميائي:
ب غ م	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
16	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1859	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
283	الجراحون (2014):
8	أخصائيو الأشعة (2019):
8	أخصائيو الطب النووي (2019):

ب غ م	الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):
ب غ م	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
ب غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

2 ملجرام	معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
----------	--

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقى 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 041 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
12 100

مقدونيا الشمالية


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

10.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
7.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
68	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.55	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية




برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2009	سنة التدشين:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
24-60 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

5	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2011):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
9 443 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
48 100


ملاوي

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


42.8	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
67.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
7.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 900	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.7	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة سنوياً



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشيين:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
62%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2015-2016):
2.54	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-49 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
31	الجراحون (2014):
1	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
3 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

ملاديف

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

23.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
24.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
22	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.52	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2019	سنة التشيين:
10 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

6%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
15-50 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
لا	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
143	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
ب غ م	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً


انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منغوليا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

20.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
19.7	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.1%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
160	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.54	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

7%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيتولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-60 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 4 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

9	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
7	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
732	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
5	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً


انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

موريتانيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

18.5	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
28.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.4%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
330	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.67	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2021	سنة التدشين:
ب غ م	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

2%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
ب غ م	الجراحون (-):
124	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
ب غ م	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

موريشيوس

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

19.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
12.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
49	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.5	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأخيرة في عام 2020


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2016	سنة التشييد:
9 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (**2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.56	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):
عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):	
أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	
الجراحون (2014):	
أخصائيو الأشعة (2019):	
أخصائيو الطب النووي (2019):	

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
2 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ.**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
15 620 000

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
130 000


موزامبيق

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


33.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
50.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
5.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
3 300	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.72	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

5%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
37%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2011):
7.44	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
15-54 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

1>	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
0	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

1	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
1	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
73	الجراحون (2013):
2	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):

1> ملجرام

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

موناكو

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
سنة
ب غ م



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2006
الفئة المستهدفة الرئيسية:	11 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	21-65 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	لا
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	لا

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
--	----

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
ب غ م

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
28 000 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
176 000

میانمار

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

25.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
22.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.3%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
3 900	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.63	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 9 من كل 10 فتيات في الفئة المستهدفة الرئيسية على جرعة التطعيم الأولى في عام 2020

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2020	سنة التدشين:
وعمام	الفئة المستهدفة الرئيسية:
	عوامل الخطر ذات الصلة:
20%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
ب غ م	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

3	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
	عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):
4	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
4	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
69	الجراحون (2013):
49	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):

> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
1 286 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
8 200

ناميبيا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

28.6	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
37.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
3.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
130	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

5%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
70%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2013):
5	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 2 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

6	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
27	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
377	الجراحون (2013):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
18	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
4ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

ناورو

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
سنة
ب غ م

البيانات غير متاحة

الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	لا
نطاق برنامج التطعيم:	-
سنة التشيخ:	-
الفئة المستهدفة الرئيسية:	-
عوامل الخطر ذات الصلة:	-

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	%50
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	لا
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	-
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	-
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	لا
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 5 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	لا
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	لا
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	لا
جراحة السرطان:	لا
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	ب غ م

معدل الاستهلاك السنوي للمبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
0 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
15 560 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
83 600

نيبال

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

14.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
16.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.8%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.67	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

11%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.02	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ب غ م	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-50 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

4	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
5	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
97	الجراحون (2014):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح م = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

نيجيريا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

11.9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
18.4	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.9%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
10 600	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.66	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التدشين:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

>1%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
46%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2018):
0.66	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
-	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
غ م	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

لا	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

1	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
>1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

6	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
9	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
158	الجراحون (2014):
30	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
>1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً


انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

نيكاراغوا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

21.4	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
21.3	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
370	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.57	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشيخ:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
14%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2001):
0.09	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
30-100 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

5	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
1	عدد وحدات العلاج الكيوي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

8	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
11	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
659	الجراحون (2014):
377	أخصائيو الأشعة (2019):
3	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
2 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً و مرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً


انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

نيوزيلندا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

7.1	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
5.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.5%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
61	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.47	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري


برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2009	سنة التشييد:
11 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	
11%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
0.01>	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-69 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

10	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
1	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
238	الجراحون (2015):
133	أخصائيو الأشعة (2019):
7	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
122 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
ب غ م

مجموع الوفيات، الإناث (2019):
ب غ م

نيوي

ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات


المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	ب غ م
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	لا

إجمالي
الوفيات
الناجمة
عن سرطان
عنق الرحم
لكل 100 000
امرأة
يقابل
السرطان
4

البيانات غير متاحة

الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



فيروس الورم الحليمي البشري مُدرج في برنامج التطعيم الوطني لكن البيانات المتعلقة بمعدلات التطعيم غير متاحة

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2019
الفئة المستهدفة الرئيسية:	12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	علم الخلايا (السيتولوجيا)
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	أثناء ممارسة النشاط الجنسي
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	نعم

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 3 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	نعم
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	نعم
جراحة السرطان:	لا
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتابعة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	نعم
في المجتمع أو رعاية منزلية:	نعم

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
3 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 705 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
50 000

هايتي

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

10.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
11.6	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.2%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
570	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.75	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
لا	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري غير مدرج في جدول التطعيم الوطني

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

لا	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
-	نطاق برنامج التطعيم:
-	سنة التشييد:
-	الفئة المستهدفة الرئيسية:
-	عوامل الخطر ذات الصلة:

3%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
59%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2012):
0.64	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع أقل من امرأة واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
لا	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
لا	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
لا	جراحة السرطان:
لا	العلاج الكيميائي:
لا	العلاج الإشعاعي:

ب غ م	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):
ب غ م	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

0	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
0	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
93	الجراحون (2014):
32	أخصائيو الأشعة (2019):
0	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ب غ م = غير معروف

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
4 877 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
27 400

هندوراس

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

17.3	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
19.5	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
2.0%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
490	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.6	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 5 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشدين:	2016
الفئة المستهدفة الرئيسية:	11 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

ب غ م	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
85%	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2017):
0.04	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

لا	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
-	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
-	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 6 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
-----	--

7	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):
2	عدد وحدات العلاج الكيميائي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2020):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

ب غ م	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
ب غ م	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
447	الجراحون (2014):
83	أخصائيو الأشعة (2019):
1	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

لا	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
لا	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
> 1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
5 076 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
65 900

هنغاريا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

24.7	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
17.2	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
1.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
470	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.39	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 7 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
2014	سنة التششين:
12 عاماً	الفئة المستهدفة الرئيسية:
عوامل الخطر ذات الصلة:	

24%	معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
ب غ م	استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
ب غ م	معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
علم الخلايا (السيولوجيا)	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
25-65 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر
لا	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 8 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

6	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
2	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

12	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
14	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
453	الجراحون (2011):
ب غ م	أخصائيو الأشعة (2019):
16	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتأثرة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
88 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**

منظمة الصحة العالمية: الملاح القظرية لسرطان عنق الرحم، 2021

مجموع السكان، الإناث (2019):
8 582 000


مجموع الوفيات، الإناث (2019):
78 300

هولندا

ملاح سرطان عنق الرحم


المرضاة والوفيات

9	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
6.9	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
0.6%	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
270	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.33	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 5 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


نعم	إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:
وطني	نطاق برنامج التطعيم:
سنة التشدين:	2010
الفئة المستهدفة الرئيسية:	12 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	19%

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

الوقاية الثانوية

نعم	وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):
نعم	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
نعم	وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:
نعم	عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):
نعم	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 7 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

العلاج والرعاية الداعمة

نعم	وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):
نعم	خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):
نعم	وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

11	عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):
3	عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2021):

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

22	أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):
35	أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):
460	الجراحون (2013):
172	أخصائيو الأشعة (2019):
13	أخصائيو الطب النووي (2019):

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
291 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

تشير البيانات إلى تخمين التبغ فقط، في حال انعدام توفر بيانات كافية عن جميع أنواع تعاطي التبغ**


منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021

ولايات ميكرونيزيا الموحدة


ملاح سرطان عنق الرحم

المرضاة والوفيات

المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):	ب غ م
الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):	ب غ م
الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):	8
نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):	ب غ م
وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):	نعم



الوقاية الأولية



برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:	نعم
نطاق برنامج التطعيم:	وطني
سنة التشييد:	2010
الفئة المستهدفة الرئيسية:	10 عاماً
عوامل الخطر ذات الصلة:	

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م
استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (-):	ب غ م
معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):	ب غ م

الوقاية الثانوية

وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):	ف ب ح خ
الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):	25-45 عاماً
وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر:	نعم
عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):	لا
وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021):	لا

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):	نعم
خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):	لا
وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:	لا
خدمات علم الأمراض (المختبرات):	لا
جراحة السرطان:	لا
العلاج الكيميائي:	لا
العلاج الإشعاعي:	لا

عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م
عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (-):	ب غ م

عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019):	ب غ م
أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):	ب غ م
الجراحون (-):	ب غ م
أخصائيو الأشعة (2019):	ب غ م
أخصائيو الطب النووي (2019):	ب غ م

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية:	لا
في المجتمع أو رعاية منزلية:	لا

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):
1 ملجم

الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم
--	---	--

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) + معدل التغطية ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و 14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القظرية لسرطان عنق الرحم، 2021