AFGHANISTAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **18 510 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **128 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	6,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	540
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,69
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,04

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

AFRIQUE DU SUD

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **29 700 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **226 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	35,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	35,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	5 600
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,55
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2014
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	7 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	8,43

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-59 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	17
Chirurgiens (2014) :	321
Radiologues (2019) :	60
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	6

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **13mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ALBANIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 414 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **16 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	9,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	48
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,56
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	7 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2008-2009) :	42 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,02

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	40-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	7
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	8
Physiciens médicaux (2019) :	2
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	36
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	4

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **12mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ALGÉRIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **21 300 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **95 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	7,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	7,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,56
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2017) :	46 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,05

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	6
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	19
Chirurgiens (2013) :	604
Radiologues (2019) :	264
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	21

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ALLEMAGNE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **42 270 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **370 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	7,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,44
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 4 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2007
Cohorte cible prioritaire :	9-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	17 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie (test PVH depuis 35 ans)
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	20-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	26
Chirurgiens (2013) :	901
Radiologues (2019) :	163
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	16

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **391mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ANDORRE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



7 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu **leur dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2014
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	24 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **69mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ANGOLA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **16 080 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **104 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	37,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	4,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 900
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,61
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2016) :	44 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1,32

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	<1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	19
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **3mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ANTIGUA-ET-BARBUDA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **50 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **310**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	9
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2018
Cohorte cible prioritaire :	9-13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ARABIE SAOUDITE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **14 480 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **50 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	2,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	160
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,50
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,02

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	13
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	25
Physiciens médicaux (2019) :	102
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	1114
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	32

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **7mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ARGENTINE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **22 940 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **171 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	16,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 500
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,56
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2011
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	19 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,09

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	ND
Services de pathologie (laboratoires) :	ND
Chirurgie oncologique :	ND
Chimiothérapie :	ND
Radiothérapie :	ND

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	13
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	310
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	31

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **21mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ARMÉNIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 566 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **12 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	7,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	99
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,65
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, moins de 1 sur 10 a reçu sa dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2017
Cohorte cible prioritaire :	14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2005) :	68 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,08

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-59 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	6
Chirurgiens (2014) :	1144
Radiologues (2019) :	306
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	8

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

AUSTRALIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **12 650 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **78 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	7,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	5,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	340
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,36
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2007
Cohorte cible prioritaire :	12-13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	11 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-74 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	11
Physiciens médicaux (2019) :	36
Chirurgiens (2015) :	223
Radiologues (2019) :	102
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	20

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **274mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

****Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

AUTRICHE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 546 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **43 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	8,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	5,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	210
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,44
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2014
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	22 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	20+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



9 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	12
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	22
Physiciens médicaux (2019) :	46
Chirurgiens (2014) :	1695
Radiologues (2019) :	348
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	51

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **511mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

AZERBAÏDJAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 032 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **39 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	8,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	280
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	6
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	3

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BAHAMAS

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **200 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	21
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,72
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 1 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2015
Cohorte cible prioritaire :	9-10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,25

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	16
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	64
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	11

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **9mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BAHREÏN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **586 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 700**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	3,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	3,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	12
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	5 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	16
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	286
Chirurgiens (2012) :	1918
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	48

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **7mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BANGLADESH

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **80 570 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **360 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	5 100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	15 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	2
Physiciens médicaux (2019) :	22
Chirurgiens (2012) :	173
Radiologues (2019) :	33
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BARBADE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **148 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**26,3**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**15,2**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**1,4 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**28**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,67**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 1 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2013**
Cohorte cible prioritaire :	**10-11 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**2 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2017) :	**31 %**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**ND**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**-**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**-**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Oui**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Non**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	**9**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	**9**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**8**
Physiciens médicaux (2019) :	**ND**
Chirurgiens (2014) :	**145**
Radiologues (2019) :	**32**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**8**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **6mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BÉLARUS

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 052 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **58 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	16,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	11,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	300
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,43
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	9 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,09

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	18+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	28
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2013) :	1520
Radiologues (2019) :	161
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	8

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **7mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BELGIQUE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 828 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **57 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	7,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	240
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,37
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2011
Cohorte cible prioritaire :	12-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	19 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	20
Physiciens médicaux (2019) :	27
Chirurgiens (2012) :	697
Radiologues (2019) :	186
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	38

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **272mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BELIZE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **196 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **720**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	17,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	19,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	28
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,74
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



1 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2016
Cohorte cible prioritaire :	9-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,66

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	18-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	0
Physiciens médicaux (2019) :	0
Chirurgiens (2014) :	642
Radiologues (2019) :	335
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BÉNIN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 910 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **43 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	9,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	15,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	670
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,66
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2011-2012) :	40 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,31

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	101
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BHOUTAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **358 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	30
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 9 sur 10 ont reçu leur première dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,07

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	0
Chirurgiens (2014) :	103
Radiologues (2019) :	51
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 733 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **43 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	34,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	36,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,53
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2017
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	5 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2003) :	28 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,09

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	5
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	13
Chirurgiens (2012) :	1212
Radiologues (2019) :	111
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	9

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	NSP
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 684 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **18 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	18,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	130
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,49
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	28 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	12
Chirurgiens (2013) :	191
Radiologues (2019) :	131
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	19

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **13mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BOTSWANA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 190 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **9 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**30,8**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**34,4**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**3,5 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**160**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,55**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2015**
Cohorte cible prioritaire :	**9-13 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**8 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	**ND**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**8,74**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**test PVH**
Tranche d'âge cible du programme (2021) : dépend de la méthode & du statut sérologie VIH	
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Oui**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	**5**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	**10**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Non**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**0**
Chirurgiens (2014) :	**205**
Radiologues (2019) :	**ND**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**0**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Oui**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Oui**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **6mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BRÉSIL

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **107 300 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **608 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	16,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	12,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	9 500
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,52
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2014
Cohorte cible prioritaire :	9-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	10 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	6
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	NSP
Services de pathologie (laboratoires) :	NSP
Chirurgie oncologique :	NSP
Chimiothérapie :	NSP
Radiothérapie :	NSP

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	13
Physiciens médicaux (2019) :	13
Chirurgiens (2013) :	1257
Radiologues (2019) :	230
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	17

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **9mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BRUNÉI DARUSSALAM

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **208 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	25,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	20,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	18
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,26
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2012
Cohorte cible prioritaire :	13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	20-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	20
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	33
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **8mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BULGARIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 600 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **51 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**28,2**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**18,0**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**1,9 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**420**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,50**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, moins de 1 sur 10 a reçu sa dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2017**
Cohorte cible prioritaire :	**12-13 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	**30 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	**ND**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**ND**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**cytologie**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**30-59 ans**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Oui**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**10**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**3**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**13**
Physiciens médicaux (2019) :	**24**
Chirurgiens (2013) :	**1656**
Radiologues (2019) :	**141**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**15**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **17mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Couverture du programme : % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BURKINA FASO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **10 170 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **70 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**10,8**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**18,2**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**2,0 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**2 100**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,74**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Non**
Échelle du programme de vaccination :	**-**
Année de mise en place :	**-**
Cohorte cible prioritaire :	**-**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**6 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2010) :	**68 %**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**0,08**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**IVA**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**25-48 ans**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Oui**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**1**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**0**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Non**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**2**
Chirurgiens (2014) :	**31**
Radiologues (2019) :	**69**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**3**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

BURUNDI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 812 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **35 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	26,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	49,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	5,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 500
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,71
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2010) :	32 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,14

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	0
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	7
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CABO VERDE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **274 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 300**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	16,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	17,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	27
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,59
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2021
Cohorte cible prioritaire :	ND

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	5 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2011) :	889
Radiologues (2019) :	47
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CAMBODGE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **8 439 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **45 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	730
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2014) :	67 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,05

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	1
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CAMEROUN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **12 940 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **90 300**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**20,9**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**33,7**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**3,6 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**1 600**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,65**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Non**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Moins de 1 fille sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **première dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2020**
Cohorte cible prioritaire :	**9 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**1 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2018) :	**52 %**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**1,06**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**-**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**-**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Non**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Non**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**1**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**0**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**ND**
Chirurgiens (2013) :	**53**
Radiologues (2019) :	**25**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**ND**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CANADA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **18 850 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **136 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	7,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	5,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	580
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,45
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	10 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-69 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	29
Chirurgiens (2013) :	301
Radiologues (2019) :	94
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	11

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **436mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CHILI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **9 610 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **51 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	11,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	780
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,53
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2014
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	26 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2015-2016) :	39 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,13

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	6
Chirurgiens (2012) :	1337
Radiologues (2019) :	135
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	8

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **18mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CHINE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **698 200 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **4 134 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	51 600
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,54
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	35-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	<1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	5
Chirurgiens (2012) :	684
Radiologues (2019) :	282
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CHYPRE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **599 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **3 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	7,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	5,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	18
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,72
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2016
Cohorte cible prioritaire :	12-13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	22 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	NSP

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	15
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	124
Chirurgiens (2012) :	292
Radiologues (2019) :	320
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	14

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **62mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

COLOMBIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **25 630 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **108 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	18,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 300
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,53
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 3 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2012
Cohorte cible prioritaire :	9-17 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	5 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2015) :	71 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,04

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-69 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	5
Chirurgiens (2014) :	272
Radiologues (2019) :	128
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	8

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **15mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

Organisation mondiale de la Santé - Profils de pays pour le cancer du col de l'utérus, 2021

COMORES

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **422 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **2 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**38,8**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**56,0**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**6,1 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**100**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,65**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Non**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Non**
Échelle du programme de vaccination :	**-**
Année de mise en place :	**-**
Cohorte cible prioritaire :	**-**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**11 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2012) :	**48 %**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**0,01**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**-**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**-**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Non**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Non**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	**ND**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	**ND**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Non**
Chirurgie oncologique :	**Non**
Chimiothérapie :	**Non**
Radiothérapie :	**Non**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**0**
Chirurgiens (-) :	**ND**
Radiologues (2019) :	**ND**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**0**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Oui**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CONGO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 693 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **17 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	12,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	22,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	200
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,61
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2011-2012) :	48 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3,93

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	0
Chirurgiens (2013) :	29
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

COSTA RICA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 525 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **10 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	14,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	11,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	160
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,52
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



7 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	5 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,37

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	5
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	25
Chirurgiens (2014) :	313
Radiologues (2019) :	121
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	6

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **9mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CÔTE D'IVOIRE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **12 740 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **82 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	31,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 400
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,69
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



1 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2011-2012) :	50 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,45

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	220
Radiologues (2019) :	21
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CROATIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 140 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **26 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	160
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,45
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2016
Cohorte cible prioritaire :	14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	31 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



9 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	21
Chirurgiens (2013) :	829
Radiologues (2019) :	313
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	26

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **36mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

CUBA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 706 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **50 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	20,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	13,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	670
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	11 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2019) :	79 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,18

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	4
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2013) :	1763
Radiologues (2019) :	151
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

DANEMARK

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 902 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **26 700**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	150
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,36
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2007
Cohorte cible prioritaire :	12-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	17 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	23-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	13
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	44
Physiciens médicaux (2019) :	44
Chirurgiens (2012) :	613
Radiologues (2019) :	156
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	26

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **275mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

DJIBOUTI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **462 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **3 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	15,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	40
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,70
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,13

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	0
Chirurgiens (2013) :	252
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

DOMINIQUE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



6 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	11-12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	18-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ÉGYPTE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **49 670 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **261 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	2,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	620
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,56
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,02

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	ND
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	ND

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	ND
Services de pathologie (laboratoires) :	ND
Chirurgie oncologique :	ND
Chimiothérapie :	ND
Radiothérapie :	ND

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	16
Chirurgiens (2014) :	1859
Radiologues (2019) :	283
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	8

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	ND
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	ND

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

EL SALVADOR

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 430 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **17 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	13,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	450
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



2 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **première dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2020
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,15

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-59 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2009) :	1183
Radiologues (2019) :	62
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **6mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ÉMIRATS ARABES UNIS

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 004 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **4 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	4,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	57
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,48
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



2 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,06

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	15
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	74
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	1064
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	32

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ÉQUATEUR

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **8 683 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **36 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	17,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	16,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	840
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,53
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2014
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,10

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie (test PVH depuis 30 ans)
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	3
Chirurgiens (2014) :	1946
Radiologues (2019) :	154
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	4

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ÉRYTHRÉE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 744 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **12 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	15,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	130
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,73
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,11

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	3
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ESPAGNE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **23 780 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **211 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	8,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	5,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	860
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,42
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2007
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	22 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie (test PVH depuis 35 ans)
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	5

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	26
Physiciens médicaux (2019) :	31
Chirurgiens (2014) :	395
Radiologues (2019) :	225
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **245mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ESTONIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **699 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **8 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	28,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	18,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	68
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,32
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 5 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2018
Cohorte cible prioritaire :	12-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	19 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,13

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-55 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	18
Physiciens médicaux (2019) :	14
Chirurgiens (2014) :	247
Radiologues (2019) :	201
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	10

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **25mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ESWATINI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **585 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **5 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	57,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	84,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	8,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	210
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,63
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2006-2007) :	60 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	12,45

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	18-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **166 200 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 441 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	8,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	7 000
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,42
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2006
Cohorte cible prioritaire :	11-12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	17 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	ND
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	ND

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	17
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	42
Chirurgiens (2011) :	539
Radiologues (2019) :	183
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	18

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **324mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

Organisation mondiale de la Santé - Profils de pays pour le cancer du col de l'utérus, 2021

ÉTHIOPIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **56 010 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **288 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	21,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	5 000
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,72
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2018
Cohorte cible prioritaire :	14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2016) :	44 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,21

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	<1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	<1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	1
Chirurgiens (2014) :	52
Radiologues (2019) :	24
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

FÉDÉRATION DE RUSSIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **78 270 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **906 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	7 400
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,49
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	13 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	18-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2014) :	439
Radiologues (2019) :	456
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **5mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

FIDJI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **439 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **3 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	30,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	29,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	86
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,68
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 4 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2013
Cohorte cible prioritaire :	8-13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	11 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,20

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-70 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	105
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **3mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

FINLANDE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 805 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **27 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	6,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	5,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	62
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,36
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2013
Cohorte cible prioritaire :	10-12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	15 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



9 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	14
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	180
Physiciens médicaux (2019) :	54
Chirurgiens (2014) :	1227
Radiologues (2019) :	216
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	90

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **128mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

FRANCE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **33 610 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **301 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	7,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 600
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,43
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 3 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2006
Cohorte cible prioritaire :	11-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	26 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie (test PVH depuis 30 ans)
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	15
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2014) :	486
Radiologues (2019) :	221
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	13

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **146mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GABON

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 066 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **6 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	21,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	30,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	96
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,50
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2012) :	64 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,92

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	6

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GAMBIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 183 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **6 300**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**23,5**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**42,9**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**3,9 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**140**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,70**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur première dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2019**
Cohorte cible prioritaire :	**9-14 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**1 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2013) :	**57 %**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**1,54**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**-**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**-**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Non**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	**ND**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	**ND**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Non**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Non**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**ND**
Chirurgiens (2011) :	**142**
Radiologues (2019) :	**0**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**0**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GÉORGIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 091 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **25 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	190
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,62
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



2 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	10-12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	7 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,12

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	14
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	19
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	1502
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GHANA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **15 000 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **80 700**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	18,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	27,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 200
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,61
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2014) :	26 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1,14

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	25
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	39
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GRÈCE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 333 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **62 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	8,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	240
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,40
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	11-12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	27 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	ayant une activité sexuelle
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



9 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	68
Chirurgiens (2013) :	1668
Radiologues (2019) :	493
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **118mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GRENADE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **56 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **470**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	10
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



3 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GUATEMALA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **8 922 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **41 700**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	17,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	20,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	810
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,56
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



2 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2018
Cohorte cible prioritaire :	10-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2014-2015) :	41 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-55 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	123
Radiologues (2019) :	72
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GUINÉE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **6 605 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **55 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**30,5**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**50,1**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**5,5 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**1 500**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,71**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Non**
Échelle du programme de vaccination :	**-**
Année de mise en place :	**-**
Cohorte cible prioritaire :	**-**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**ND**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2018) :	**39 %**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**0,77**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**IVA**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**25-65 ans**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Non**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Non**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	**ND**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	**ND**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Non**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**ND**
Chirurgiens (-) :	**ND**
Radiologues (2019) :	**0**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**ND**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GUINÉE ÉQUATORIALE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **602 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **4 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	32,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	56
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,59
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	3
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GUINÉE-BISSAU

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **982 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **7 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**23,8**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**39,6**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**4,4 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**150**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,72**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Non**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Non**
Échelle du programme de vaccination :	**-**
Année de mise en place :	**-**
Cohorte cible prioritaire :	**-**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**1 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	**ND**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**1,40**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**-**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**-**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Non**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**ND**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	**ND**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	**ND**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**ND**
Services de pathologie (laboratoires) :	**ND**
Chirurgie oncologique :	**ND**
Chimiothérapie :	**ND**
Radiothérapie :	**ND**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**ND**
Chirurgiens (-) :	**ND**
Radiologues (2019) :	**ND**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**ND**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**ND**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**ND**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

GUYANA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **390 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **3 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	31,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	29,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	91
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,52
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 1 sur 10 a reçu sa dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2017
Cohorte cible prioritaire :	9-16 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2009) :	63 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,55

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	13
Physiciens médicaux (2019) :	13
Chirurgiens (2014) :	599
Radiologues (2019) :	133
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

HAÏTI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 705 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **50 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	11,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	570
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,75
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2012) :	59 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,64

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	40-80 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	NSP

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	0
Physiciens médicaux (2019) :	0
Chirurgiens (2014) :	93
Radiologues (2019) :	32
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

HONDURAS

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 877 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **27 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	17,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	19,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	490
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 5 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2016
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2017) :	85 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,04

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	7
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	447
Radiologues (2019) :	83
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

HONGRIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 076 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **65 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	24,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	17,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	470
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,39
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2014
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	24 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	6
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	12
Physiciens médicaux (2019) :	14
Chirurgiens (2011) :	453
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	16

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **88mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ÎLES COOK

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 9 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2011
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	20 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ÎLES MARSHALL

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 1 sur 10 a reçu sa dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	8 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	40-75 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ÎLES SALOMON

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **329 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **2 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	25,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	41
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,62
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur première dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	20 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2011) :	99
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

INDE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **656 300 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **4 191 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	18,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	18,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	45 300
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,62
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	12 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2015-2016) :	40 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	5
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	3
Physiciens médicaux (2019) :	16
Chirurgiens (2009) :	273
Radiologues (2019) :	346
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	3

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

INDONÉSIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **134 400 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **843 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	27,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	24,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	19 300
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Moins de 1 fille sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	Infranational
Année de mise en place :	2018
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	4 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,10

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-50 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	<1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	1
Physiciens médicaux (2019) :	1
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	26
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **41 020 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **148 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	2,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	500
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,61
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	22
Physiciens médicaux (2019) :	32
Chirurgiens (2014) :	116
Radiologues (2019) :	211
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	18

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

IRAQ

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **19 420 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **70 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	1,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	160
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,67
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	NSP
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	NSP

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	7
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	24
Chirurgiens (2013) :	423
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	4

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

IRLANDE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 460 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **14 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,31
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2010
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	18 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2017) :	13
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2017) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	11
Physiciens médicaux (2019) :	68
Chirurgiens (2014) :	727
Radiologues (2019) :	128
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	ND
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	ND

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **190mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ISLANDE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **169 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	9,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	8,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	9
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,31
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2011
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	12 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	23-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	12
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	6

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	20
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	1106
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **359mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ISRAËL

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 282 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **22 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	5,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	4,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	130
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,49
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 5 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2010
Cohorte cible prioritaire :	13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	13 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-54 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	5

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2013) :	1182
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	28

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **242mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

****Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ITALIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **31 090 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **339 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 200
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,32
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	17 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie (test PVH depuis 30 ans)
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	25
Chirurgiens (2011) :	296
Radiologues (2019) :	44
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	17

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **109mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

****Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.**

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

JAMAÏQUE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 485 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **8 700**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**25,9**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**21,6**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**2,2 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**360**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,64**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, moins de 1 sur 10 a reçu sa dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2017**
Cohorte cible prioritaire :	**11-12 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	**4 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	**ND**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**0,61**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**cytologie**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**20-64 ans**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Non**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	**7**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	**3**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**5**
Physiciens médicaux (2019) :	**ND**
Chirurgiens (2014) :	**249**
Radiologues (2019) :	**82**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**7**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

JAPON

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **64 910 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **655 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	15,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	3 800
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,33
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, moins de 1 sur 10 a reçu sa dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2011
Cohorte cible prioritaire :	13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	8 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	20+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2013) :	241
Radiologues (2019) :	97
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	31

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **33mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

JORDANIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 988 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **13 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	2,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	64
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,62
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	13 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	NSP

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	27

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

KAZAKHSTAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **9 552 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **60 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	18,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	15,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	810
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,47
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	7 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,16

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-70 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	13
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	5

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	1
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	191
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

KENYA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **26 450 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **134 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	31,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	3 400
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,61
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



1 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2014) :	44 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1,40

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	1
Chirurgiens (2014) :	66
Radiologues (2019) :	63
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

KIRGHIZISTAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 242 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **13 700**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	15,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	310
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2012) :	67 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,09

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	NSP

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	2
Chirurgiens (2013) :	2854
Radiologues (2019) :	1069
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	5

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	NSP
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

KIRIBATI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **60 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **610**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	30
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	27 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

KOWEÏT

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 644 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **2 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	3,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	32
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,53
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	13
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	223
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	558
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	140

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **5mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

LESOTHO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 077 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **16 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	49,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	56,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	5,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	370
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,67
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	5 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2014) :	76 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	9,54

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	ND
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	ND

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	ND
Services de pathologie (laboratoires) :	ND
Chirurgie oncologique :	ND
Chimiothérapie :	ND
Radiothérapie :	ND

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	21
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	ND
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	ND

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

LETTONIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 029 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **16 300**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**26,3**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**18,4**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**1,8 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**130**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,51**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 4 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2010**
Cohorte cible prioritaire :	**12 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**20 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	**ND**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**ND**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**cytologie**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**25-70 ans**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Oui**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	**7**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	**1**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**37**
Chirurgiens (2014) :	**867**
Radiologues (2019) :	**246**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**ND**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Oui**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Oui**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **41mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

LIBAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 406 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **16 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	3,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	3,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	130
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,59
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	29 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	17
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	12
Chirurgiens (2014) :	1473
Radiologues (2019) :	231
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	9

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

LIBÉRIA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 456 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **17 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	26,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	40,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	4,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	470
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,71
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



1 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2013) :	29 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,51

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	NSP
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	0
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2009) :	82
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

LIBYE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 355 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **12 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	7,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	7,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	130
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,59
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2013
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,04

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	95
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	16

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

LITUANIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 483 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **22 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**28,2**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**18,7**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**1,8 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**220**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,47**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 3 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2016**
Cohorte cible prioritaire :	**11 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**18 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	**ND**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**ND**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**cytologie**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**25-58 ans**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Oui**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**9**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**5**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**21**
Physiciens médicaux (2019) :	**28**
Chirurgiens (2013) :	**1486**
Radiologues (2019) :	**219**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**11**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Oui**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Oui**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **29mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

LUXEMBOURG

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **305 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **2 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	7,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	5,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	10
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,42
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 4 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2008
Cohorte cible prioritaire :	9-13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	19 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-69 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2017) :	12
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2017) :	6

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	18
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	890
Radiologues (2019) :	260
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	43

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **144mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

****Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MACÉDOINE DU NORD (LA)

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 041 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **12 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	7,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	68
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,55
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 3 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	24-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	5
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	23
Chirurgiens (2011) :	977
Radiologues (2019) :	295
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	22

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MADAGASCAR

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **13 520 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **84 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	27,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	41,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	4,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	3 000
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,65
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	12 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2008-2009) :	9 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,31

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	1
Chirurgiens (2013) :	50
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MALAISIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **15 530 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **76 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 000
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2010
Cohorte cible prioritaire :	13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,06

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	13
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	3
Physiciens médicaux (2019) :	65
Chirurgiens (2011) :	449
Radiologues (2019) :	114
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	114

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MALAWI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **9 443 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **48 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	42,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	67,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	7,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 900
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,70
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



7 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2015-2016) :	62 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2,54

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	31
Radiologues (2019) :	1
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **3mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MALDIVES

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **195 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **540**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	23,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	24,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	22
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,52
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



6 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	15-50 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	143
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MALI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **9 813 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **75 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	36,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	4,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 700
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,73
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2018) :	27 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,33

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	1
Chirurgiens (2014) :	115
Radiologues (2019) :	46
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MALTE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **220 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	5,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	3,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	4
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,38
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2013
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	19 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-35 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	12
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	17
Physiciens médicaux (2019) :	17
Chirurgiens (2014) :	928
Radiologues (2019) :	168
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	22

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **9mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MAROC

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **18 380 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **121 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 500
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,55
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	7
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	9
Chirurgiens (2011) :	480
Radiologues (2019) :	135
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	12

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MAURICE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **643 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **5 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	12,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	49
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,50
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



7 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2016
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,56

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	17
Chirurgiens (2014) :	308
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MAURITANIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 254 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **13 300**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	18,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	28,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	330
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,67
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2021
Cohorte cible prioritaire :	ND

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	124
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MEXIQUE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **65 170 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **316 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	14,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	12,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	4 800
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,46
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 9 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2012
Cohorte cible prioritaire :	9-11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,07

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie (test PVH depuis 34 ans)
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	ND
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	7
Chirurgiens (2012) :	1358
Radiologues (2019) :	203
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	13

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **3mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE)

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **56 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **450**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	8
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



3 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2010
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-45 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MONACO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2006
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : ND

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MONGOLIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 635 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **9 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	20,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	19,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	160
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,54
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	7 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	7
Chirurgiens (2014) :	732
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	5

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MONTÉNÉGRO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **317 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **3 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	35,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	26,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	20
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,48
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	33 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	NSP

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	25
Physiciens médicaux (2019) :	4
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	211
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	17

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **24mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MOZAMBIQUE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **15 620 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **130 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	33,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	50,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	5,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	3 300
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,72
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	5 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2011) :	37 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	7,44

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	15-54 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	<1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	1
Physiciens médicaux (2019) :	1
Chirurgiens (2013) :	73
Radiologues (2019) :	2
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

MYANMAR

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **28 000 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **176 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	25,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	22,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	3 900
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,63
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



9 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **première dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2020
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	20 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	ND
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	4
Physiciens médicaux (2019) :	4
Chirurgiens (2013) :	69
Radiologues (2019) :	49
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NAMIBIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 286 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **8 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	28,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	37,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	130
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	5 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2013) :	70 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	5,00

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	6
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	27
Chirurgiens (2013) :	377
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	18

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NAURU

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	50 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NÉPAL

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **15 560 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **83 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	14,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	16,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 000
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,67
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	11 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,02

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-50 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	5
Chirurgiens (2014) :	97
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NICARAGUA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 320 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **14 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	21,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	21,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	370
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2001) :	14 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,09

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-100 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	5
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	8
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2014) :	659
Radiologues (2019) :	377
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	3

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NIGER

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **11 600 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **86 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	5,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	490
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,76
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2012) :	54 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,06

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	2
Chirurgiens (2014) :	36
Radiologues (2019) :	2
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NIGÉRIA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **99 130 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **763 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	18,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	10 600
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,66
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2018) :	46 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,66

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	NSP

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	<1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	6
Physiciens médicaux (2019) :	9
Chirurgiens (2014) :	158
Radiologues (2019) :	30
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NIOUÉ

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	ayant une activité sexuelle
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **3mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NORVÈGE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 662 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **20 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	14,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	12,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	120
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,24
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	15 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-69 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	12
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	42
Physiciens médicaux (2019) :	54
Chirurgiens (2012) :	1094
Radiologues (2019) :	238
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	16

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **230mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

NOUVELLE-ZÉLANDE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 432 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **16 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	7,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	5,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	61
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,47
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	11 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-69 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2015) :	238
Radiologues (2019) :	133
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **122mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

OMAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 691 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **6 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	5,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	42
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	75
Chirurgiens (2013) :	1674
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	27

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

OUGANDA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **22 460 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **99 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	30,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	56,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	6,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	4 400
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,66
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



3 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2015
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2011) :	51 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2,01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	<1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	0
Chirurgiens (2012) :	63
Radiologues (2019) :	13
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

OUZBÉKISTAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **16 530 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **78 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	11,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	840
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,58
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



9 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,07

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2017) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2017) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PAKISTAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **105 100 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **741 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	4,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	4 000
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,64
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	7 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,07

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	2
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2012) :	129
Radiologues (2019) :	57
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	14

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PALAOS

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2008
Cohorte cible prioritaire :	ND

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	8 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **12mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PANAMA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 120 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **8 700**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	16,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	180
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,56
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 5 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2008
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,34

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	20-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	18
Chirurgiens (2014) :	513
Radiologues (2019) :	199
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	6

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 296 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **26 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	24,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	29,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	660
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	25 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2018) :	28 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,69

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2016) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2016) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	30
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PARAGUAY

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 464 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **14 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**33,5**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**34,1**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**3,3 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**520**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,55**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2013**
Cohorte cible prioritaire :	**10 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	**4 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	**ND**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**0,15**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**cytologie**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**âge de procréer**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Non**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Non**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	**7**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	**2**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Non**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**4**
Chirurgiens (2014) :	**317**
Radiologues (2019) :	**44**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**4**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PAYS-BAS

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **8 582 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **78 300**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	9,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	270
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,33
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 5 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2010
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	19 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	22
Physiciens médicaux (2019) :	35
Chirurgiens (2013) :	460
Radiologues (2019) :	172
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	13

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **291mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PÉROU

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **16 360 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **67 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	25,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	22,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 900
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,54
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2015
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2000) :	18 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,07

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	1321
Radiologues (2019) :	116
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PHILIPPINES

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **53 800 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **335 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	14,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	15,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	3 100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,51
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Moins de 1 fille sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	Infranational
Année de mise en place :	2016
Cohorte cible prioritaire :	9-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2008) :	11 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-55 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	13
Physiciens médicaux (2019) :	8
Chirurgiens (2014) :	177
Radiologues (2019) :	108
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	8

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

POLOGNE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **19 530 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **195 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	12,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 900
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,55
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	19 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-59 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	NSP
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	NSP

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	25
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2014) :	321
Radiologues (2019) :	136
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	10

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **37mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

PORTUGAL

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 390 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **54 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	16,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	330
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,44
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 9 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2008
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	15 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,04

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	15
Physiciens médicaux (2019) :	23
Chirurgiens (2013) :	989
Radiologues (2019) :	212
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	14

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **86mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

QATAR

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **699 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **1 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	3,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	4,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	13
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,48
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2020
Cohorte cible prioritaire :	9-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,04

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	20
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	7

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	159
Chirurgiens (2011) :	532
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	40

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **8 516 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **43 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	2,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	190
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,64
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-50 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	5
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	13
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	4

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 393 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **25 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	12,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	21,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	230
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,75
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	0
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	34
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **25 580 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **135 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	12,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	8,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,32
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 7 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2016
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	20+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	5
Physiciens médicaux (2019) :	6
Chirurgiens (2014) :	570
Radiologues (2019) :	117
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **48mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

****Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 105 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **19 600**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	22,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	16,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,6 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	210
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,52
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



4 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	Infranational
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2005) :	42 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,17

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-61 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	10
Chirurgiens (2013) :	368
Radiologues (2019) :	196
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **7mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **43 470 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **327 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	17,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	31,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	4 800
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,71
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2013-2014) :	27 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,29

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	<1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2013) :	11
Radiologues (2019) :	19
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 570 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **19 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	12,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	190
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,51
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



7 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **première dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2020
Cohorte cible prioritaire :	10-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	10 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,13

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	84
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 373 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **30 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	19,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	17,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	560
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,66
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Moins de 1 fille sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2017
Cohorte cible prioritaire :	9-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	7 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2013) :	63 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,41

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-70 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	6
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	78
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **13 110 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **113 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	11,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	700
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	<1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	ND
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2016) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2016) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 429 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **55 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	14,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	9,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	350
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,52
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2012
Cohorte cible prioritaire :	13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	24 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	15+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	39
Physiciens médicaux (2019) :	22
Chirurgiens (2013) :	1290
Radiologues (2019) :	229
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	19

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **109mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **29 020 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **150 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**34,3**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**62,5**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**7,4 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**6 400**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,64**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 4 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2018**
Cohorte cible prioritaire :	**14 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**2 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2016-2017) :	**37 %**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**2,51**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**-**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**-**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Non**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Non**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**2**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**1**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**1**
Chirurgiens (2010) :	**24**
Radiologues (2019) :	**14**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**1**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ROUMANIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **9 946 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **124 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	34,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	22,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 900
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,53
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	18 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,02

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	7
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	3
Chirurgiens (2013) :	1097
Radiologues (2019) :	206
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **23mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ROYAUME-UNI

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **34 180 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **309 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	9,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,30
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2008
Cohorte cible prioritaire :	12-13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	12 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	16
Physiciens médicaux (2019) :	38
Chirurgiens (2012) :	485
Radiologues (2019) :	82
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **160mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

RWANDA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **6 421 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **29 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	18,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	28,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	3,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	940
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,67
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2011
Cohorte cible prioritaire :	12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	7 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2014-2015) :	55 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,68

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	39
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SAINTE-LUCIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **93 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **590**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	21,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	16,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	12
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,65
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



7 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	11-12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	15-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	0
Physiciens médicaux (2019) :	0
Chirurgiens (2014) :	532
Radiologues (2019) :	106
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

Organisation mondiale de la Santé - Profils de pays pour le cancer du col de l'utérus, 2021

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	16-69 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SAINT-MARIN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 2 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2008
Cohorte cible prioritaire :	11-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	26-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **ND**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **54 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **420**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	8
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



1 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 a reçu sa **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2017
Cohorte cible prioritaire :	11-12 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	ayant une activité sexuelle
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **3mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SAMOA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **95 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **590**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	12,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	6
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	15 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	146
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **107 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **490**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	16,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	9
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,77
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2021
Cohorte cible prioritaire :	ND

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2008-2009) :	57 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SÉNÉGAL

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **8 350 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **42 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**22,6**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**36,3**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**4,1 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**1 400**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,68**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Non**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



3 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2018**
Cohorte cible prioritaire :	**9-13 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**1 %**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2014) :	**69 %**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**0,09**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Non**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**-**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**-**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Oui**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020 :	**3**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	**0**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**ND**
Physiciens médicaux (2019) :	**2**
Chirurgiens (2011) :	**36**
Radiologues (2019) :	**47**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**3**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Non**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Non**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **3mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SERBIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 475 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **57 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	27,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	18,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	640
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,53
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	36 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	6
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	10
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	13

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **37mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SEYCHELLES

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **48 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **340**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	9
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 9 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2014
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **7mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SIERRA LEONE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 915 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **32 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	12,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	21,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	260
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,73
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	6 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2013) :	12 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,94

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2012) :	12
Radiologues (2019) :	10
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SINGAPOUR

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 766 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **11 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	11,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,9
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	85
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,56
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, moins de 1 sur 10 a reçu sa dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2010
Cohorte cible prioritaire :	9-26 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	4 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	11
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	16
Physiciens médicaux (2019) :	16
Chirurgiens (2013) :	389
Radiologues (2019) :	115
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	11

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **12mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SLOVAQUIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **2 800 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **24 200**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	24,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	16,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	270
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,41
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	23 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	23+ ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	ND
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	ND

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	7
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	ND
Services de pathologie (laboratoires) :	ND
Chirurgie oncologique :	ND
Chimiothérapie :	ND
Radiothérapie :	ND

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	10
Chirurgiens (2014) :	342
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	18

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	ND
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	ND

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **103mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SLOVÉNIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 044 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **10 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	60
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,52
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 4 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2009
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	17 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	20-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	23
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2013) :	632
Radiologues (2019) :	199
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	28

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **114mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SOMALIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **7 743 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **75 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	25,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	880
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,77
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,02

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	15
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SOUDAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **21 430 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **112 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	5,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	8,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	770
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,67
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,11

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	4
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2014) :	117
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SOUDAN DU SUD

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 526 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **41 700**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	12,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	20,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	760
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,74
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2,52

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2013) :	16
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SRI LANKA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **11 090 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **65 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	12,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	9,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,0 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	760
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,55
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



5 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2017
Cohorte cible prioritaire :	10-11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<0.01

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	35-45 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	6
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	19
Physiciens médicaux (2019) :	11
Chirurgiens (2013) :	50
Radiologues (2019) :	81
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SUÈDE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 011 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **46 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	13,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	10,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,9 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	230
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,30
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 8 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2010
Cohorte cible prioritaire :	10-11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	18 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	23-64/70 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



9 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	13
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	110
Physiciens médicaux (2019) :	49
Chirurgiens (2013) :	642
Radiologues (2019) :	251
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	12

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **200mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SUISSE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 331 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **35 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	5,4
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	3,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	110
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,42
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2006
Cohorte cible prioritaire :	11-14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	21 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-70 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	14
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	21
Physiciens médicaux (2019) :	38
Chirurgiens (2013) :	724
Radiologues (2019) :	154
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	38

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **281mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

SURINAME

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **289 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **2 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	26,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	23,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	48
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,62
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 4 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2013
Cohorte cible prioritaire :	9-13 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,34

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



3 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	19
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	9

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	19
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	96
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	10

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TADJIKISTAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 623 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **22 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	6,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	8,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,8 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	110
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,59
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,09

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	3
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	2351
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TCHAD

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **7 986 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **69 800**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,8
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	20,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	630
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,73
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2014-2015) :	36 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,40

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2013) :	24
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

THAÏLANDE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **35 720 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **222 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	25,6
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	16,4
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	5 100
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,51
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2017
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	4 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2017) :	76 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,05

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-60 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	6
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	4
Physiciens médicaux (2019) :	9
Chirurgiens (2014) :	251
Radiologues (2019) :	81
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	3

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TIMOR-LESTE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **640 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **3 500**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,0
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	28
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	10 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,10

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	76
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **7mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TOGO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **4 062 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **24 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	10,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	19,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,2 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	420
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,68
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2013-2014) :	51 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,68

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	42
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TONGA

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **52 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **260**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	7
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	15 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	ayant une activité sexuelle
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **2mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TRINITÉ-ET-TOBAGO

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **706 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **3 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	**28,5**
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	**19,8**
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	**2,0 %**
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	**97**
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	**0,63**
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	**Oui**



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, moins de 1 sur 10 a reçu sa dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	**Oui**
Échelle du programme de vaccination :	**National**
Année de mise en place :	**2013**
Cohorte cible prioritaire :	**11-15 ans**

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**ND**
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	**ND**
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	**0,08**

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	**cytologie**
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	**18-65 ans**
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	**Oui**
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	**Oui**

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	**Oui**

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**13**
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	**18**

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	**Oui**
Services de pathologie (laboratoires) :	**Oui**
Chirurgie oncologique :	**Oui**
Chimiothérapie :	**Oui**
Radiothérapie :	**Oui**

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	**24**
Physiciens médicaux (2019) :	**24**
Chirurgiens (2014) :	**733**
Radiologues (2019) :	**89**
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	**9**

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	**Oui**
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	**Oui**

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TUNISIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **5 897 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **31 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	5,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	4,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	200
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,54
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,03

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-59 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	13
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	19
Chirurgiens (2014) :	206
Radiologues (2019) :	503
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	38

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **4mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TURKMÉNISTAN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **3 016 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **16 300**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	15,0
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	250
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



9 filles sur 10 dans la cohorte cible prioritaire en 2020 ont reçu leur **dernière dose de vaccin contre le PVH**

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2016
Cohorte cible prioritaire :	9 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	<1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2000) :	7 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	ND
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	10
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	6

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	2697
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TURQUIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **42 260 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **212 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	5,9
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	4,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,5 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 300
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,49
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	19 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



8 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	12
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	22
Chirurgiens (2011) :	290
Radiologues (2019) :	190
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	26

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **11mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

TUVALU

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **ND**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **ND**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	ND
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	ND
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	ND
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	ND
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non

Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH figure au calendrier national de vaccination mais les données de couverture ne sont pas disponibles

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2021
Cohorte cible prioritaire :	ND

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	22 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-49 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

UKRAINE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **23 610 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **300 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	20,3
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	14,3
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 400
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,44
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	9 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2017) :	80 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,20

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	18-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



5 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	4
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	6
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	396
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	ND

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	NSP
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

URUGUAY

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **1 790 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **17 400**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	15,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	11,7
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,1 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	170
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,58
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 4 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2013
Cohorte cible prioritaire :	11 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	17 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,20

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	21-69 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



7 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	9

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	265
Radiologues (2019) :	103
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	21

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **11mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

VANUATU

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **148 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **850**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	14,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	17,1
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	1,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	13
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,86
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020)** :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	test PVH
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-65 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (-) :	ND

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Non
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Non
Chimiothérapie :	Non
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (-) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	222
Radiologues (2019) :	ND
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	0

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

**Les données ne portent que sur le tabac fumé, faute de données suffisantes sur toutes les formes de consommation du tabac.

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **14 470 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **71 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	25,7
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	22,2
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	2,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 000
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,57
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	ND
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,08

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	25-64 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



4 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	8
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2020) :	2

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Non
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	ND
Chirurgiens (2014) :	550
Radiologues (2019) :	77
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	4

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

VIET NAM

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **48 310 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **323 000**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	8,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	6,6
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 400
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,54
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	2 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,05

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	cytologie
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	35-54 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



2 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Non

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	7
Physiciens médicaux (2019) :	9
Chirurgiens (-) :	ND
Radiologues (2019) :	194
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	7

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

YÉMEN

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **14 470 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **75 900**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	1,5
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	2,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	0,3 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	120
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,68
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Non



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



La vaccination contre le PVH ne figure pas au calendrier national de vaccination

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Non
Échelle du programme de vaccination :	-
Année de mise en place :	-
Cohorte cible prioritaire :	-

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	8 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (-) :	ND
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	0,04

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	-
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	-
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	NSP
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	NSP

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



Moins de 1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	NSP

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	1
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2018) :	0

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	NSP
Services de pathologie (laboratoires) :	NSP
Chirurgie oncologique :	NSP
Chimiothérapie :	NSP
Radiothérapie :	NSP

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	5
Chirurgiens (2014) :	79
Radiologues (2019) :	207
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	5

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Oui
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	NSP

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **0mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles NSP = Ne sait pas

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ZAMBIE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **9 018 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **55 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	34,1
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	65,5
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	7,4 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	1 800
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,60
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2019
Cohorte cible prioritaire :	14 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2018) :	46 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	7,92

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	ND
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Oui
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Oui

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2019) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	5
Chirurgiens (2012) :	80
Radiologues (2019) :	8
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	2

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Non

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.

ZIMBABWE

PROFIL POUR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

POPULATION TOTALE, FEMMES (2019) : **7 662 000**

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS, FEMMES (2019) : **57 100**

Morbidité et mortalité

Incidence brute du cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes (2020) :	39,2
Incidence du cancer du col de l'utérus standardisée selon l'âge pour 100 000 femmes (2020) :	61,8
Risque cumulé de cancer du col de l'utérus, 0-74 ans (2020) :	6,7 %
Décès dus au cancer du col de l'utérus (2019) :	2 000
Ratio mortalité/incidence du cancer du col de l'utérus (2020) :	0,65
Existence d'un registre des cancers basé sur la population (2021) :	Oui



Prévention primaire

Couverture vaccinale contre le PVH chez les filles (2020) :



Parmi les filles qui atteignent 15 ans en 2020, 6 sur 10 ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le PVH

Programme de vaccination contre le PVH (2020) :

Inclusion du PVH dans le programme national de vaccination :	Oui
Échelle du programme de vaccination :	National
Année de mise en place :	2018
Cohorte cible prioritaire :	10 ans

Facteurs de risque connexes :

Prévalence de la consommation de tabac, femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	1 %
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque (2015) :	79 %
Incidence du VIH pour 1000 femmes âgées de 15 ans et plus (2020) :	3,06

Prévention secondaire

Existence d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus (2021) :	Oui
Utilisation de tests de dépistage primaire (2021) :	IVA
Tranche d'âge cible du programme (2021) :	30-50 ans
Existence d'un programme/de directives pour renforcer la détection précoce des premiers symptômes au niveau des soins de santé primaires (2021) :	Non
Existence d'un système d'orientation clairement défini depuis les soins primaires vers des soins secondaires et tertiaires (2021):	Non

Dépistage du cancer du col de l'utérus (2019)



1 femme sur 10 âgée de 30 à 49 ans a bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des 5 dernières années

Traitement et soins de soutien

Existence de directives nationales sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus (2021) :	Non

Nombre d'unités de radiothérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	2
Nombre d'unités de curiethérapie pour 10 000 patients ayant un cancer (2021) :	1

Services de diagnostic et de traitement du cancer généralement disponibles (2021) :

Centres ou services de cancérologie au niveau tertiaire :	Oui
Services de pathologie (laboratoires) :	Oui
Chirurgie oncologique :	Oui
Chimiothérapie :	Oui
Radiothérapie :	Oui

Nombre de membres de personnel médical (pour 10 000 patients ayant un cancer) :

Radiothérapeutes (2019) :	ND
Physiciens médicaux (2019) :	3
Chirurgiens (2014) :	46
Radiologues (2019) :	3
Médecins spécialistes en médecine nucléaire (2019):	1

Des soins palliatifs pour les patients ayant des maladies non transmissibles sont généralement disponibles dans le système de santé publique (2021) :

Dans les établissements de soins de santé primaires :	Non
Au niveau des soins de santé communautaires ou à domicile :	Oui

Consommation annuelle déclarée d'opioïdes, hors méthadone, en équivalent de morphine orale par habitant (2017) : **<1mg**

Cibles de la stratégie OMS d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030

90 % des filles entièrement vaccinées contre le PVH à l'âge de 15 ans

70 % des femmes bénéficiant d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à 35 ans, puis à 45 ans

90 % des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée sont traitées

ND = données non disponibles

IVA = Inspection visuelle après application d'acide acétique

*** Couverture du programme :** % de la population nationale cible (parmi les filles âgées de 9 à 14 ans)
† Couverture à l'âge de 15 ans : % des personnes qui atteignent 15 ans qui ont été vaccinées contre le PVH à n'importe quel moment entre 9 et 14 ans

Voir les Notes explicatives pour les descriptions des indicateurs.