

АВСТРАЛИЯ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **12 650 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **78 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	340
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,36
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2007
Основная возрастная когорта:	12-13 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	11%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-74 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	11
медицинских физиков (2019):	36
хирургов (2015):	223
радиотерапевтов (2019):	102
врачей ядерной медицины (2019):	20

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **274мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летию: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

АВСТРИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **4 546 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **43 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	210
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,44
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2014
Основная возрастная когорта:	9 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	22%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	20+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 9 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	12
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	22
медицинских физиков (2019):	46
хирургов (2014):	1695
радиотерапевтов (2019):	348
врачей ядерной медицины (2019):	51

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **511мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

АЗЕРБАЙДЖАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 032 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **39 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	280
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	<1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	6
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	3

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

АЛБАНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 414 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **16 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	9,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	48
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,56
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	7%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2008-2009):	42%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,02

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	40-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30-49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	8
медицинских физиков (2019):	2
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	36
врачей ядерной медицины (2019):	4

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **12мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

АЛЖИР

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **21 300 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **95 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,56
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2017):	46%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,05

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	6
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	19
хирургов (2013):	604
радиотерапевтов (2019):	264
врачей ядерной медицины (2019):	21

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

АНГОЛА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **16 080 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **104 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	37,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	4,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 900
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,61
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2016):	44%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	1,32

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	<1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	19
врачей ядерной медицины (2019):	2

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **3мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

АНДОРРА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **НД**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **НД**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин

Нет данных

Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2014
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	24%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **69мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

АНТИГУА И БАРБУДА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **50 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **310**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	9
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2018
Основная возрастная когорта:	9-13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

АРГЕНТИНА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **22 940 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **171 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 500
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,56
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2011
Основная возрастная когорта:	11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	19%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,09

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	НД
Лабораторно-диагностические услуги:	НД
Онкологическая хирургия:	НД
Химиотерапия:	НД
Лучевая терапия:	НД

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	13
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	310
врачей ядерной медицины (2019):	31

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **21мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летию возраста: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

АРМЕНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 566 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **12 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	99
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,65
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2005):	68%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,08

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-59 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	6
хирургов (2014):	1144
радиотерапевтов (2019):	306
врачей ядерной медицины (2019):	8

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

АФГАНИСТАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **18 510 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **128 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	540
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,69
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,04

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **200 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	21
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,72
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2015
Основная возрастная когорта:	9-10 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,25

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	16
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	64
врачей ядерной медицины (2019):	11

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **9мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летию: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БАНГЛАДЕШ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **80 570 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **360 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	5 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	15%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	2
медицинских физиков (2019):	22
хирургов (2012):	173
радиотерапевтов (2019):	33
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БАРБАДОС

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **148 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	26,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	28
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,67
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	10–11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2017):	31%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	9

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	8
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	145
радиотерапевтов (2019):	32
врачей ядерной медицины (2019):	8

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	6мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БАХРЕЙН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **586 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 700**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	3,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	3,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	12
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	5%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	16
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	286
хирургов (2012):	1918
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	48

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **7мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

БЕЛАРУСЬ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 052 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **58 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	300
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,43
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	9%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,09

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	18+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	28
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2013):	1520
радиотерапевтов (2019):	161
врачей ядерной медицины (2019):	8

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **7мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	28
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,74
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	9–14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,66

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	18–49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	0
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (2014):	642
радиотерапевтов (2019):	335
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БЕЛЬГИЯ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 828 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **57 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	240
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,37
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2011
Основная возрастная когорта:	12-14 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	19%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	20
медицинских физиков (2019):	27
хирургов (2012):	697
радиотерапевтов (2019):	186
врачей ядерной медицины (2019):	38

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **272мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

БЕНИН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 910 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **43 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	9,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	670
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,66
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2011-2012):	40%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,31

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	101
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БОЛГАРИЯ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 600 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **51 000**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	28,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	420
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,5
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	12-13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	30%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-59 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	13
медицинских физиков (2019):	24
хирургов (2013):	1656
радиотерапевтов (2019):	141
врачей ядерной медицины (2019):	15

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	17мг
--	-------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО)

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 733 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **43 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	34,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	36,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,53
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	5%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2003):	28%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,09

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	5
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	13
хирургов (2012):	1212
радиотерапевтов (2019):	111
врачей ядерной медицины (2019):	9

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	НЗ
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летию: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 684 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **18 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	130
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,49
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	28%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	12
хирургов (2013):	191
радиотерапевтов (2019):	131
врачей ядерной медицины (2019):	19

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **13мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

БОТСВАНА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 190 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **9 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	30,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	34,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	160
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,55
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2015
Основная возрастная когорта:	9–13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	8%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	8,74

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	зависит от метода и ВИЧ-статуса
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	5
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	10

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (2014):	205
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **6мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БРАЗИЛИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **107 300 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **608 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	9 500
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,52
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2014
Основная возрастная когорта:	9–14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	10%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25–64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	6
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	НЗ
Лабораторно-диагностические услуги:	НЗ
Онкологическая хирургия:	НЗ
Химиотерапия:	НЗ
Лучевая терапия:	НЗ

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	13
медицинских физиков (2019):	13
хирургов (2013):	1257
радиотерапевтов (2019):	230
врачей ядерной медицины (2019):	17

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	9мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **208 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	25,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	20,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	18
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,26
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2012
Основная возрастная когорта:	13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	20-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	20
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	33
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **8мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

БУРКИНА-ФАСО

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **10 170 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **70 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,74
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2010):	68%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,08

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-48 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	2
хирургов (2014):	31
радиотерапевтов (2019):	69
врачей ядерной медицины (2019):	3

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БУРУНДИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 812 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **35 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	26,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент	
заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	49,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	5,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 500
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,71
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2010):	32%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,14

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	0
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	7
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

БУТАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **358 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	30
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



9 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) первую дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,07

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (2014):	103
радиотерапевтов (2019):	51
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ВАНУАТУ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **148 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **850**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	13
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,86
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	222
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	0мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ВЕНГРИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 076 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **65 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	24,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	470
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,39
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2014
Основная возрастная когорта:	12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	24%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	6
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	12
медицинских физиков (2019):	14
хирургов (2011):	453
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	16

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **88мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **14 470 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **71 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	25,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	22,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 000
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,08

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	550
радиотерапевтов (2019):	77
врачей ядерной медицины (2019):	4

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ВЬЕТНАМ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **48 310 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **323 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 400
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,54
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,05

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	35-54 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	7
медицинских физиков (2019):	9
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	194
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ГАБОН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 066 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **6 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	21,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	30,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	96
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,5
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2012):	64%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,92

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	6

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ГАЙАНА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **390 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **3 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	31
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	29,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	91
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,52
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	9–16 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2009):	63%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,55

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25–49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	13
медицинских физиков (2019):	13
хирургов (2014):	599
радиотерапевтов (2019):	133
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

ГАИТИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 705 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **50 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	570
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,75
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2012):	59%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,64

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	40-80 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НЗ

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	0
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (2014):	93
радиотерапевтов (2019):	32
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ГАМБИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 183 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **6 300**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	23,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	42,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	140
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,7
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) первую дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	9–14 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2013):	57%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	1,54

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2011):	142
радиотерапевтов (2019):	0
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	27,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 200
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,61
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	<1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2014):	26%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	1,14

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	25
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	39
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ГВАТЕМАЛА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **8 922 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **41 700**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	20,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	810
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,56
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



2 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2018
Основная возрастная когорта:	10-14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2014-2015):	41%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-55 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	123
радиотерапевтов (2019):	72
врачей ядерной медицины (2019):	2

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **2мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ГВИНЕЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **6 605 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **55 100**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	30,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	50,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	5,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 500
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,71
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2018):	39%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,77

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	0
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ГВИНЕЯ-БИСАУ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **982 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **7 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	23,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	39,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	4,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	150
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,72
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	1,4

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НД

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	НД
Лабораторно-диагностические услуги:	НД
Онкологическая хирургия:	НД
Химиотерапия:	НД
Лучевая терапия:	НД

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	НД
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НД

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **Омг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ГЕРМАНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **42 270 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **370 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11
Стандартизованный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,44
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2007
Основная возрастная когорта:	9–14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	17%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология (тест на ВПЧ начиная с возраста 35 лет)
Целевой возрастной контингент программы (2021):	20–65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	26
хирургов (2013):	901
радиотерапевтов (2019):	163
врачей ядерной медицины (2019):	16

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **391мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ГОНДУРАС


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **4 877 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **27 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,0
Умерших от рака шейки матки (2019):	490
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



5 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2017):	85%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,04

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	447
радиотерапевтов (2019):	83
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летию: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ГРЕНАДА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **56 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **470**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	10
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



3 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	9 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	-----

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ГРЕЦИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 333 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **62 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	240
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,4
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	11-12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	27%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	женщины в период сексуальной активности
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 9 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	68
хирургов (2013):	1668
радиотерапевтов (2019):	493
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **118мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ГРУЗИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 091 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **25 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	190
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,62
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



2 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	10-12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	7%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,12

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	14
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	19
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	1502
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ДАНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 902 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **26 700**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	150
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,36
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2007
Основная возрастная когорта:	12-14 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	17%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	23-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	44
медицинских физиков (2019):	44
хирургов (2012):	613
радиотерапевтов (2019):	156
врачей ядерной медицины (2019):	26

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **275мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ДЖИБУТИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **462 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **3 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	40
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,7
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-

Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,13

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (2013):	252
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ДОМИНИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **НД**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **НД**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин

Нет данных

Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	11-12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	18-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **Омг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 373 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **30 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	560
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,66
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	9-14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	7%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2013):	63%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,41

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-70 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	6
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	78
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **2мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЕГИПЕТ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **49 670 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **261 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	620
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,56
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-

Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	<1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,02

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	НД
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НД

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	НД
Лабораторно-диагностические услуги:	НД
Онкологическая хирургия:	НД
Химиотерапия:	НД
Лучевая терапия:	НД

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	16
хирургов (2014):	1859
радиотерапевтов (2019):	283
врачей ядерной медицины (2019):	8

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	НД
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НД

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **2мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЗАМБИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **9 018 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **55 100**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	34,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	65,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	7,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 800
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2018):	46%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	7,92

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	НД
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	5
хирургов (2012):	80
радиотерапевтов (2019):	8
врачей ядерной медицины (2019):	2

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЗИМБАБВЕ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **7 662 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **57 100**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	39,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	61,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	6,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 000
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,65
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2018
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2015):	79%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	3,06

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-50 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	3
хирургов (2014):	46
радиотерапевтов (2019):	3
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)


† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	1,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	120
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,68
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	8%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,04

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	НЗ
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НЗ

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	НЗ
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	НЗ
Лабораторно-диагностические услуги:	НЗ
Онкологическая хирургия:	НЗ
Химиотерапия:	НЗ
Лучевая терапия:	НЗ

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	5
хирургов (2014):	79
радиотерапевтов (2019):	207
врачей ядерной медицины (2019):	5

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НЗ

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	0мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ИЗРАИЛЬ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **4 282 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **22 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	4,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	130
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,49
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



5 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2010
Основная возрастная когорта:	13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	13%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30–54 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	5

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2013):	1182
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	28

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **242мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ИНДИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **656 300 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **4 191 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	45 300
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,62
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	12%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2015-2016):	40%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	5
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	3
медицинских физиков (2019):	16
хирургов (2009):	273
радиотерапевтов (2019):	346
врачей ядерной медицины (2019):	3

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ИНДОНЕЗИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **134 400 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **843 000**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	27
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	24,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	19 300
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	поднациональная
Год начала:	2018
Основная возрастная когорта:	11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	4%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,1

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-50 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	<1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	1
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	26
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НЗ

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ИОРДАНИЯ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **4 988 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **13 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	64
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,62
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	13%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НЗ

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	27

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет


**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	1,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	160
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,67
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	НЗ
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НЗ

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	24
хирургов (2013):	423
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	4

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	0мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **41 020 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **148 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	500
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,61
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	22
медицинских физиков (2019):	32
хирургов (2014):	116
радиотерапевтов (2019):	211
врачей ядерной медицины (2019):	18

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ИРЛАНДИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 460 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **14 900**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,31
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2010
Основная возрастная когорта:	12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	18%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2017):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2017):	4

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	11
медицинских физиков (2019):	68
хирургов (2014):	727
радиотерапевтов (2019):	128
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	НД
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НД

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **190мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ИСЛАНДИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **169 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	9,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	9
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,31
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2011
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	12%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	23-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	12
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	6

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	20
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	1106
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **359mg**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ИСПАНИЯ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **23 780 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **211 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	860
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,42
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2007
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	22%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология (тест на ВПЧ начиная с возраста 35 лет)
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	5

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	26
медицинских физиков (2019):	31
хирургов (2014):	395
радиотерапевтов (2019):	225
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **245мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ИТАЛИЯ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **31 090 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **339 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 200
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,32
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	17%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология (тест на ВПЧ начиная с возраста 30 лет)
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	25
хирургов (2011):	296
радиотерапевтов (2019):	44
врачей ядерной медицины (2019):	17

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **109мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

КАБО-ВЕРДЕ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **274 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 300**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	27
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,59
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2021
Основная возрастная когорта:	НД
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	5%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2011):	889
радиотерапевтов (2019):	47
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программ: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КАЗАХСТАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **9 552 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **60 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	810
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,47
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	7%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,16

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-70 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	5

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	191
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НЗ

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КАМБОДЖА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **8 439 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **45 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	730
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2014):	67%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,05

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КАМЕРУН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **12 940 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **90 300**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	20,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	33,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 600
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,65
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) первую дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2020
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2018):	52%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	1,06

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2013):	53
радиотерапевтов (2019):	25
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КАНАДА


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **18 850 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **136 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	580
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,45
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	10%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-69 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	29
хирургов (2013):	301
радиотерапевтов (2019):	94
врачей ядерной медицины (2019):	11

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **436мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КАТАР

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **699 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	3,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	4,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	13
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,48
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2020
Основная возрастная когорта:	9–14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,04

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21–65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	20
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	7

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	159
хирургов (2011):	532
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	40

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КЕНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **26 450 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **134 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	31,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	3 400
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,61
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2014):	44%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	1,4

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (2014):	66
радиотерапевтов (2019):	63
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	18
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,72
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	12-13 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	22%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	НЗ
---	-----------

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	15
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	124
хирургов (2012):	292
радиотерапевтов (2019):	320
врачей ядерной медицины (2019):	14

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	62мг
--	-------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

КИРИБАТИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **60 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **610**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	30
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	27%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	-----

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КИТАЙ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **698 200 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **4 134 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	51 600
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,54
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	35–64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	<1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	5
хирургов (2012):	684
радиотерапевтов (2019):	282
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	2мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КОЛУМБИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **25 630 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **108 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 300
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,53
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



3 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2012
Основная возрастная когорта:	9–17 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	5%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2015):	71%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,04

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25–69 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	5
хирургов (2014):	272
радиотерапевтов (2019):	128
врачей ядерной медицины (2019):	8

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **15мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ


ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **422 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **2 400**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	38,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	56
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	6,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,65
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	11%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2012):	48%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КОНГО


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 693 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **17 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	22,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	200
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,61
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2011-2012):	48%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	3,93

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (2013):	29
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **43 470 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **327 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	31,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	4 800
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,71
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2013–2014):	27%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,29

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	<1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2013):	11
радиотерапевтов (2019):	19
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **13 110 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **113 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	700
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	<1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	НД
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2016):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2016):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КОСТА-РИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 525 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **10 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	160
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,52
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	5%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,37

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	5
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	25
хирургов (2014):	313
радиотерапевтов (2019):	121
врачей ядерной медицины (2019):	6

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **9мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

КОТ-Д'ИВУАР

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **12 740 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **82 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	31,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 400
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,69
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2011-2012):	50%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,45

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	220
радиотерапевтов (2019):	21
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)


† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	20,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	670
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	11%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2019):	79%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,18

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	4
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2013):	1763
радиотерапевтов (2019):	151
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

КУВЕЙТ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 644 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **2 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	3,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	32
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,53
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	223
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	558
врачей ядерной медицины (2019):	140

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **5мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

КЫРГЫЗСТАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 242 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **13 700**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	310
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2012):	67%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,09

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	НЗ

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	2
хирургов (2013):	2854
радиотерапевтов (2019):	1069
врачей ядерной медицины (2019):	5

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	НЗ
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НЗ

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 570 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **19 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	190
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,51
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) первую дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2020
Основная возрастная когорта:	10–14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	10%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,13

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	84
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЛАТВИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 029 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **16 300**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	26,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	130
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,51
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2010
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	20%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-70 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	37
хирургов (2014):	867
радиотерапевтов (2019):	246
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **41мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	49,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	56,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	5,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	370
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,67
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	5%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2014):	76%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	9,54

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	НД
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НД

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	НД
Лабораторно-диагностические услуги:	НД
Онкологическая хирургия:	НД
Химиотерапия:	НД
Лучевая терапия:	НД

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	21
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	НД
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НД

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ЛИБЕРИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 456 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **17 800**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	26,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	40,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	4,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	470
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,71
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2013):	29%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,51

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	НЗ
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	0
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2009):	82
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЛИВАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 406 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **16 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	3,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	3,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	130
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,59
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	29%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	17
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	12
хирургов (2014):	1473
радиотерапевтов (2019):	231
врачей ядерной медицины (2019):	9

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЛИВИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 355 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **12 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	130
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,59
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,04

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	95
врачей ядерной медицины (2019):	16

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЛИТВА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 483 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **22 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	28,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	220
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,47
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



3 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	18%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-58 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	5

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	21
медицинских физиков (2019):	28
хирургов (2013):	1486
радиотерапевтов (2019):	219
врачей ядерной медицины (2019):	11

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **29мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ЛЮКСЕМБУРГ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **305 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **2 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	10
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,42
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2008
Основная возрастная когорта:	9–13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)*:	19%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25–69 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2017):	12
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2017):	6

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	18
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	890
радиотерапевтов (2019):	260
врачей ядерной медицины (2019):	43

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **144мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МАВРИКИЙ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **643 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **5 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	49
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,5
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,56

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	17
хирургов (2014):	308
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **2мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

МАВРИТАНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 254 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **13 300**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	28,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	330
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,67
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2021
Основная возрастная когорта:	НД
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	124
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НЗ

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МАДАГАСКАР

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **13 520 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **84 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	27,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент	
заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	41,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	4,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	3 000
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,65
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	12%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2008-2009):	9%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,31

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (2013):	50
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МАЛАВИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **9 443 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **48 100**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	42,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	67,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	7,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 900
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,7
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2015-2016):	62%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	2,54

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	31
радиотерапевтов (2019):	1
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **3мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МАЛАЙЗИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **15 530 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **76 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 000
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2010
Основная возрастная когорта:	13 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,06

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	3
медицинских физиков (2019):	65
хирургов (2011):	449
радиотерапевтов (2019):	114
врачей ядерной медицины (2019):	114

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	4мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	36,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	4,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 700
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,73
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2018):	27%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,33

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (2014):	115
радиотерапевтов (2019):	46
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	0мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **195 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **540**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	23,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	24,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	22
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,52
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	10 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	15-50 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	143
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МАЛЬТА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **220 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	3,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	4
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,38
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	19%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-35 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	12
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	17
медицинских физиков (2019):	17
хирургов (2014):	928
радиотерапевтов (2019):	168
врачей ядерной медицины (2019):	22

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	9мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МАРОККО

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **18 380 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **121 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 500
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,55
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	9
хирургов (2011):	480
радиотерапевтов (2019):	135
врачей ядерной медицины (2019):	12

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **НД**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **НД**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин

Нет данных

Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	8%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	40-75 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МЕКСИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **65 170 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **316 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	4 800
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,46
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



9 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2012
Основная возрастная когорта:	9–11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,07

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология (тест на ВПЧ начиная с возраста 34 лет)
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25–64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	НД
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	7
хирургов (2012):	1358
радиотерапевтов (2019):	203
врачей ядерной медицины (2019):	13

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **3мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ)

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **56 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **450**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	8
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



3 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2010
Основная возрастная когорта:	10 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-45 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МОЗАМБИК

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ


ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **15 620 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **130 000**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	33,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	50,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	5,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	3 300
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,72
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	5%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2011):	37%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	7,44

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	15–54 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	<1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	1
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (2013):	73
радиотерапевтов (2019):	2
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет


[См. пояснения для описания показателей.](#)

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2006
Основная возрастная когорта:	11 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	НД
--	-----------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

МОНГОЛИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 635 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **9 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	20,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	160
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,54
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	7%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	7
хирургов (2014):	732
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	5

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

МЬЯНМА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **28 000 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **176 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	25,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	22,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	3 900
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,63
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



9 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) первую дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2020
Основная возрастная когорта:	9 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	20%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	НД
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	4
медицинских физиков (2019):	4
хирургов (2013):	69
радиотерапевтов (2019):	49
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

НАМИБИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 286 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **8 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	28,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	37,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	130
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	5%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2013):	70%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	5

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	6
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	27
хирургов (2013):	377
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	18

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет


[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	50%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НЗ

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	Омг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

НЕПАЛ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **15 560 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **83 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 000
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,67
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	11%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,02

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-50 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	5
хирургов (2014):	97
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

НИГЕР

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **11 600 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **86 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	490
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,76
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2012):	54%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,06

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	2
хирургов (2014):	36
радиотерапевтов (2019):	2
врачей ядерной медицины (2019):	2

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

НИГЕРИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **99 130 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **763 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	10 600
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,66
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	<1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2018):	46%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,66

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НЗ

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	<1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	6
медицинских физиков (2019):	9
хирургов (2014):	158
радиотерапевтов (2019):	30
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

НИДЕРЛАНДЫ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **8 582 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **78 300**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	270
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,33
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



5 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2010
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	19%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0,01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	22
медицинских физиков (2019):	35
хирургов (2013):	460
радиотерапевтов (2019):	172
врачей ядерной медицины (2019):	13

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **291мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

НИКАРАГУА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 320 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **14 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	21,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	21,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	370
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2001):	14%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,09

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-100 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	5
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	8
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2014):	659
радиотерапевтов (2019):	377
врачей ядерной медицины (2019):	3

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **2мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин

Нет данных

Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	женщины в период сексуальной активности
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **3мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 432 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **16 400**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	61
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,47
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	11%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-69 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2015):	238
радиотерапевтов (2019):	133
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **122мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

НОРВЕГИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 662 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **20 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	120
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,24
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	15%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-69 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	12
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	42
медицинских физиков (2019):	54
хирургов (2012):	1094
радиотерапевтов (2019):	238
врачей ядерной медицины (2019):	16

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **230мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **29 020 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **150 000**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	34,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	62,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	7,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	6 400
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,64
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2018
Основная возрастная когорта:	14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2016–2017):	37%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	2,51

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (2010):	24
радиотерапевтов (2019):	14
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	0мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летию в возрасте: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 004 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **4 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	57
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,48
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



2 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,06

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	15
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	74
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	1064
врачей ядерной медицины (2019):	32

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	42
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	<1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	75
хирургов (2013):	1674
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	27

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	1мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ОСТРОВА КУКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **НД**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **НД**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин

Нет данных

Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



9 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2011
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	20%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ПАКИСТАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **105 100 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **741 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	4,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	4 000
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,64
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	7%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,07

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	2
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2012):	129
радиотерапевтов (2019):	57
врачей ядерной медицины (2019):	14

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин

Нет данных

Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2008
Основная возрастная когорта:	НД
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	8%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21–64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **12мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

См. пояснения для описания показателей.

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ПАНАМА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 120 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **8 700**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	180
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,56
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



5 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2008
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,34

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	20-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	18
хирургов (2014):	513
радиотерапевтов (2019):	199
врачей ядерной медицины (2019):	6

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **4 296 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **26 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	24,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	29,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	660
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	25%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2018):	28%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,69

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2016):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2016):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	30
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ПАРАГВАЙ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 464 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **14 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	33,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	34,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	520
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,55
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	4%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,15

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	женщины репродуктивного возраста
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2019):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	4
хирургов (2014):	317
радиотерапевтов (2019):	44
врачей ядерной медицины (2019):	4

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	25,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	22,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 900
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,54
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2015
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2000):	18%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,07

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	1321
радиотерапевтов (2019):	116
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	4мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ПОЛЬША

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **19 530 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **195 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 900
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,55
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	19%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-59 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	НЗ
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	НЗ
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	25
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2014):	321
радиотерапевтов (2019):	136
врачей ядерной медицины (2019):	10

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **37мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ПОРТУГАЛИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 390 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **54 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	330
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,44
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



9 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2008
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	15%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,04

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	15
медицинских физиков (2019):	23
хирургов (2013):	989
радиотерапевтов (2019):	212
врачей ядерной медицины (2019):	14

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **86мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **25 580 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **135 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,32
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	20+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	5
медицинских физиков (2019):	6
хирургов (2014):	570
радиотерапевтов (2019):	117
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	48мг
--	-------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 105 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **19 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	22,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	210
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,52
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	поднациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2005):	42%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,17

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-61 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	10
хирургов (2013):	368
радиотерапевтов (2019):	196
врачей ядерной медицины (2019):	2

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **7мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **78 270 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **906 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	7 400
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,49
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	13%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	18-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2014):	439
радиотерапевтов (2019):	456
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **5мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

РУАНДА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **6 421 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **29 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	28,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	940
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,67
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2011
Основная возрастная когорта:	12 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	7%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2014-2015):	55%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,68

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	39
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

РУМЫНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **9 946 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **124 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	34,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	22,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 900
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,53
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	18%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,02

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	3
хирургов (2013):	1097
радиотерапевтов (2019):	206
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	23мг
--	-------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

САЛЬВАДОР

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 430 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **17 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	450
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



2 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) первую дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2020
Основная возрастная когорта:	9 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,15

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-59 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2009):	1183
радиотерапевтов (2019):	62
врачей ядерной медицины (2019):	2

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **6мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны


* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	6
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	15%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	146
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

САН-МАРИНО

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **НД**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **НД**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин

Нет данных

Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



2 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2008
Основная возрастная когорта:	11–14 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	26–65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	НД
--	-----------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **107 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **490**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	9
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,77
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2021
Основная возрастная когорта:	НД
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2008-2009):	57%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **14 480 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **50 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	160
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,5
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,02

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	25
медицинских физиков (2019):	102
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	1114
врачей ядерной медицины (2019):	32

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **7мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 041 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **12 100**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	68
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,55
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



3 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	24-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	5
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	23
хирургов (2011):	977
радиотерапевтов (2019):	295
врачей ядерной медицины (2019):	22

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **48 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **340**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	9
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



9 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2014
Основная возрастная когорта:	10 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	----

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НЗ

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **7мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СЕНЕГАЛ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **8 350 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **42 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	22,6
Стандартизованный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	36,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	4,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 400
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,68
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



3 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2018
Основная возрастная когорта:	9–13 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2014):	69%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,09

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	3
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	2
хирургов (2011):	36
радиотерапевтов (2019):	47
врачей ядерной медицины (2019):	3

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **3мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **54 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **420**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	8
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	11-12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	женщины в период сексуальной активности
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **3мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летию: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

СЕНТ-КИТС И НЕВИС

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **НД**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **НД**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин

Нет данных

Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	11 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	16-69 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **Омг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СЕНТ-ЛЮСИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **93 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **590**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	21,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	12
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,65
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	11-12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	15-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	0
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (2014):	532
радиотерапевтов (2019):	106
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СЕРБИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **4 475 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **57 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	27
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	640
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,53
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	36%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	6
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	10
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	13

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **37мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СИНГАПУР

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 766 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **11 500**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	85
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,56
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2010
Основная возрастная когорта:	9–26 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	4%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	16
медицинских физиков (2019):	16
хирургов (2013):	389
радиотерапевтов (2019):	115
врачей ядерной медицины (2019):	11

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **12мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **8 516 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **43 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	2,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	190
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,64
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-50 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	5
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	13
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	4

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СЛОВАКИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 800 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **24 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	24,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	270
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,41
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	23%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	23+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	НД
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НД

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	НД
Лабораторно-диагностические услуги:	НД
Онкологическая хирургия:	НД
Химиотерапия:	НД
Лучевая терапия:	НД

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	10
хирургов (2014):	342
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	18

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	НД
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НД

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **103мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

СЛОВЕНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 044 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **10 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	60
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,52
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2009
Основная возрастная когорта:	11 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	17%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	20-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	23
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2013):	632
радиотерапевтов (2019):	199
врачей ядерной медицины (2019):	28

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **114мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **34 180 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **309 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11
Стандартизованный по возрасту коэффициент	
заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	9,9
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,3
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2008
Основная возрастная когорта:	12-13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	12%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	16
медицинских физиков (2019):	38
хирургов (2012):	485
радиотерапевтов (2019):	82
врачей ядерной медицины (2019):	2

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **160мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **166 200 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **1 441 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент	
заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	7 000
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,42
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2006
Основная возрастная когорта:	11–12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	17%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21–64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	НД
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	НД

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	17
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	42
хирургов (2011):	539
радиотерапевтов (2019):	183
врачей ядерной медицины (2019):	18

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **324мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **329 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **2 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	25,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	41
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,62
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) первую дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	9 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	20%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2011):	99
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СОМАЛИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **7 743 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **75 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	25,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	880
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,77
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,02

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	15
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СУДАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **21 430 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **112 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	770
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,67
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,11

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	4
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2014):	117
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СУРИНАМ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **289 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **2 000**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	26,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	23,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	48
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,62
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	9–13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,34

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	19
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	9

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	19
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	96
врачей ядерной медицины (2019):	10

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 915 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **32 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	21,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	260
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,73
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2013):	12%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,94

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2012):	12
радиотерапевтов (2019):	10
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ТАДЖИКИСТАН


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **4 623 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **22 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	8,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	110
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,59
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,09

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	3
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	2351
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ТАИЛАНД

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **35 720 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **222 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	25,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	5 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,51
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	4%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2017):	76%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,05

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-60 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	6
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	4
медицинских физиков (2019):	9
хирургов (2014):	251
радиотерапевтов (2019):	81
врачей ядерной медицины (2019):	3

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ТИМОР-ЛЕШТИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **640 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **3 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	28
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,6
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	10%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,1

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	76
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	7мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	420
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,68
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2013–2014):	51%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,68

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	0

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	42
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ТОНГА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **52 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **260**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	7
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	15%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	женщины в период сексуальной активности
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	----

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **2мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ТРИНИДАД И ТОБАГО

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **706 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **3 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	28,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	97
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,63
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	11-15 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,08

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	18-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	18

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	24
медицинских физиков (2019):	24
хирургов (2014):	733
радиотерапевтов (2019):	89
врачей ядерной медицины (2019):	9

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет


[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	НД
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	НД
Умерших от рака шейки матки (2019):	НД
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	НД
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2021
Основная возрастная когорта:	НД
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	22%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ТУНИС

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 897 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **31 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	4,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	200
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,54
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-59 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	19
хирургов (2014):	206
радиотерапевтов (2019):	503
врачей ядерной медицины (2019):	38

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **4мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ТУРКМЕНИСТАН


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **3 016 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **16 300**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	250
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,57
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



9 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	<1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2000):	7%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	НД
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2018):	6

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	2697
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ТУРЦИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **42 260 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **212 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	4,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 300
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,49
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	19%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	12
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	22
хирургов (2011):	290
радиотерапевтов (2019):	190
врачей ядерной медицины (2019):	26

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **11мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

УГАНДА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ


ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **22 460 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **99 400**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	30
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	56,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	6,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	4 400
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,66
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



3 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2015
Основная возрастная когорта:	10 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2011):	51%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	2,01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	<1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	0
хирургов (2012):	63
радиотерапевтов (2019):	13
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

УЗБЕКИСТАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **16 530 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **78 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	840
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,58
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



9 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2019
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,07

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2017):	2
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2017):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	2

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

УКРАИНА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **23 610 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **300 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	20,3
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	2 400
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,44
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	9%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2017):	80%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,2

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	18-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	6
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	396
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	НЗ
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	НЗ

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

УРУГВАЙ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 790 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **17 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	170
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,58
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	11 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	17%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,2

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21-69 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	265
радиотерапевтов (2019):	103
врачей ядерной медицины (2019):	21

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **11мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ФИДЖИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **439 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **3 200**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	30,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	29,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	86
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,68
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



4 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	8-13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	11%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,2

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-70 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	105
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **3мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ФИЛИППИНЫ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **53 800 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **335 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	3 100
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,51
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	поднациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	9–14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	6%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2008):	11%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,03

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25–55 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	13
медицинских физиков (2019):	8
хирургов (2014):	177
радиотерапевтов (2019):	108
врачей ядерной медицины (2019):	8

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **<1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ФИНЛЯНДИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 805 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **27 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	6,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	62
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,36
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2013
Основная возрастная когорта:	10-12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	15%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 9 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	14
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	180
медицинских физиков (2019):	54
хирургов (2014):	1227
радиотерапевтов (2019):	216
врачей ядерной медицины (2019):	90

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **128мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ФРАНЦИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **33 610 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **301 000**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	7
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	1 600
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,43
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



3 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2006
Основная возрастная когорта:	11–14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	26%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология (тест на ВПЧ начиная с возраста 30 лет)
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25–65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	11
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	15
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2014):	486
радиотерапевтов (2019):	221
врачей ядерной медицины (2019):	13

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **146мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ХОРВАТИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 140 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **26 600**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	160
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,45
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2016
Основная возрастная когорта:	14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	31%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 9 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	21
хирургов (2013):	829
радиотерапевтов (2019):	313
врачей ядерной медицины (2019):	26

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **36мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **2 393 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **25 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент	
заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	21,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	230
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,75
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	0
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	34
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	20,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	630
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,73
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-

Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2014-2015):	36%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,4

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2013):	24
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	0мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ЧЕРНОГОРИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **317 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **3 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	35,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	26,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	20
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,48
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	33%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 3 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	НЗ
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	25
медицинских физиков (2019):	4
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	211
врачей ядерной медицины (2019):	17

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **24мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

НЗ = не знаю

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 429 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **55 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	14,2
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	9,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	350
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,52
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок, но данные об охвате не доступны

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2012
Основная возрастная когорта:	13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	24%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	15+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	39
медицинских физиков (2019):	22
хирургов (2013):	1290
радиотерапевтов (2019):	229
врачей ядерной медицины (2019):	19

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **109мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ЧИЛИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **9 610 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **51 900**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,5
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	11,1
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,1%
Умерших от рака шейки матки (2019):	780
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,53
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2014
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	26%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2015-2016):	39%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,13

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	25-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	6
хирургов (2012):	1337
радиотерапевтов (2019):	135
врачей ядерной медицины (2019):	8

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **18мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ШВЕЙЦАРИЯ


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **4 331 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **35 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	5,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	3,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	110
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,42
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2006
Основная возрастная когорта:	11–14 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	21%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21–70 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 8 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	14
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	21
медицинских физиков (2019):	38
хирургов (2013):	724
радиотерапевтов (2019):	154
врачей ядерной медицины (2019):	38

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	281мг
--	--------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ШВЕЦИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 011 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **46 800**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,4
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	0,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	230
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,3
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2010
Основная возрастная когорта:	10-11 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	18%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	тест на ВПЧ
Целевой возрастной контингент программы (2021):	23-64/70 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 9 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	13
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	110
медицинских физиков (2019):	49
хирургов (2013):	642
радиотерапевтов (2019):	251
врачей ядерной медицины (2019):	12

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **200мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ШРИ-ЛАНКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **11 090 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **65 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	9,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,0%
Умерших от рака шейки матки (2019):	760
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,55
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



5 из 10 девочек, относящихся в 2020 году к основной возрастной когорте, получила(и) последнюю дозу вакцины


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	10-11 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0,01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	35-45 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 2 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	6
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	19
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2013):	50
радиотерапевтов (2019):	81
врачей ядерной медицины (2019):	1

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **1мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЭКВАДОР

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **8 683 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **36 600**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	17,4
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	16
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,7%
Умерших от рака шейки матки (2019):	840
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,53
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



7 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2014
Основная возрастная когорта:	9 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	3%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,1

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология (тест на ВПЧ начиная с возраста 30 лет)
Целевой возрастной контингент программы (2021):	21-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	9
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	3
хирургов (2014):	1946
радиотерапевтов (2019):	154
врачей ядерной медицины (2019):	4

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **2мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **602 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **4 500**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	32,8
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	56
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,59
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	3
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЭРИТРЕЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 744 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **12 400**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	10,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,8%
Умерших от рака шейки матки (2019):	130
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,73
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	<1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,11

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Нет

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	3
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЭСВАТИНИ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **585 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **5 100**

Заболеваемость и смертность


Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	57,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент	
заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	84,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	8,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	210
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,63
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да

Стандартизованный по возрасту
коэффициент смертности от рака
шейки матки на 100 000 женщин



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	2%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2006-2007):	60%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	12,45

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	18-65 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (-):	НД
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **2мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЭСТОНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (2019): **699 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ,
ЖЕНЩИНЫ (2019): **8 100**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	28,1
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	18,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,9%
Умерших от рака шейки матки (2019):	68
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,32
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



5 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2018
Основная возрастная когорта:	12-14 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	19%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,13

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-55 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 5 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	8
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	4

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	18
медицинских физиков (2019):	14
хирургов (2014):	247
радиотерапевтов (2019):	201
врачей ядерной медицины (2019):	10

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	25мг
--	-------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЭФИОПИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **56 010 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **288 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	13
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	21,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,5%
Умерших от рака шейки матки (2019):	5 000
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,72
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



8 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2018
Основная возрастная когорта:	14 лет

Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	1%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (2016):	44%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,21

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	VIA
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30–49 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	<1
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	<1

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	1
хирургов (2014):	52
радиотерапевтов (2019):	24
врачей ядерной медицины (2019):	0

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	0мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

VIA = визуальное обследование с использованием уксусной кислоты

* **Охват программы:** % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† **Охват к 15-летнему возрасту:** % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЮЖНАЯ АФРИКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **29 700 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **226 000**

Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	35,6
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	35,3
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	3,6%
Умерших от рака шейки матки (2019):	5 600
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,55
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



6 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ


Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2014
Основная возрастная когорта:	9 лет
Сопутствующие факторы риска:	
Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	7%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	8,43

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	30-59 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 4 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	17
хирургов (2014):	321
радиотерапевтов (2019):	60
врачей ядерной медицины (2019):	6

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	13мг
--	-------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

[См. пояснения для описания показателей.](#)

Всемирная организация здравоохранения. Сводные данные о раке шейки матки по странам, 2021

ЮЖНЫЙ СУДАН

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **5 526 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **41 700**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	12,7
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	20,5
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,3%
Умерших от рака шейки матки (2019):	760
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,74
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Нет



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Вакцинация против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Нет
Масштабы программы вакцинации:	-
Год начала:	-
Основная возрастная когорта:	-

Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020):	НД
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	2,52

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Нет
Основной применяемый метод скрининга (2021):	-
Целевой возрастной контингент программы (2021):	-
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошло менее 1 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (-):	НД

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Нет
Лабораторно-диагностические услуги:	Нет
Онкологическая хирургия:	Нет
Химиотерапия:	Нет
Лучевая терапия:	Нет

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2013):	16
радиотерапевтов (2019):	НД
врачей ядерной медицины (2019):	НД

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **0мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)

† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

ЯМАЙКА

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **1 485 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **8 700**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	25,9
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	21,6
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	2,2%
Умерших от рака шейки матки (2019):	360
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,64
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2017
Основная возрастная когорта:	11-12 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	4%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	0,61

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	20-64 лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Нет
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 7 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Да
---	-----------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	7
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2020):	3

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	5
медицинских физиков (2019):	НД
хирургов (2014):	249
радиотерапевтов (2019):	82
врачей ядерной медицины (2019):	7

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Нет
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Нет

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017):	4мг
--	------------

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.

ЯПОНИЯ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (2019): **64 910 000**

ВСЕГО УМЕРШИХ, ЖЕНЩИНЫ (2019): **655 000**


Заболеваемость и смертность

Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	19,8
Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 000 женщин (2020):	15,2
Совокупный риск рака шейки матки, в возрасте 0–74 лет (2020):	1,4%
Умерших от рака шейки матки (2019):	3 800
Соотношение смертности и заболеваемости, рак шейки матки (2020):	0,33
Наличие единого реестра онкологических больных (2021):	Да



Первичная профилактика

Охват вакцинацией против ВПЧ среди девочек (2020)



Менее 1 из 10, девочек, которым в 2020 исполнилось 15 лет, получила(и) последнюю дозу вакцины против ВПЧ

Программа вакцинации против ВПЧ (2020):

Вакцинация против ВПЧ внесена в национальный календарь прививок:	Да
Масштабы программы вакцинации:	общенациональная
Год начала:	2011
Основная возрастная когорта:	13 лет


Сопутствующие факторы риска:

Распространенность употребления табака, женщины от 15 лет и старше (2020)**:	8%
Использование презерватива при последнем сексуальном контакте повышенного риска (-):	НД
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 человек населения, женщины от 15 лет и старше (2020):	<0.01

Вторичная профилактика

Наличие национальной программы скрининга рака шейки матки (2021):	Да
Основной применяемый метод скрининга (2021):	цитология
Целевой возрастной контингент программы (2021):	20+ лет
Наличие программы/рекомендаций по более своевременному выявлению первых симптомов на уровне первичной помощи (2021):	Да
Наличие четко регламентированной системы направления больных из учреждений первичного звена для получения помощи второго и третьего уровня (2021):	Да

Скрининг на рак шейки матки (2019)



За последние пять лет скрининг на рак шейки матки прошла(и) 6 из 10 женщин в возрасте 30–49 лет

Лечение и поддерживающий уход

Наличие общенациональных рекомендаций по ведению случаев рака шейки матки (2021):	Нет
---	------------

Число установок для лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	10
Число установок для контактной лучевой терапии на 10 000 онкобольных (2021):	2

Общая доступность услуг диагностики и лечения онкологических заболеваний (2021):

В онкологических центрах или онкологических отделениях третьего уровня:	Да
Лабораторно-диагностические услуги:	Да
Онкологическая хирургия:	Да
Химиотерапия:	Да
Лучевая терапия:	Да

Количество медицинского персонала (на 10 000 онкобольных):

онкологов-радиологов (2019):	НД
медицинских физиков (2019):	11
хирургов (2013):	241
радиотерапевтов (2019):	97
врачей ядерной медицины (2019):	31

Общая доступность паллиативной помощи для пациентов с неинфекционными заболеваниями в системе государственного здравоохранения (2021):

В учреждениях первичного звена:	Да
В рамках местных сообществ или помощи на дому:	Да

Зарегистрированное ежегодное потребление опиоидов за исключением метадона в эквиваленте перорального морфина на душу населения (2017): **33мг**

Целевые показатели Стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки на 2030 г.:

полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам

высококачественный скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет

обеспечение лечения 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки

НД = данные недоступны

* Охват программы: % от общенационального целевого контингента (среди девочек в возрасте 9–14 лет)
† Охват к 15-летнему возрасту: % населения в возрасте от 15 лет, вакцинированного против ВПЧ в любой момент в возрасте 9–14 лет

[См. пояснения для описания показателей.](#)

**В отсутствие достаточных данных обо всех способах употребления табака приводятся только данные о табакокурении.