


¿Cómo puedo apoyar a mi hijo?



Asegúrate de que cuando hables con el niño



le des la cara



estés en un lugar bien iluminado para que el niño pueda ver tus labios y tus expresiones



el ruido de fondo sea bajo, o ambos se trasladen a un lugar tranquilo



hables claro y lento



¡no grites!

Cuida el audífono o el implante coclear del niño, lo que incluye



 cambiar la batería regularmente

 guardar el dispositivo en una caja seca por la noche



Sigue las instrucciones del médico o del audiólogo

Asiste regularmente a las sesiones de terapia o los controles, como se te haya indicado.



No ocultes que tu hijo tiene pérdida de audición



Informa a los docentes del niño de su pérdida de audición y pídeles que lo sienten al frente de la clase. Pide a los docentes que le den la cara al niño mientras hablan.



Informa a sus amigos y familiares de las necesidades del niño y guíalos para que se comuniquen con él o ella de manera eficaz.



Incluye a tu hijo en todas las actividades familiares y sociales.



Enseña a tu hijo que debe comunicar sus necesidades sin dudar

Por ejemplo, que avise si el audífono deja de funcionar, o que pida a las personas que repitan lo que dijeron si no puede oír bien.



Aprende la lengua de señas para comunicarte mejor con tu hijo, si es necesario.



Promueve ante las autoridades locales la instalación de servicios de audición en tu zona, si faltan.



Ponte en contacto con una organización local de personas con problemas de audición o sordera o sus padres y pídeles orientación.

RECUERDA

Una de cada 20 personas tiene pérdida de audición. No es nada de lo que avergonzarse. ¡No ocultes que tu hijo tiene pérdida de audición!

WHO/UCN/NCD/SDR 23.6


© Organización Mundial de la Salud 2023. Algunos derechos reservados.

Esta obra está disponible en virtud de la licencia [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

Organización Mundial de la Salud 2023 [whf@who.int](https://www.who.int)

Para más información, véase: <https://www.who.int/health-topics/hearing-loss>

Pérdida de audición en niños



Cuando sospechar y que hacer



Organización
Mundial de la Salud



¿Podría mi hijo tener pérdida auditiva?

Tu hijo o hija podría tener pérdida auditiva si

- No responde a los sonidos o al habla.
- Tiene un desarrollo del habla y del lenguaje retrasado o inapropiado para su edad.
- No puede entender lo que usted dice o a menudo pide a la gente que repita lo que ha dicho.
- Responde incorrectamente a las preguntas o instrucciones.
- Sube el volumen del radio/televisor o tiene problemas para escuchar lo que se dice por teléfono.
- Tiene un bajo rendimiento en la escuela o presenta problemas de comportamiento.
- A menudo tiene secreciones del oído o tapón de cerumen.
- Sufre episodios repetidos de dolor u obstrucción en el oído.
- Ha sufrido recientemente una enfermedad grave, como meningitis.

RECUERDA

En el caso de los bebés, se debe sospechar una pérdida auditiva si no responde a los sonidos, especialmente a la voz de la madre, o no se asusta de los sonidos fuertes, por ejemplo, una fuerte explosión.

Creo que mi hijo podría tener pérdida auditiva
¿Qué debo hacer?



Haz que le revisen los oídos y la audición en el centro de salud o clínica más cercano. Normalmente los otorrinolaringólogos y los audiólogos pueden examinar los oídos y la audición. Si no sabes bien adónde ir, pide orientación a un trabajador de la salud o un médico local.

¿Cómo se puede revisar la audición en un niño? ¿Es un procedimiento seguro?

La audición puede ser evaluada a todas las edades. Los bebés pueden ser examinados a los pocos días de nacer. Se puede revisar a los niños de hasta cinco años de edad se les puede evaluar la audición utilizando:



- emisiones otoacústicas
- potenciales evocados auditivos de tronco cerebral
- audiometría de observación del comportamiento

Niños de hasta 5 años pueden evaluar su audición utilizando una audiometría tonal.

RECUERDA

¡Las pruebas de audición son seguras, indoloras y fáciles de hacer!

¿Cuándo debo hacer que revisen a mi hijo?

¡Lo antes posible!

En el caso de los bebés cuya pérdida auditiva se diagnostica a los tres meses del nacimiento y cuya rehabilitación se inicia a los seis meses de edad, el habla y el lenguaje se pueden desarrollar de forma similar a los que tienen una audición normal. Cualquier retraso afectará el habla y la rehabilitación auditiva de su niño

RECUERDA


El diagnóstico y la intervención **TEMPRANA** son la clave del éxito en los niños con pérdida auditiva.



¿Qué pasa si mi hijo tiene pérdida auditiva? ¿Cómo se comunicará, estudiará o hará amigos?

Existen soluciones para que la pérdida de audición no limite la vida de tu hijo:

- Medicamentos o cirugía, cuando la pérdida de audición es causada por una infección de oído u otitis media con efusión o serosa o mucositis timpánica.
- Los audífonos y los implantes cocleares pueden ayudar al niño a oír, desarrollar el habla y el lenguaje y progresar en su educación.
- La rehabilitación y la terapia son muy importantes, incluso cuando se han adaptado dispositivos auditivos.
- Aprendizaje de la lengua de señas, para que el niño pueda comunicarse y aprender.



Una vez que se diagnostica la pérdida auditiva, la familia debe decidir cuál es la mejor manera de proceder, en consulta con el otorrinolaringólogo o audiólogo. La intervención debe comenzar SIN DEMORA. Puedes encontrar más información sobre estas intervenciones en el Manual Básico de Cuidado del Oído y la Audición, de la OMS.

RECUERDA

Con una intervención adecuada y oportuna, no hay límites para lo que tu hijo puede lograr.

