


သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရှိမရှိ
ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းမှ
ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့်ကို
စစ်ဆေးနိုင်သော နည်းလမ်းများမှာ . . .

- သားအိမ်ခေါင်း အခွဲအမြှေးကို စစ်ဆေးခြင်း
(PAP Smear)
- အက်စစ်တစ် အက်ဆစ်ဖြင့် မျက်မြင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း
(Visual Inspection with Acetic Acid / VIA)
- သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်စေသော ရောဂါပိုး
HPV DNA ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း



ကနဦးစစ်ဆေးမှုအပြေတွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ မတွေ့ရှိလျှင်လည်း
နောက်ထပ် (၅) နှစ်ကြာလျှင် ထပ်မံစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

အသက် (၃၀) မှ (၄၉) နှစ် အသက်အရွယ် ရှိသည့်
လိင်ဆက်ဆံဖူးသူ အမျိုးသမီးတိုင်း
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

ရောဂါအကြိုအဆင့်၌ စစ်ဆေးသိရှိပြီး စနစ်တကျကုသမှု ခံယူ
ပါက ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့်ဖြစ်ပွားမှု ရှိကြောင်း
စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အနာနေရာရှိ
တစ်ရှူးအသားစကို ဖျက်ဆီးခြင်း (သို့) ဖြတ်တောက်ဖယ်ထုတ်သော
နည်းလမ်းဖြင့် လုံးဝပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပါသည်။

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြောင့် အသက်စဆုံးရှုံးစေရန်



“အားလုံးစုပေါင်းအားနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို
ကာကွယ်တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။”



World Health
Organization
Myanmar

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ကုသပါ

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ရှိ၊ မရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊
ရောဂါကို စောလျင်စွာ သိရှိပြီး ချက်ချင်း ကုသမှုခံယူခြင်းတို့ဖြင့်
လုံးဝပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပါသည်။



သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဆိုတာဘာလဲ?

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများတွင်
ဖြစ်ပွားသော ကင်ဆာရောဂါများအနက် ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးကင်ဆာ
တစ်မျိုးဖြစ်သည်။

သားအိမ်ခေါင်းပတ်လည်မှ ဆဲလ် (ကလပ်စည်း) များ အလွန်
အကျွံ ပွားများလာခြင်းကြောင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်
ပါသည်။


သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်
အမျိုးသမီးများစွာ သေဆုံးနေကြရပါသည်။

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအများစုသည် အိတ်ချိုပီပီဗိုဗို ခေါ် လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ရောဂါပိုး (Human papilloma virus) ကူးစက်ခံရခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်မှုရှိသည်။

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သော အကြောင်းရင်းများမှာ ...



အသက်ငယ်ရွယ်စဉ် စောစီးစွာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း / လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်း



လိင်ဆက်ဆံဖော်များခြင်း

လိင်နှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများရှိသည့် ယောက်ျားနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း



မိန်းမကိုယ်နှင့် သားအိမ်ခေါင်းတွင် ကြွက်နို့များပေါက်ခြင်း၊ ရေယုန်ပေါက်ခြင်း



ဆေးလိင်သောက်ခြင်း

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၏ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ



မိန်းမကိုယ်မှ အဖြူဆင်းခြင်း၊ ပုပ်နံ့သော အရည်များဆင်းခြင်း



မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းခြင်း

လိင်ဆက်ဆံအပြီးတွင် သွေးဆင်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း



ဆီးစပ်နှင့် ခါး နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဆီးထဲသွေးပါခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခဲခြင်း

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားရန် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ပြီး ရောဂါအစောပိုင်း လက္ခဏာများကို သတိမမူဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် ဖြိုဖျက်စာကွယ်နိုင်သော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။

အသက်(၉)နှစ်မှ (၁၄)နှစ် အတွင်းမိန်းကလေးများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းဖြင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို ကာကွယ်ပါ။



အသက်ငယ်ရွယ်စဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။

လိင်ဆက်ဆံဖော် များခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။



တစ်လင် တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးပါ။

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့်ဖြစ်ပွားနေခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။

